

## ΦΥΛΗ ΑΙΓΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ



### ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η αίγα Σκοπέλου κατάγεται από τα νησιά των Βόρειων Σποράδων, Σκόπελο, Αλόνησο και Σκιάθο. Εκτρέφεται στα παραπάνω νησιά καθώς και στα χωριά του Πηλίου, Κανάλια και Κεραμίδι σε ένα αριθμό 8400 ζώων από 40 εκτροφείς.

### ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Είναι περήφανο ζώο με μακρύ και λεπτό τράχηλο. Ο χρωματισμός είναι έντονος ερυθρό-καστανός (κάλπινο) και το τρίχωμα μαλακό, λείο, βραχύ και στιλπνό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ζώων έχει κέρατα σπαθοειδή και ελαφρώς ελικοειδή. Ο μαστός είναι καλοσχηματισμένος για άρμεγμα με το χέρι ή με αμελκτική μηχανή. Είναι μεγαλόσωμο ζώο με σωματικό βάρος του αρσενικού 87 κιλά και του θηλυκού 56 κιλά.

### ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αμνάδες εμφανίζουν πρόιμη, γενετήσια ωριμότητα. Τα θηλυκά εμφανίζουν οίστρο από τον πρώτο χρόνο της ηλικίας τους και κατά μέσο όρο γεννούν σε ηλικία 13 μηνών. Ο συντελεστής πολυδυμίας είναι 1,55-1,68 ερίφια ανά τοκετό..

### ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Το μέσο βάρος των εριφίων κατά τον απογαλακτισμό που γίνεται σε 40-50 ημέρες είναι 15-17 κιλά. Είναι ζώο υψηλών αποδόσεων με μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής τα 330 κιλά γάλα με μέσο διάστημα αρμέγατος 203 ημερών. Υπάρχουν κοπάδια με μέση γαλακτοπαραγωγή πάνω από 350 κιλά γάλα και ανάμεσα σε αυτά, ζώα τα οποία παράγουν μέχρι και 700 κιλά γάλα το χρόνο.

Η ποιότητα του γάλακτος θεωρείται υψηλή με λιποπεριεκτικότητα 5,5%, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη 4,6%, και λακτόζη 4,0%.

## ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι συνθήκες εκτροφής των αίγων είναι εκτατικές. Τα ζώα βόσκουν σε βοσκοτόπους μικρής βλάστησης και τους χορηγούνται μικρές ποσότητες συμπυκνωμάτων.