



Θεσσαλονίκη 03/08/2012
Αρ. Πρωτ.: 11933

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Διεύθυνση ✉ : Αλ. Παπαναστασίου 63
544 53 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες ☎ : Α. ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ
Τηλέφωνο ☎ : 2310-984185, 984189
Telefax : 2310-914303
e-mail : u12862@minagric.gr
u12846@minagric.gr

Όπως Π.Δ.

4^ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Στόχοι

- 1.1 Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2 Αφορά το διάστημα της καρποφορίας με καρπόδεση του 50% των ανθέων και τη διατήρηση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
- 1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός απαιτείται να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβακοχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως παρακάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

2. Διαπιστώσεις

- 2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης «Καρποφορία με καρπόδεση του 50% των ανθέων». Το ύψος των φυτών είναι περίπου 80 - 100 cm .
- 2.2 Στους τρεις από τους τέσσερις αγρούς παρατήρησης μας
 - Κουφάλια στη περιοχή «Ραχώνα»
 - Κουφάλια στη περιοχή «Υψώματα Χαλκηδόνας», και
 - Τρίλοφος στη περιοχή «Αγκορτσούδες»

στο τελευταίο δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκαν προσβολές από πράσινο σκουλήκι (*H. armigera*) πάνω από το όριο επέμβασης.

Στο τέταρτο αγρό παρατήρησης, στα Κύμινα περιοχή «Βόριο» δεν διαπιστώθηκαν προσβολές πάνω από το όριο επέμβασης τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.

3. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1 Σ'αυτό το στάδιο της βαμβακοκαλλιέργειας είναι **απαραίτητο να συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δύο (2) φορές την εβδομάδα** τόσο για το πράσινο όσο και το ρόδινο σκουλήκι.

Αν διαπιστωθεί:

- i. παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού, πάνω από 4 %
- ii. προσβολή στα καρύδια, από ρόδινο σκουλήκι, από 5-8 % και άνω
να διενεργηθεί ψεκασμός με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

3.2 Δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται σε νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων (καρύδια πράσινα, ελαστικά στη πίεση, όχι νερούλα και όχι σκληρά). Εξετάζουμε καρύδια από 100 φυτά τυχαία από όλο το χωράφι, όχι από τις άκρες του χωραφιού και όχι από ψηλά χυμώδη φυτά, και ελέγχουμε για παρουσία προνυμφών μέσα στα καρύδια.

3.3 Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία τρυφερών, χυμωδών βλαστικών ιστών οι οποίοι προσελκύουν τα έντομα.

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

Στις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω (i. Κουφάλια τοποθεσία «Ραχώνα», ii. Κουφάλια, τοποθεσία «Υψώματα Χαλκηδόνας», και iii. Τρίλοφος τοποθεσία «Αγκορτσούδες») οι παραγωγοί να κάνουν άμεσα δειγματοληπτικό έλεγχο στα χωράφια τους και αν η προσβολή από πράσινο σκουλήκι είναι πάνω από 4 % να διενεργηθεί άμεσα καταπολέμηση με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα..

Εάν οι παραγωγοί παρατηρήσουν στις συνεχόμενες δειγματοληψίες στο χωράφι τους προσβολή από πράσινο και ρόδινο σκουλήκι και αυτή είναι **υψηλότερη από τα όρια που αναφέρονται στη 3.1 παράγραφο, μόνο τότε να προβούν σε ψεκασμό** με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Προσοχή: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΣΑΦΙΔΟΥ - ΔΙΓΚΑ