



Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡ. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 27-7-2012

Αριθμ. Πρωτ.: 12441

Τεχνικό Δελτίο

Πληροφορίες : Η. Ελευθεριάδης - τηλ.: 25213-51246 fax: 25213-51204, e-mail:u13409@minagric.gr

BAMBAKI

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ

Οι βαμβakoφυτείες στην περιοχή μας βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο ύψους περίπου 80-110 cm και έχουν (1-4) καρύδια 10 ημερών και (4-5) χτένια ενώ σε αγρούς με βαριά εδάφη που δέχθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις οι βαμβakoφυτείες είναι αρκετά οψιμότερες (60-80 cm) και (4-5) χτένια.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Μέτριες συλλήψεις (περί τα 30 άτομα) πεταλούδων πράσινου σκουληκιού εμφανίζουν οι φερομονικές παγίδες που εγκατέστησε η Υπηρεσία μας. Δεν παρατηρούνται προσβολές προνυμφών, με εξαίρεση λίγους αγρούς ορισμένων περιοχών (Σιταγροί-Αργυρούπολη) που εμφανίζουν μέτριες προσβολές σε φύλλα - χτένια - ροζ κλειστά άνθη και μικρά καρύδια

Καταγράφονται επίσης σημαντικοί πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

Να ελέγχονται ανά δυο ημέρες οι βαμβakoφυτείες. Οι προνύμφες αυτή την περίοδο είναι πολύ μικρές(μήκος 1 εκ.) και τις βρίσκουμε στην κορυφή σε χτένια - ροζ κλειστά άνθη και μικρά καρύδια. Να ελέγχονται σχολαστικά αγροί οψιμισμένοι, ή με πλούσια και τρυφερή βλάστηση. Σε κάθε αγρό ελέγχονται προσεκτικά 100 φυτά (5 συνεχόμενα φυτά, σε 20 θέσεις).

Εάν βρεθούν 5 μικρές προνύμφες τότε προχωρούμε σε ψεκάσμο.

Κατάλληλα εντομοκτόνα:

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με δραστική ουσία chlorpyrifos, chlorpyrifos- methyl, cypermethrin, Z- cypermethrin, deltamethrin, B-cyfluthrin, cyfluthrin, L- cyhalothrin, diflubenzuron, es-fenvalerate, t-fluvalinate, emamectin benzoate.

Τα σκευάσματα με δραστικές ουσίες bacillus thuringiensis (σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα) και spinosad είναι κατάλληλα και για βιολογικές καλλιέργειες.

Να γίνεται προσεκτικά η χρήση πυρεθρινών, καθώς υπάρχουν επιστημονικές αναφορές εμφάνισης ανθεκτικότητας.

Γενική δόση άρδευσης 50-60 κ.μ. νερού /στρ.

Σε φυτείες με έντονη ανάπτυξη (φυτά άνω των 90 εκ.), σε γόνιμα και καλά αεριζόμενα εδάφη, συνιστάται χαμηλότερη δόση άρδευσης (30 κ.μ νερού/στρ) και εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης (meriquat chloride 5 SL, διάφορα σκευάσματα) σε δόση 70-150 κ.εκ./στρ.

ΜΕ Ε.Π.

Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΙΩΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ