



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Διοικητήριο, Πολύγυρος, 63100 / Τηλ: 2371351282 / Φαξ: 2371039207/ E- mail:agro12@halkidiki.gov.gr

Πολύγυρος, 17/7/2012
Αρ. Πρωτ.: 05/9436

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Στόχοι

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά το διάστημα της πλήρης ανθοφορίας και την αρχή της καρπόδεσης για τη δημιουργία της μέγιστης αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Η τακτική παρακολούθηση των καλλιεργειών από τους παραγωγούς και η συλλογή δεδομένων από τους μεμονωμένους αγρούς π.χ. αριθμός πράσινων σκουληκιών σε 100 φυτά, αριθμός ατόμων λύγκου κτλ. Απαιτούνται τα παραπάνω δεδομένα από κάθε παραγωγό για την εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών στο σωστό χρόνο, ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

2. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης με την εμφάνιση των καρυδιών στα πρώτα χτένια. Το ύψος των φυτών ξεπερνά τα 50 εκ.

2.2 Υπάρχουν χαμηλές προσβολές από αλευρώδεις που δεν δημιουργούν προβλήματα.

2.3 Διαπιστώθηκαν αρκετοί πληθυσμοί ωφελίμων όπως πασχαλίτσες, χρύσωπες, αράχνες, ψαλίδες κ.α..

2.4 Η πτήση του πράσινου σκουληκιού συνεχίζεται σε όλες τις περιοχές της Χαλκιδικής (Γαλαρινό, Γαλάτιστα, Δουμπιά, Ν. Φώκαια).

Σε καμία περιοχή της Χαλκιδικής δεν παρατηρήθηκαν προνύμφες κατά την δειγματοληψία 100 φυτών.

Πιστεύεται ότι η μειωμένη δραστηριότητα του εντόμου οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνας) που επικράτησαν

3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Συνιστάται στους παραγωγούς να είναι σε επιφυλακή, ιδιαίτερα τώρα του μειώνονται οι θερμοκρασίες και ο καιρός είναι δροσερός, συνθήκες που ευνοούν το σκουλήκι.

Οι παραγωγοί να ελέγχουν ανά 3 - 4 ημέρες τον αγρό για την ύπαρξη προνυμφών πράσινου σκουληκιού και να προβούν σε επεμβάσεις μόνο εάν βρουν περισσότερα από 4 σκουλήκια σε 100 φυτά.

Προσοχή! Σε περίπτωση που παρατηρούνται λιγότερα από 4 σκουλήκια σε 100 φυτά, να μην πραγματοποιούνται ψεκασμοί

4. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Σε αυτήν την περίοδο συστήνονται ψεκασμοί με εκλεκτικά εντομοκτόνα που είναι λιγότερο επιζήμια για τα ωφέλιμα έντομα, βιολογικά ή χημικά. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ευρέως φάσματος σκευάσματα. Σημαντικό είναι να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα διαφορετικής δράσης σε επαναληπτικές επεμβάσεις για την διαχείριση της ανθεκτικότητας.

Πριν τον ψεκασμό ενημερωθείτε και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος για την χρήση και εφαρμογή του.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
2. ΥΠΠΑΤ, Δ/ση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής, Τμήμα Γεωργ. Προειδοποιήσεων
3. Περιφ. Κέντρο ΠΦ & ΠΕ Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
4. ΕΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
5. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ