

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

A. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας συντάχθηκαν σύμφωνα με:

- Τον Ν.4036/27-1-2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 28 αυτού: «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία» και του Δ' Παραρτήματος αυτού με τίτλο: «Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας», με τον οποίο γίνεται η ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/128/EK, άρθρο 14 και παράρτημα III αυτής.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ)1107/2009 (L309/1) σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 31 και 55 με τα οποία η ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμμορφώνεται με τις «Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας» το αργότερο **μέχρι 01-1-2014**

B. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην σύνταξη των Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ελήφθησαν υπόψη:

- Τα διαθέσιμα επιστημονικά, ερευνητικά, εμπειρικά δεδομένα και τεχνικές των καλλιεργειών στη Χώρα μας, με στόχο την αύξηση της παραγωγής, την ποιοτική αναβάθμιση και την ασφάλεια παραγόμενων προϊόντων, στα πλαίσια των αρχών της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, με ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής και της οικονομικής βιωσιμότητας των καλλιεργειών.
- Οι καθορισθείσες τιμές κατωτάτων ορίων πληθυσμιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών στις καλλιέργειες στις οποίες έχουν καθοριστεί (όρια επέμβασης) υπεράνω των οποίων δικαιολογείται επέμβαση (χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μέσων) πάντοτε

σύμφωνα με τις πρακτικές ορθής διαχείρισης των επιβλαβών οργανισμών από εμπλεκόμενους φορείς φυτοπροστασίας όπως: καλλιεργητές, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς φυτοπροστασίας και φορείς γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας.

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας δίδονται με την μορφή πίνακα που αποτελείται από 4 στήλες

- Στην πρώτη στήλη περιγράφεται η **καλλιεργητική πρακτική**.
- Στην δεύτερη στήλη η συγκεκριμένη πρακτική χαρακτηρίζεται **Υποχρεωτική** ή όχι σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας, που πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς από 01-1-2014 και να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους στην φυτοπροστασία των καλλιεργειών κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.
- Στην τρίτη στήλη προσδιορίζονται οι **Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας** της καλλιέργεια με σκοπό **την εθελοντική άσκηση και εξουκείωση** των παραγωγών, με στόχο την ανάπτυξη κινήτρων για την εφαρμογή τους.
- Στην τέταρτη στήλη αναφέρεται η **Αιτιολόγηση** της αναφερόμενης καλλιεργητικής πρακτικής καθώς και άλλα σχόλια

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Τα φυτοπροστατευτικά προϊόνται στον Κανονισμό (ΕΚ)1107/2009 (L309/1) και θα πρέπει να είναι **εγκεκριμένα στη χώρα μας** σύμφωνα με τον Ν. 4036/2012 (Α'8) και τις απορρέουσες από αυτόν Υπουργικές Αποφάσεις. Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μέσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (<http://www.minagric.gr/syspest/>)
- Τα σκευάσματα φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς θα πρέπει να **είναι εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς** (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ.) σύμφωνα με το Ν. 4036/2012 (Α'8) και την 10522/117908/02-10-2014 Υπ. Απόφαση (Β'2622).
- Κατά την επιλογή και εφαρμογή κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος, να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται προσεκτικά και χωρίς αποκλίσεις, όλες οι πληροφορίες και οι οδηγίες της ετικέτας και των αναγραφομένων στη συσκευασία.
- Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας φυτοπροστατευτικής ενέργειας.

- Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με τη χορηγούμενη συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου η οποία αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης γεωργικού φαρμάκου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων του Παραρτήματος Δ' του ν. 4036/2012, της αριθ. 8197/90920/22-7-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/EK και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» (Β'1883) και της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β'2310-ΑΔΑ 78ΗΗΒ-ΜΔΧ).
- Οποιαδήποτε φυτοπροστατευτική επιλογή ή μέτρο επιβαλλόμενο από Κοινοτική Απόφαση (Ε.Ε.) υποχρεωτικής εφαρμογής, καθίσταται αυτομάτως αποδεκτό και ενσωματώνεται στις παρούσες Οδηγίες.
- Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ισχύουν και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των εκάστοτε διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων για θέματα **Φυτοϋγειονομικού ελέγχου** και **πολλαπλασιαστικού υλικού**.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Η σύνταξη των Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας έγινε από Επιστημονικές Ομάδες που ορίστηκαν με την 4012/45395/11-04-2012 (ΑΔΑ:Β4ΩΞΒ-20Ε) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 4741/51351/02-5-2012 (ΑΔΑ:Β496Β-186) και 12466/123096/05-12-2012 (ΑΔΑ:Β45NB-386)Υπ. Αποφάσεις.
- Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και τα σχόλια ελήφθησαν υπόψη πριν την οριστική διαμόρφωση τους.
- Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας ακολουθώντας τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση και ενημέρωση.
- Οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους με σαφή αναφορά της πηγής.

Σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις επί των Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας μπορούν να αποστέλλονται στα email:
pkoutsianas@minagric.gr, azounos@minagric.gr, aalexopoulos@minagric.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

Στάδια ανάπτυξης των ανθοφόρων οφθαλμών της Μηλιάς κατά Fleckinger
(φωτογραφίες των συγγραφέων)



A Λήθαργος οφθαλμών



B Φούσκωμα οφθαλμών,
διαχωρισμός λεπιών



C Πράσινη κορυφή



C3 "αυτιά ποντικού"



D κλειστή πράσινη
ταξιανθία



D3 κλειστή πράσινη ταξιανθία
με εκπυγμένα φύλλα



E ρόδινη κορυφή



E2 Στάδιο "μπαλονιού"



F έναρξη άνθησης



F2 πλήρης άνθηση



G έναρξη πτώσης πετάλων



H πλήρης πτώση πετάλων



I καρπίδια μέγεθος "φουντουκιού"



J καρπίδια μέγεθος "καρυδιού"

<u>Σε όλη την καλλιεργητική περίοδο</u>	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
Γενικές οδηγίες			
Νέες φυτεύσεις:			
Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας			
Η εγκατάσταση του μηλεώνα να μη γίνεται σε περιοχές εκ φύσεως υγρές.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης σοβαρών ασθενειών και κυρίως Φουζικλάδιου (Ο μύκητας προκαλεί σοβαρές ζημιές σε περιοχές όπου το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης είναι μεγαλύτερο από 650 mm ή η εκμετάλλευση βρίσκεται σε κλειστές, ομιχλώδεις και υγρές κοιλάδες)
Αποφυγή περιοχών με βεβαρημένο ιστορικό σε παγετούς και χαλαζοπτώσεις.	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Μείωση δευτερογενών προσβολών από πληγές η καταπόνηση
Αποφυγή αγροτεμαχίων όπου τα μολύσματα βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα ή υποχρεωτική αμειψισπορά 2 ετών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Αποφυγή περιοχών που περιλαμβάνουν στην αυτοφυή βλάστηση τους είδη του γένους <i>Crataegus</i>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Εστία μόλυνσης από βακτηριακό κάψιμο
Επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού:			

Επιλογή πιστοποιημένου φυτοϋγειονομικά πολλαπλασιαστικού υλικού	NAI	NAI	
Επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών	OXI	NAI	Ως μέτρο αντιμετώπισης των ασθενειών του Φουζικλαδίου, της αλτερνίασης, της αργύρωσης και των βακτηρίων
Επιλογή ανθεκτικών υποκειμένων	OXI	NAI	Ως μέτρο αντιμετώπισης της φυτόφθορας, των σηψιφριζιών και του βακτηριακού καψίματος
<u>Κλάδεμα</u>			
Το κλάδεμα να γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπει τον αερισμό των δένδρων και την καλή επικάλυψη με το ψεκαστικό υγρό	NAI	NAI	Αποφυγή ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης Φουζικλάδιου, ωιδίου, μονίλιας
Αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων, κλαδίσκων. Η εκρίζωση και η απομάκρυνση των έντονα προσβεβλημένων δένδρων και των γειτονικών τους που είναι ύποπτα προσβολής, μαζί με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα.	NAI	NAI	Μειώνονται οι πρωτογενείς μολύνσεις και επομένως η εξάπλωση των παθογόνων που διαχειμάζουν στα έλκη
Να απολυμαίνονται οι τομές κλαδεύσεως με διάφορα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα. Υπάρχουν κλαδευτικά εργαλεία που παράλληλα με την τομή κάνουν και απολύμανση αυτής.	NAI	NAI	Οι τομές όπως και τα τραύματα είναι σημεία εισόδου μυκητολογικών ασθενειών και εντομολογικών προσβολών
Τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται μετά από κάθε τομή.	NAI	NAI	Μεταδίδονται μολύσματα από ασθενή δένδρα σε υγιή
<u>Κατεργασία του εδάφους</u>			
Η κατεργασία του εδάφους ουσιαστικά συνδέεται με την διαχείριση του νερού. Δεν πρέπει να καλλιεργείται η περιοχή κοντά στο δένδρο (προβολή της κόμπης) για την αποφυγή μικροπληγών στα ριζικά τριχίδια.	NAI	NAI	
Συνιστάται η διατήρηση της φυσικής βλάστησης σε μη παραγωγικές	OXI	NAI	Διατήρηση καταφυγίων αφελίμων, διαχείριση ανθεκτικότητας των εχθρών

περιοχές ή ζώνες (όρια οπωρώνα, πρανή κλπ.)				
Άρδευση της καλλιέργειας:				
Να αποφεύγεται η μέθοδος της κατάκλισης Να αποφεύγεται η διαβροχή του λαιμού και του κορμού των δένδρων Να αποφεύγονται τα υπερβολικά ποτίσματα (πέραν των πραγματικών αναγκών των φυτών)	OXI	NAI		Ευνοεί την εξάπλωση ορισμένων ασθενειών Οι υπερβολικές ποσότητες νερού, πέρα από την σπατάλη δημιουργούν και συνθήκες ανάπτυξης διαφόρων ασθενειών και εχθρών
Θρέψη : Αυτή πρέπει να στηρίζεται σε προηγθείσα ανάλυση εδάφους με στόχο την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής ισορροπίας.	NAI	NAI		Η διατήρηση των φυτών σε θρεπτική ισορροπία αυξάνει την αντοχή τους στις ασθένειες. Καθυστερημένη αζωτούχος λίπανση αυξάνει την ευαισθησία στο Φουζικλάδιο
Να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος λίπανση Επιτρέπεται η χρήση μόνο καλά χωνεμένης κοπριάς	NAI	NAI		Τα θηλυκά του κόκκινου τετράνυχου πολλαπλασάζουν την ωτοκία τους σε δέντρα που έχουν εφαρμοστεί πολύ υψηλές δόσεις αζώτου Αποφυγή μεταφοράς μολυσμάτων αλλά και πρόκλησης τοξικών φαινομένων στα ριζίδια κατά την αποσύνθεση (χώνεμα) αχώνευτης κοπριάς
Γεωργικά μηχανήματα: Επιμελής καθαρισμός των γεωργικών μηχανημάτων και παρελκόμενων του γεωργικού ελκυστήρα. Το πλύσιμο των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνεται είτε σε χώρους που έχουν οριοθετηθεί από τους τοπικούς οργανισμούς εγγείων βελτιώσεων, είτε σε ιδιωτικούς χώρους. Σε κάθε περίπτωση	NAI	NAI		Η διασπορά των παθογόνων, ιδιαίτερα αυτών που προσβάλλουν τον λαιμό και το ριζικό σύστημα των δένδρων πραγματοποιείται και με την μεταφορά χώματος και φυτικού υλικού. Ο επιμελής καθαρισμός μειώνει τις πιθανότητες διασποράς

λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ενάντια στη διασπορά των υλικών που ξεπλένονται			των μολυσμάτων
--	--	--	----------------

<u>Περίοδος πριν την άνθηση</u> (από Λήθαργο έως Ρόδινη κορυφή) (στάδια A – E ₂)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<u>Ειδικές οδηγίες</u> <u>Εντομολογικοί Εχθροί</u> <u>Κόκκινος τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i> Koch, Acari: Tetranychidae)</u> Από τα ακάρεα που προσβάλλουν την μηλιά, ο κόκκινος τετράνυχος αποτελεί το περισσότερο ζημιογόνο είδος. Το άκαρι ζει και στις δύο επιφάνειες των φύλλων προκαλώντας με την τροφική του δραστηριότητα μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φύλλων και μείωση της ποσότητας και ποιότητας των παραγόμενων καρπών. <u>Παρακολούθηση:</u> Εβδομαδιαία παρακολούθηση και δειγματοληψία για διαπίστωση έναρξης των εκκολάψεων των χειμερινών αυγών, καταμέτρηση της έντασης της προσβολής και διαπίστωση παρουσίας αφελίμων εντόμων.			Αξιόλογη δράση κατά του <i>P. ulmi</i> εμφανίζουν τα είδη <i>Stethorus punctum</i> , <i>Amblyseius andersoni</i> Chant, <i>Euseius finlandicus</i> Oudemans, <i>Typhlodromus pyri</i> Scheuten.

<p>Όρια επέμβασης:</p> <p>Επέμβαση με ακαρεοκτόνα σκευάσματα ωοκτόνου - προνυμφοκτόνου δράσης όταν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου</p> <p>Εάν η προσβολή είναι μικρότερη, αρκεί η επέμβαση με παραφινέλαια για την Ψώρα του San José.</p>		NAI	NAI	Aκαρεοκτόνα με κύρια δράση στα αυγά και στα προνυμφικά στάδια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εναντίον ακμαίων ώστε να επιτυγχάνεται διαχείριση της ανθεκτικότητας.
		NAI	NAI	
<p>Χρόνος επέμβασης:</p> <p>Με την έναρξη των εκκολάψεων των χειμερινών αυγών έως το πολύ το 50% των εκκολάψεων (άθροισμα 75 – 137 ημεροβαθμών, με έναρξη άθροισης την εποχή περάτωσης της διάπαυσης, δηλαδή μέσα Φεβρουαρίου)</p>		NAI	NAI	Υπολογισμός ημεροβαθμών (Degree-Days, DD) με κατώτερη θερμοκρασία ουδό $T_{ou} = 7^{\circ} C$
				Η απλούστερη μέθοδος υπολογισμού των ημεροβαθμών μιας ημέρας:
<p>Ψώρα του San Jose (<i>Quadrastripiotus perniciosus</i>, Aspidiotus perniciosus, Homoptera: Diaspididae)</p> <p>Έχει 3-4 γενεές/έτος Διαχειμάζει ως προνύμφη (80%) ή ενήλικο θηλυκό (20%) Σοβαρός εχθρός</p> <p>Παρακολούθηση:</p> <ol style="list-style-type: none"> Παρακολούθηση της πτήσης των ενήλικων αρσενικών εντόμων με φερομονικές παγίδες. Τοποθέτηση 3-4 παγίδων στις αρχές Απριλίου, στην ΒΑ πλευρά των δέντρων. Έλεγχος 2 φορές την εβδομάδα 				$DD = \frac{T_{μεγ} + T_{ελ}}{2} - T_{ou}$ <p>Όπου $T_{μεγ}$= μέγιστη θερμοκρασία ημέρας και $T_{ελ}$= ελάχιστη θερμοκρασία ημέρας</p>
		NAI	NAI	Προσβάλλει βλαστούς, κλάδους, κορμό και καρπούς. Προκαλεί κηλίδες στο σημείο που βρίσκεται. Όταν οι κηλίδες στους καρπούς είναι πολλές μειώνεται η εμπορική του αξία.

<p>2. Παρακολούθηση της εμφάνισης των νεαρών ερπουσών προνυμφών με κολλητική ταινία διπλής όψης στα ακριανά κλαδιά. Η τοποθέτηση των κολλητικών ταινιών παγίδων γίνεται στις αρχές Μαΐου</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Καλλιεργητικά μέτρα: <ul style="list-style-type: none"> • Η φύτευση στους νέους οπωρώνες μη προσβεβλημένων δενδρυλλίων • Η αφαίρεση και καταστροφή με κάψιμο των βραχιόνων που είναι προσβεβλημένοι. Σε περίπτωση μεγάλης προσβολής συνίσταται το κάψιμο και ολόκληρων των προσβεβλημένων δένδρων ➤ Χημικά σκευάσματα: <ul style="list-style-type: none"> • Αυτή την εποχή συνιστάται επέμβαση με παραφινέλαια εναντίον της διαχειμάζουσας μορφής, στη διόγκωση των οφθαλμών έως λίγο πριν το στάδιο της πράσινης κορυφής (B – C₃) <p>φυσικοί εχθροί</p> <p>Καρπόκαψα (<i>Cydia pomonella</i>, <i>Carpocapsa pomonella</i>, <i>Laspeyresia pomonella</i>, Lepidoptera: Tortricidae)</p> <p>Η καρπόκαψα είναι ο σοβαρότερος εχθρός της μηλιάς, με ποσοτική και ποιοτική ζημία των καρπών, και ο παραγωγός πρέπει κάθε χρόνο να λαμβάνει μέριμνα για</p>	<p>ΟΧΙ</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p>	<p>Εφαρμογή σε τουλάχιστον 10 τυχαία δέντρα, σε 1-2 βλαστούς διαμέτρου 3-5 εκατοστών</p> <p>Έχει στόχο να μειώσει το πληθυσμό του εντόμου στην αρχή της περιόδου</p> <p>Ταυτόχρονη μείωση χειμερινών αυγών κόκκινου τετράνυχου</p> <p>Encarsia perniciosi, Cybocephalus fodori, Chilocorus orbus, Cybocephalus californicus</p>
--	--	---	---

<p>την διαχείρισή του. Ολοκληρώνει συνήθως 2-3 γενιές το έτος. Διαχειμάζει ως αναπτυγμένη προνύμφη Δεν συνιστάται καταπολέμηση αυτήν την περίοδο</p>			
<p>Παρακολούθηση: ανάρτηση φερομονικών παγίδων</p>		ΝΑΙ	
<p>Παρακολούθηση της πτήσης των ενήλικων αρσενικών εντόμων με φερομονικές παγίδες. Τοποθέτηση νωρίς την Άνοιξη (1/4) ή στην ρόδινη κορυφή ή όταν συμπληρωθούν 100 ημεροβαθμοί από την 1^η Μαρτίου</p>		ΝΑΙ	Κατώτερη θερμοκρασία ουδός $T_{ou} = 10^{\circ} C$
<p>Τοποθέτηση τουλάχιστον 2 παγίδων σε κάθε οπωρώνα, 1 στο κέντρο και 1 στην περιφέρεια, παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου, στο άνω τρίτο της κόμης των δέντρων. Έλεγχος κάθε 2-3 ημέρες.</p>		ΝΑΙ	Στην περίμετρο παρατηρείται μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού Καλύτερη διάχυση της φερομόνης στο χώρο
<p>Μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης (mating disruption). Τοποθέτηση εξατμιστήρων φερομόνης αμέσως με την έναρξη των συλλήψεων των αρσενικών στις παγίδες, σε οπωρώνες τουλάχιστον 10 στρεμμάτων</p>		ΟΧΙ	ΝΑΙ ¹ Η μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική σε οπωρώνες μικρότερους των 10 στρεμμάτων
<p>Φυλλοδέτης (<i>Adoxophyes orana</i> (Fischer von Rosslerstamm)) (Lepidoptera: Torticidae)</p>			¹ Εφαρμογή μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης ή χρήση βιολογικού σκευάσματος ή εισαγωγή παρασιτοειδών
<p>Αποτελεί σοβαρό εχθρό των οπωροφόρων δέντρων τα τελευταία χρόνια. Εμφανίζει 3-4 γενεές/έτος. Διαχειμάζει ως προνύμφη 3^{ου} σταδίου μέσα σε μετάξινη φωλιά που υφαίνει σε ρωγμή του φλοιού, κάτω από ξερούς φλοιούς ή σε άλλη προφυλαγμένη θέση, συνήθως πάνω στο δένδρο. Η προνύμφη δραστηριοποιείται την άνοιξη</p>			
<p>Παρακολούθηση: ανάρτηση τουλάχιστον 2 φερομονικών παγίδων μαζί με αυτές για την καρπόκαψα</p>		ΟΧΙ	ΝΑΙ

<p><u>Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> (πράσινη αφίδα), <i>Dysaphis plantaginea</i> (ρόδινη αφίδα))</u></p> <p>Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.</p> <p>Όρια επέμβασης - δειγματοληψία:</p> <p>Έλεγχος 10 βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα από 10 τυχαία δένδρα.</p> <p>Εάν βρεθούν πάνω από 15 άτομα <i>Aphis pomi</i> ή πάνω από 2 άτομα <i>Dysaphis plantaginea</i> επέμβαση με αφιδοκόνο σκεύασμα.</p> <p><u>Ματόψειρα ή Βαμβακάδα μηλιάς (<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann) (Homoptera: Aphididae)</u></p> <p>Διαχειμάζει ως αναπτυγμένη προνύμφη</p> <p>Συνήθως αρκεί η επέμβαση με ορυκτέλαια-παραφινέλαια για την Ψώρα του San José</p> <p>Φυσικοί εχθροί: <i>Aphelinus mali</i></p> <p><u>Ανθονόμος της μηλιάς (<i>Anthonomus pomorum</i> L. (Coleoptera: Curculionidae)</u></p> <p>Έχει 1 γενεά/έτος</p> <p>Διαχειμάζει ως ενήλικο. Δραστηριοποιείται την άνοιξη σε θερμοκρασία $>5^{\circ}\text{C}$, και μετά 10-15 ημέρες είναι</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>Δυνατότητα δημιουργίας κοινού ψεκαστικού υγρού για καταπολέμηση του Φουζικλάδιου</p>
--	-----------------------	-----------------------	---

<p>σεξουαλικά ώριμο. 3 ημέρες μετά την γονιμοποίηση το θηλυκό ωοτοκεί στα κλειστά άνθη (μεταξύ B_2 και C_2 σταδίου)</p> <p>Σε χαμηλούς πληθυσμούς δεν επεμβαίνουμε</p> <p>Συνήθως αρκεί η επέμβαση με ορυκτέλαια-παραφινέλαια για την Ψώρα του San José</p>	NAI	NAI	Μικρή προσβολή συντελεί στο αραίωμα των ανθέων σε χρονιά με πλούσια άνθηση.
---	-----	-----	---

<u>Περίοδος πριν την άνθηση</u> (από Λήθαργο έως Ρόδινη κορυφή) (στάδια A – E ₂)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<u>Ειδικές οδηγίες</u> Ασθένειες <u>Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis (Cooke) Wint.):</u> <p>Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες της μηλιάς. Σε υγρές χρονιές μπορεί να εξαπλωθεί επιδημικά και να προκαλέσει μεγάλες ζημιές.</p> <p>Ευαίσθητες ποικιλίες μηλιάς: Red Delicious, Golden Delicious, Jonathan, Cox Orange Renet, Gala, Elstar, Jonagold, Fuji.</p> <p>Ανθεκτικές ποικιλίες: Freedom, Liberty, Prima</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <p>Καλλιεργητικά μέτρα Αφαίρεση και καταστροφή προσβεβλημένων κλάδων.</p>	NAI	NAI	Μειώνονται οι πρωτογενείς μολύνσεις με την απομάκρυνση των ελκών όπου διαχειμάζει το παθογόνο.

<p>Παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργωμα.</p> <p>Ψεκασμοί</p> <p>Ένας χειμερινός ψεκασμός με εγκεκριμένο σκεύασμα εναντίον του μυκηλίου που βρίσκεται στους προσβεβλημένους κλάδους.</p> <p>Ο ψεκασμός των πεσμένων φύλλων με σκευάσματα που περιέχουν τους ανταγωνιστικούς μύκητες <i>Athelia bombacina</i>, <i>Chaetomium globosum</i>, <i>Microsphaeropsis ochracea</i>.</p> <p>Θεραπευτικοί ψεκασμοί</p> <p>Στόχος η προστασία των ευπαθών ιστών των δένδρων (νεαρή βλάστηση, άνθη, νεαροί καρποί) από τις πρωτογενείς μολύνσεις.</p> <p>Ο χρόνος ψεκασμού ορίζεται από την θερμοκρασία του αέρα από τον χρόνο που μένουν βρεγμένα τα φύλλα και από την ύπαρξη ασκοσπορίων σε κάθε περιοχή.</p> <p>Επέμβαση στη πράσινη (το πράσινο μπουμπούκι έχει μήκος 1,5 cm) και στην ρόδινη κορυφή (τα άνθη χώρισαν μεταξύ τους, αλλά δεν άνοιξαν).</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΟΧΙ</p> <p>ΟΧΙ</p> <p>ΝΑΙ</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΟΧΙ</p>	<p>Επιτυγχάνεται η καταστροφή των περιθηκίων από όπου ελευθερώνονται τα ασκοσπόρια.</p> <p>Για τη μείωση του μολύσματος που θα δώσει τις πρωτογενείς μολύνσεις την άνοιξη.</p> <p>Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου.</p> <p>Ο υπολογισμός του χρόνου μόλυνσης γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Mills στον οποίο για κάθε θερμοκρασία αέρος καταγράφεται ο χρόνος που τα φύλλα απαιτείται να είναι βρεγμένα για να έχουμε μολύνσεις και ο χρόνος επώασης (π.χ. για θερμοκρασία 16-24°C που είναι η άριστη για μολύνσεις ο χρόνος διαβροχής των δένδρων πρέπει να είναι 9 ώρες και η επώαση διαρκεί 9-10 ημέρες).</p> <p>Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του χρόνου επέμβασης με τον κανόνα του Mills</p>
--	--	--	---

<p>Ωίδιο Παθογόνος μύκητας <i>Podosphaera leucotricha</i> α.μ <i>Oidium farinosum</i>.</p> <p>Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα Αφαίρεση με χειμερινό κλάδεμα όλων των προσβεβλημένων κλάδων.</p> <p>Χειμερινός ψεκασμός των προσβεβλημένων κλάδων.</p> <p>Το πρόγραμμα ψεκασμού είναι το ίδιο με την αντιμετώπιση του Φουζικλαδίου.</p> <p>Βιολογική αντιμετώπιση Με το υπερπαράσιτο μύκητα <i>Ampelomyces quisqualis</i>.</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>OXI</p>	<p>NAI</p> <p>OXI</p> <p>NAI</p>	<p>Προσβάλλει τα φύλλα, τους οφθαλμούς, τους τρυφερούς βλαστούς, τα άνθη και τους καρπούς.</p> <p>Ο μύκητας διαχειμάζει ως μυκήλιο στα προσβεβλημένα μέρη του δένδρου και η αφαίρεση αυτών μειώνει τις πρωτογενείς μολύνσεις την άνοιξη.</p> <p>Μειώνει τις πρωτογενείς μολύνσεις.</p> <p>Βασίζεται στην κάλυψη των ίδιων ευπαθών βλαστικών σταδίων.</p> <p>Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου.</p>
<p>Φαιά σήψη Παθογόνος μύκητας <i>Monilinia laxa</i> α.μ. <i>Monilia laxa</i></p> <p>Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα Κλαδεύονται και καίγονται οι προσβεβλημένοι κλαδίσκοι και κλάδοι των δένδρων πριν πέσουν τα φύλλα.</p> <p>Παρασιτική μολύβδωση ή αργύρωση Παθογόνος μύκητας <i>Stereum purpureum</i></p> <p>Καλλιεργητικά μέτρα Καταστροφή με φωτιά των εστιών μόλυνσης (ξηρά δένδρα ή κορμοί πλησίον του οπωρώνα, πάσσαλοι υποστύλωσης).</p>	<p>NAI</p>	<p>NAI</p>	<p>Προκαλεί νεκρώσεις και ξηράνσεις στα άνθη, στους κλάδους, κλαδίσκους και φύλλα και σήψεις στους καρπούς. Περιορίζει στο ελάχιστο τα μολύσματα για τις πρωτογενείς μολύνσεις την άνοιξη. Ο μύκητας διαχειμάζει ως μυκήλιο ή κονίδια στους αποξηραμένους κλαδίσκους που φέρουν επάνω μουμιοποιημένους καρπούς.</p>

<p>Εξελκώσεις βραχιόνων Παθογόνοι μύκητες <i>Cylindrocarpon mali</i>, <i>Sphaeropsis malorum</i>, <i>Pezizula malicorticis</i>, <i>Phomopsis mali</i>. Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων μικρών βλαστών. Στη περίπτωση χονδρών κλάδων όταν ο καιρός είναι ξηρός ο καθαρισμός ελκών και η κάλυψη των πληγών με αλοιφές.</p>		NAI	NAI	Για τον περιορισμό των εστιών μόλυνσης της ασθένειας.
<p>Μαύρη κηλίδωση Παθογόνος μύκητας <i>Alternaria alternata</i> και <i>Stemphylium vesicarium</i>. Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν ορισμένες ευπαθείς ποικιλίες. Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα Παράχωμα των φύλλων στο έδαφος. Καταστροφή προσβεβλημένων καρπών. Περιορισμός της υγρασίας. Αντικατάσταση των ευπαθών ποικιλιών με ανθεκτικές. Ψεκασμοί Όπου δεν ελέγχεται η ασθένεια με καλλιεργητικά μέτρα γίνονται ψεκασμοί με μυκητοκτόνα.</p>		NAI	NAI	Προσβάλλονται κυρίως τα φύλλα, οι καρποί και οι πράσινοι βλαστοί.
<p>Βακτηριακό κάψιμο Οφείλεται στο βακτήριο <i>Erwinia amylovora</i>.</p> <p>Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα</p> <ul style="list-style-type: none"> • Αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων, 		NAI	NAI	Μαυρίζει τις ταξιανθίες, τα φύλλα, τους βλαστούς. Η προσβολή εκτείνεται στους κλάδους, βραχίονες ή και τον κορμό των δένδρων. Είναι δυνατόν μέσα σε λίγους μήνες να ξηράνει παραγωγικά δένδρα. Μείωση των πρωτογενών μολύνσεων.

<p>κλαδίσκων και των ελκών που σχηματίζονται σε χονδρούς κλάδους ή κορμούς των δένδρων ή αυτοφυών ξενιστών. Τα έντονα προσβεβλημένα δένδρα πρέπει να εκριζώνονται και να καίγονται.</p> <ul style="list-style-type: none"> εβδομαδιαία επιθεώρηση στον οπωρώνα και αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων μαζί με υγιές τμήμα μήκους 20-25 cm. τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται κατά τη διάρκεια εργασίας. σε περίπτωση χαλαζόπτωσης αμέσως ψεκασμός με χαλκούχα. <p>Ψεκασμοί Ψεκασμός με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα αφού αφαιρεθούν τα προσβεβλημένα μέρη μετά την πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής</p> <p>Βιολογική αντιμετώπιση Ψεκασμός με βιολογικά σκευάσματα ανταγωνιστικών βακτηρίων <i>Pseudomonas fluorescens</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Pantoea agglomerans</i>.</p> <p>Ανθεκτικές ποικιλίες Ανθεκτικές ποικιλίες αναφέρονται οι: Delicious, Golden Delicious, Starking Delicious, Granny Smith Priam κ.λ.π.</p> <p>Βακτηριώση οφειλόμενη στο <i>Pseudomonas syringae</i> Διαχειμάζει ανάμεσα στα λέπια των οφθαλμών.</p> <p>Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>OXI</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>Για τον περιορισμό των δευτερογενών μολύνσεων.</p> <p>Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας.</p> <p>Οι πληγές από το χαλάζι είναι σημεία εισόδου και εγκατάστασης του παθογόνου στο δένδρο</p> <p>Για τον παραπέρα περιορισμό του μολύσματος από έλκη που παρέμειναν στα δένδρα.</p> <p>Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου.</p> <p>Προκαλεί αποξηράνσεις ανθέων, ταξιανθιών, οφθαλμών, κλαδίσκων και κηλιδώσεις φύλλων και καρπών. Ευνοϊκές συνθήκες για τις μολύνσεις είναι η θερμοκρασία 12-20°C, βροχερός καιρός, ιδίως όταν συνοδεύεται με άνεμο. Ο άνεμος και η ισχυρή βροχή δημιουργούν πληγές στα φύλλα και τους καρπούς.</p>
---	---	---	--

Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά των έντονα προσβεβλημένων βλαστών. Επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα με την εμφάνιση των κλειστών ανθέων.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Μειώνει της πρωτογενείς μολύνσεις.
--	-----	-----	------------------------------------

<u>Περίοδος ανθοφορίας - καρπόδεσης</u>	<u>ΕΦΑΡΜΟΓΗ</u>		<u>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</u>
<u>ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ</u>	<u>ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ</u> ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	<u>ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ</u> ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<u>Ειδικές οδηγίες</u> <u>Ασθένειες</u> Φαιά σήψη (Μονίλια) <p>Επέμβαση κατά την πλήρη άνθιση. Επιπλέον ψεκασμοί μπορεί να χρειασθούν σε περίπτωση βροχερού και ψυχρού καιρού οπότε η άνθηση παρατείνεται.</p>			Το ευαίσθητο σημείο προσβολής είναι τα άνθη και ιδίως όταν η σχετική υγρασία είναι 90% ή υψηλότερη και η θερμοκρασία 5-27 °C.
<u>Φουζικλάδιο και Ωίδιο</u> <p>Συνιστάται συνδυασμένη καταπολέμηση:</p> <p>Επέμβαση σύμφωνα με τον κανόνα του Mills ή στο 75% της πτώσης των πετάλων</p>	OXI NAI	NAI OXI	Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισμού του χρόνου επέμβασης με τον κανόνα του Mills
Βακτηρίωση οφειλόμενη στο <i>Pseudomonas syringae</i> <p>Ψεκασμός την περίοδο της άνθισης με εγκεκριμένα σκευάσματα ανταγωνιστικών βακτηρίων</p>	OXI	NAI	Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου.

Περίοδος καρπόδεσης (στάδια G – I)	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<p>Ειδικές οδηγίες Εντομολογικοί Εχθροί</p> <p>Καρπόκαψα</p> <p>Με τις πρώτες συλλήψεις (1^η πτήση) αρχίζει η ωοτοκία που θα δώσει την 1^η γενιά. Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J)</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Βιολογική καταπολέμηση: <ul style="list-style-type: none"> • Η εισαγωγή παρασιτοειδών <i>Trichogramma platneri</i> είναι ελπιδοφόρα ➤ Βιολογικά σκευάσματα: <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων που 			<p>Τα ωά εναποτίθενται από το ενήλικο στα φύλλα και κοντά στους νέους καρπούς και οι εκκολαφθείσες προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς από τον κάλυκα. Η νεαρή προνύμφη πριν μπει στον καρπό είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου.</p>

<p>ανήκει στο γένος Granulovirus (<i>cydia pomonella granulosis virus</i>, GpGV) όταν συμπληρωθούν 87,8 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου</p> <p>➤ Χημικά σκευάσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση όταν συμπληρωθούν 32,2 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση αυγών • Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση όταν συμπληρωθούν 87,8 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου <p>Κόκκινος τετράνυχος</p> <p>Μετά την άνθηση το άκαρι μετακινείται στα φύλλα, όπου τρέφεται και ωτοκεί.</p> <p>Παρακολούθηση:</p> <p>Εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.</p> <p>Όρια επέμβασης:</p> <p>20-30 ακάρεα / φύλλο ανάλογα με την ποικιλία, την ηλικία και την κατάσταση των δέντρων</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>OXI</p> <p>OXI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>άθροισης ημεροβαθμών, να προσεχθεί το γεγονός ότι η σύζευξη λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία κατά την δύση του ηλίου είναι $\geq 15^{\circ}\text{C}$, η σχετική υγρασία $\geq 60\%$, η ταχύτητα του ανέμου $\leq 2\text{-}3$ μέτρα ανά δευτερόλεπτο και απουσία βροχής</p> <p>Περίοδος προωοτοκίας, έναρξη εναπόθεσης αυγών. Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων</p> <p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών</p>
--	---	---	---

<p>Φυλλοδέτης</p> <p>1^η πτήση του εντόμου</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Βιολογική καταπολέμηση: <ul style="list-style-type: none"> • Αυτή την εποχή δεν έχουν καταγραφεί φυσικοί εχθροί. ➤ Βιολογικά σκευάσματα: <ul style="list-style-type: none"> • Για την βιολογική γεωργία επιτρέπεται η εφαρμογή σκευασμάτων που περιέχουν <i>bacillus thuringiensis</i> όταν συμπληρωθούν 90 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου ➤ Χημικά σκευάσματα: <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση 3 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση αυγών • Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση όταν συμπληρωθούν 90 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου <p>Ξυλοφάγα (Κόσσος, Σέζια, Ζευζέρα)</p> <p>Κόσσος (<i>Cossus cossus</i> Linnaeus (Lepidoptera: Cossidae))</p> <p>Συμπληρώνει 1 γενιά κάθε 2-3 έτη. Διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη προνύμφη μέσα στη στοά</p> <p>Σέζια (<i>Synanthedon myopaeformis</i>)</p>	OXI	NAI	NAI	OXI	OXI	OXI	OXI	<p>Υποχρεωτική χρήση βιολογικού σκευασμάτος στις ειδικές οδηγίες για την 1^η πτήση</p> <p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών. Κατώτερη θερμοκρασία ουδός $T_{ou} = 7,3^{\circ}$ C. Συστήνεται η χρήση φαγοδιεγερτικού ή ζάχαρης.</p> <p>Έναρξη εναπόθεσης αυγών</p> <p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών</p> <p>Εξασθένηση δένδρων Ξήρανση κλάδων αλλά και ολόκληρων δένδρων</p>
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

<p>Borkhausen (Lepidoptera: Sesiidae)</p> <p>Συμπληρώνει 1 γενεά /έτος. Διαχειμάζει ως προνύμφη διαφόρων σταδίων μέσα στη στοά της</p> <p>Ζευζέρα (Zeuzera pyrina Linnaeus (Lepidoptera: Cossidae))</p> <p>Συμπληρώνει 1 γενιά κάθε 2-3 έτη. Διαχειμάζει ως προνύμφη μέσα στον κορμό του δένδρου</p> <p>Παρακολούθηση ξυλοφάγων: Ανάρτηση φερομονικών παγίδων για την Σέζια στο τέλος Απριλίου, για τον Κόσσο στα μέσα Μαΐου και για την Ζεύζερα αρχές Ιουνίου.</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Καλλιεργητικά μέτρα: <ul style="list-style-type: none"> • καλή συμφωνία εμβολίου – υποκειμένου • προστασία τομών κλαδέματος • όψιμο κλάδεμα • αφαίρεση των βραχιόνων, κλάδων και βλαστών που έχουν στοές με προνύμφες • Θανάτωση της προνύμφης μηχανικά με σύρμα που εισάγεται στη στοά • ασβεστόχρηση του κορμού και βραχιόνων 	NAI	NAI	NAI
--	-----	-----	-----

Περίοδος αύξησης καρπού - ωρίμανσης	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
Ειδικές οδηγίες Ασθένειες Φουζικλάδιο <p>Συνήθως το καλοκαίρι δεν παρατηρούνται νέες προσβολές.</p> <p>Αν όμως το καλοκαίρι είναι βροχερό και δροσερό για την προφύλαξη των καρπών πρέπει οι ψεκασμοί να συνεχιστούν ανά 15 μέρες ή όταν η υπηρεσία προειδοποιήσεων κάθε περιοχής δώσει οδηγίες για την εκτέλεση ψεκασμού.</p>			<p>Ο μύκητας σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 24° C αδρανοποιείται.</p> <p>Ο χρόνος ψεκασμού μπορεί να προβλεφθεί σύμφωνα με τον κανόνα του Mills αρκεί να έχουμε την καταγραφή των στοιχείων της θερμοκρασίας αέρος, του χρόνου διαβροχής των φύλων και της ύπαρξης κονιδίων στην περιοχή.</p>
Ωίδιο <p>Οι μολύνσεις είναι δυνατόν να συνεχισθούν όλο το καλοκαίρι αν υπάρχουν ευπαθείς ιστοί (φύλλα μέχρις ηλικίας 14-17 ημερών) και οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του μύκητα (υψηλή σχετική υγρασία).</p>			

Να αποφεύγονται οι καλλιεργητικές εργασίες: οι υπερβολικές λιπάνσεις και τα άσκοπα ποτίσματα.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Παρατείνουν την τρυφερή βλάστηση. Οι καλοκαιρινοί ψεκασμοί εναντίον του φουζικλάδιου καλύπτει τους ευπαθείς ιστούς και από το ωίδιο.
Φαιά σήψη Αποφεύγονται οι τραυματισμοί των καρπών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Οι καρποί μολύνονται από πληγές εντόμων, χαλάζης. Οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ασθένεια είναι σχετική υγρασία 90% ή υψηλότερη και θερμοκρασία 5-27° C.
Παρασιτική μολύβδωση ή αργύρωση Αφαίρεση όλων των κλάδων που το ξύλο τους είναι μεταχρωματισμένο κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Οι τομές κλαδέματος πρέπει να καλύπτονται με κατάλληλο απολυμαντικό. Βιολογική αντιμετώπιση Έγχυση του αιωρήματος <i>Trichoderma viride</i> στον κορμό του δένδρου. Αποτελεσματική σε μη προχωρημένες προσβολές. Το αιώρημα χρησιμοποιείται και στην επάλειψη των τομών.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	Κατά την περίοδο αυτή στις προσβεβλημένες τομές υπάρχει κόμμι που εμποδίζει την εξάπλωση του παθογόνου.
Βακτηριακό κάψιμο Την περίοδο αυτήν όπως και την άνοιξη συνιστάται εβδομαδιαία επιθεώρηση του οπωρώνα και αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων, μαζί με υγιές τμήμα μήκους 20-25cm. Ταυτόχρονα να γίνεται απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης να γίνεται αμέσως μετά ψεκασμός με χαλκούχα. Καταπολέμηση εντόμων. Αποφυγή άσκοπων λιπάνσεων και ποτισμάτων. Βιολογική αντιμετώπιση Με σκευάσματα ανταγωνιστικών βακτηρίων και σκευάσματα που προκαλούν τη διέγερση των μηχανισμών άμυνας.	ΟΧΙ	ΝΑΙ	Για τον περιορισμό των δευτερογενών μολύνσεων. Οι πληγές από το χαλάζι είναι σημεία εισόδου του παθογόνου. Μεταφέρουν το μόλυσμα της ασθένειας. Παρατείνουν την βλάστηση ευπαθών τρυφερών ιστών. Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου.

Περίοδος αύξησης καρπού - ωρίμανσης	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
Ειδικές οδηγίες Εντομολογικοί Εχθροί <u>Ψώρα του San Jose</u> Εμφανίζονται προνυμφικά στάδια τριών γενεών (Μάιος–Ιούνιος, Ιούλιος–Αύγουστος, Σεπτέμβριος–Οκτώβριος). Ειδική καταπολέμηση συνίσταται κυρίως εναντίον των ερπουσών της πρώτης γενεάς σε οπωρώνες που δεν έγινε εφαρμογή εναντίον της διαχειμάζουσας γενεάς ή αυτή δεν ήταν αποτελεσματική και παρουσίαζαν έντονες προσβολές. Χρόνος επέμβασης: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Εάν η παρακολούθηση έγινε με χρήση φερομονικών παγίδων, επέμβαση όταν συμπληρωθούν 350 ημεροβαθμοί από την πρώτη σύλληψη ενήλικου αρσενικού. ➤ Εάν η παρακολούθηση έγινε με χρήση κολλητικών παγίδων, επέμβαση όταν συμπληρωθούν 120 ημεροβαθμοί από την πρώτη σύλληψη έρπουσας προνύμφης. Αντιμετώπιση	NAI	NAI	
	NAI	NAI	Κατώτερη θερμοκρασία ουδός $T_{ou} = 10,5^{\circ}\text{C}$. Ανώτερη θερμοκρασία ουδός $T_{ou} = 32,2^{\circ}\text{C}$

<p>➤ Χημικά σκευάσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων σε συνδυασμό με επέμβαση άλλων εχθρών. Μόνο σε σοβαρές προσβολές συστήνεται ξεχωριστή επέμβαση <p>Ξυλοφάγα (Κόσσος, Σέζια, Ζευζέρα) Υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης επέμβασης για την καταπολέμηση της Καρπόκαψας (2^η και 3^η πτήσης) εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν.</p> <p>Σέζια Σε οπωρώνες με προσβολές από το ξυλοφάγο αυτό έντομο, να γίνει επέμβαση στο μέγιστο των συλλήψεων στις παγίδες (πολλές φορές η πτήση παρουσιάζει μεγάλη διάρκεια και δύο μέγιστα, οπότε απαιτούνται 2 επεμβάσεις).</p> <p>Για τον Κόσσο, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό στη βάση του δένδρου και γύρω από το λαιμό</p> <p>Για τη Ζευζέρα, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.</p> <p>Φυλλορύκτες, νάρκη των γιγαρτοκάρπων <i>Phyllonorycter (Lithocelitis) blancardella (F)</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) <i>Phyllonorycter (Lithocelitis) corylifoliella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) <i>Leucoptera malifoliella</i> (Lepidoptera Lynoteiidae)</p> <p>Έχουν 3-4 γενεές/ έτος Διαχειμάζουν ως νύμφη σε βομβύκιο μέσα στην προνυμφική στοά στα πεσμένα φύλλα.</p> <p>Η ζημιά δεν είναι πάντοτε μεγάλη παρά μόνο όταν ο πληθυσμός</p>	NAI	NAI	Στοχεύει στην καταπολέμηση των ευαίσθητων ερπουσών προνυμφών
	NAI	NAI	Ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες.
	NAI	NAI	Και τα 3 είδη προκαλούν στοές που διαφέρουν μεταξύ τους στο σχήμα μέσα στα φύλλα και έχουν αποτέλεσμα τη μείωση της

<p>είναι μεγάλος. Τα έντομα αυτά δεν είναι οικονομικής σημασίας παρά μόνον εάν θανατωθούν οι φυσικοί εχθροί από την χρήση εντομοκτόνων,</p> <p>Παρακολούθηση:</p> <p>Χρήση φερομονικών παγίδων. Ενδιαφέρει μόνο η 2^η και 3^η γενεά (πτήση).</p> <p>Όρια επέμβασης - δειγματοληψία:</p> <p>Λαμβάνουμε 4 τυχαία φύλλα από το μέσο των βλαστών 25 δένδρων (σύνολο 100 φύλλα). Καταμετρούμε τις νέες στοές διαμέτρου 0,5 εκ. Αν διαπιστώσουμε πάνω από 500 νέες στοές (μέσος όρος 5 στοές ανά φύλλο) δικαιολογείται επέμβαση</p> <p>Συνήθως δεν απαιτούνται ειδικές επεμβάσεις και αρκεί η συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.</p> <p>Αφίδες</p> <p>Συνήθως δεν απαιτείται ξεχωριστή επέμβαση. Οι όψιμες προσβολές να αντιμετωπίζονται με κόψιμο και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδίσκων ή με κατά θέσεις ψεκασμούς. Μόνο σε περιπτώσεις έντονης προσβολής (10%) δικαιολογείται επέμβαση με ειδικό αφιδοκτόνο σκεύασμα στο σύνολο του οπωρώνα</p> <p>Καρπόκαψα</p> <p>2^η και 3^η πτήση του εντόμου</p> <p>Αντιμετώπιση</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p>	<p>φωτοσυνθετικής ικανότητάς τους.</p> <p>Δειγματοληψία 15-20 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων στις παγίδες για την 2^η γενεά και 10-15 ημέρες για την 3^η γενεά</p> <p>Διότι οι φυσικοί εχθροί του εντόμου και σε συνδυασμό με τα μέτρα εναντίον άλλων πια σοβαρών εχθρών της καλλιέργειας κρατούν τον πληθυσμό σε χαμηλά επίπεδα.</p> <p>Με την αποφυγή ψεκασμών από την ανθοφορία μέχρι τέλη Μαΐου αναπτύσσονται ικανοποιητικοί πληθυσμοί φυσικών εχθρών των αφίδων</p> <p>Οι νεοεκκολαφθείσες προνύμφες ψάχνουν</p>
--	-----------------------	-----------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Καλλιεργητικά μέτρα: <ul style="list-style-type: none"> • Σωστό αραίωμα καρπών (2^η γενιά) ➤ Βιολογική καταπολέμηση: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trichogramma platneri</i> ➤ Βιολογικά σκευάσματα: <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων που ανήκει στο γένος <i>Granulovirus</i> (<i>cydia pomonella granulosis virus</i>, GpGV) όταν συμπληρωθούν 87,8 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου ➤ Χημικά σκευάσματα: <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση όταν συμπληρωθούν 32,2 από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση αυγών • Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση όταν συμπληρωθούν 87,8 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου 	NAI	NAI	<p>προφυλαγμένες θέσεις, συνήθως σημεία επαφής των καρπών μεταξύ τους. Επίσης, βελτιώνεται η κάλυψη των καρπών κατά τον ψεκασμό.</p> <p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών</p> <p>Έναρξη εναπόθεσης αυγών</p> <p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών</p>
--	-----	-----	---

<p><u>Κόκκινος τετράνυχος</u></p> <p>Αναπτύσσονται 3-4 αλληλεπικαλυπτόμενες γενιές. Τα θηλυκά εναποθέτουν διαχειμάζοντα αυγά από τα τέλη Αυγούστου έως και τα τέλη Σεπτέμβριου με αρχές Οκτωβρίου</p> <p>Παρακολούθηση:</p> <p>Εβδομαδιαία δειγματοληψία 5 φύλλων / δέντρο, από 20 σημασμένα δέντρα.</p> <p>Όρια – Απόφαση επέμβασης:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Εάν καταμετρηθούν < 5 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και καθόλου παρουσία αρπακτικού, επανάληψη δειγματοληψίας μετά μία εβδομάδα. Εάν διαπιστωθεί παρουσία αρπακτικού, επανάληψη δειγματοληψίας μετά δύο εβδομάδες ➤ Εάν καταμετρηθούν 5-10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα, επανάληψη δειγματοληψίας μετά μία εβδομάδα. ➤ Εάν καταμετρηθούν > 10 ακάρεα κατά μέσο όρο / φύλλο και < 1 αρπακτικό / 10 ακάρεα, τότε επέμβαση <p><u>Φυλλοδέτης</u></p> <p>2^η και 3^η πτήση του εντόμου</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Καλλιεργητικά μέτρα: 	NAI	NAI	
--	-----	-----	--

<ul style="list-style-type: none"> Σωστό αραίωμα καρπών <p>➤ Βιολογική καταπολέμηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 3 είδη παρασιτοειδών. Το είδος <i>Bracon hebetor</i> (Hymenoptera: Braconidae) μόνο στις αρχές Ιουλίου, το είδος <i>Brachymeria rugulosa</i> (Hymenoptera: Chalcididae) όλη τη διάρκεια του θέρους και το είδος <i>Colpoclypeus florus</i> (Hymenoptera: Eulophidae) κυρίως τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. <p>➤ Βιολογικά σκευάσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Εφαρμογή σκευασμάτων που περιέχουν <i>bacillus thuringiensis</i> όταν συμπληρωθούν 90 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου <p>➤ Χημικά σκευάσματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση 2 ημέρες από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση αυγών Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση όταν συμπληρωθούν 90 ημεροβαθμοί από την αύξηση των συλλήψεων των αρσενικών ή διαπίστωση μαύρης κεφαλής στα αυγά ή διαπίστωση προνυμφών 1^{ου} σταδίου 				<p>Τα είδη <i>Bracon hebetor</i> και <i>Colpoclypeus florus</i> εκτρέφονται με επιτυχία σε εργαστηριακές συνθήκες</p>
	OXI		NAI	<p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών</p> <p>Οι προνύμφες πρέπει να φάνε από το διάλυμα, προτού εισέλθουν στο εσωτερικό του καρπού. Συστήνεται η χρήση φαγοδιεγερτικού ή ζάχαρης.</p>
	NAI		OXI	<p>Έναρξη εναπόθεσης αυγών</p>
	NAI		OXI	<p>Έναρξη εκκόλαψης αυγών</p>

Μετά την συγκομιδή - Χειμερινή περίοδος	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<p>Ειδικές οδηγίες Εντομολογικοί Εχθροί Καρπόκαψα, Φυλλοδέτης</p> <p>Απομάκρυνση ή/και καταστροφή καρπών που μένουν στον οπωρώνα μετά την συγκομιδή (είτε πάνω στα δέντρα είτε στο έδαφος, ακόμα και σε σωρούς στις άκρες)</p> <p>Τοποθέτηση λωρίδων κυματοειδούς χαρτιού γύρω από ορισμένους κορμούς δέντρων κυρίως της περιφέρειας και καταστροφή τους στη συνέχεια</p> <p>Σέζια Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν προσβολές από το έντομο αυτό, συνιστάται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου ψεκασμός ή επάλειψη του κορμού μέχρι ύψους 1,5μ με εγκεκριμένη δραστική ουσία.</p> <p>Ζευζέρα Αφαίρεση των βραχιόνων κλάδων και βλαστών που έχουν στοές με προνύμφες (υπάρχουν περιπτώματα). Θανάτωση της προνύμφης μηχανικά.</p>	NAI	NAI	Μείωση του πληθυσμού των επόμενων γενεών
	NAI	NAI	Δημιουργία καταφυγίων για τις προνύμφες που κατεβαίνουν να νυμφωθούν
	NAI	NAI	.

<u>Μετά την συγκομιδή - Χειμερινή περίοδος</u>	ΕΦΑΡΜΟΓΗ		ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	
<p>Ειδικές οδηγίες</p> <p>Ασθένειες</p> <p><u>Φουζικλάδιο</u></p> <p>Καλλιεργητικά μέτρα:</p> <p>Παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργανα, αφαίρεση και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδίσκων καθώς συλλογή και κάψιμο των πεσμένων φύλλων.</p> <p>Χημικά σκευάσματα:</p> <p>Σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται ψεκασμός των φύλλων (λίγο πριν αρχίσουν να πέφτουν) με ουρία 5% ή με ένα εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.</p>	NAI	NAI	Καταστροφή των αρχικών μολυσμάτων.
<p>Σήψεις καρπών</p> <p>Σταχτιά ή τεφρά σήψη (<i>Botrytis cinerea</i>)</p> <p>Κυανή σήψη (<i>Penicillium expansum</i>)</p> <p>Καπνιά (<i>Gloeodes pomigena</i>)</p> <p>Στιγμάτωση καρπών (<i>Scizothyrium pomi</i>)</p> <p>Αντιμετώπιση</p> <p>1) διατήρηση των οπωρώνων σε καλή υγιεινή κατάσταση.</p>	NAI	NAI	Παρεμπόδιση παραγωγής ασκοσπορίων, που θα αποτελέσουν αρχικά μολύσματα για τη νέα χρονιά.
	NAI	NAI	

<p>2) η συγκομιδή να γίνεται με ξηρό καιρό στο άριστο της ωρίμανσης . Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί κατά τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία, τη διακίνηση και αποθήκευση.</p> <p>3) λήψη μέτρων υγιεινής στα συσκευαστήρια και αποθήκες.</p> <p>4) διατήρηση των καρπών σε χαμηλές θερμοκρασίες, το συντομότερο δυνατό μετά την συγκομιδή.</p> <p>5) χρησιμοποίηση ανταγωνιστικών μικροοργανισμών ή μεταβολιτών τους.</p> <p>6) χημική επέμβαση στους καρπούς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να διατηρηθούν σε μεγάλο διάστημα μέσα στο ψυγείο.</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>OXI</p> <p>NAI</p>	<p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>OXI</p>	<p>Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος γρίγορης εξάπλωσης της ασθένειας με τραγικές απώλειες στην παραγωγή. Παρατηρείται από απλή υποβάθμιση της ποιότητας μέχρι τον μηδενισμό της εμπορικής αξίας του προϊόντος.</p>
<p>Εξελκώσεις βραχιόνων</p> <p>Το φθινόπωρο σε σοβαρές περιπτώσεις συνιστούνται 2 ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα</p> <p>α) λίγο πριν την πτώση των φύλλων</p> <p>β) όταν έχει πέσει το 50% των φύλλων.</p>	<p>NAI</p>	<p>NAI</p>	
<p>Φυτόφθορα</p> <p>Παθογόνο <i>Phytophthora cactorum</i>.</p> <p>Είναι ασθένεια του λαιμού, το παθογόνο βρίσκεται στο έδαφος ή μεταφέρεται από το φυτώριο.</p>			
<p>Αντιμετώπιση</p> <p>Καλλιεργητικά μέτρα</p> <p>Χρήση ανθεκτικών υποκειμένων.</p> <p>Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται σε 30-70cm από το έδαφος.</p>	<p>NAI</p>	<p>NAI</p>	<p>Είναι δύσκολη η καταπολέμησή του.</p> <p>Για να μην φθάνουν τα μολύσματα με σταγόνες νερού από το έδαφός στον</p>

<p>Η επάλειψη του κορμού των δένδρων μέχρι 1m από το έδαφος και λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με εγκεκριμένα σκευάσματα αργά το φθινόπωρο ή νωρίς την άνοιξη.</p> <p>Να μην έρχεται η βάση του κορμού των δένδρων σε επαφή με το νερό της άρδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατασκευή προχώματος γύρω από τον κορμό σε απόσταση 50cm και στην συνέχεια την κατασκευή άρδευσης.</p> <p>Καλή αποστράγγιση του οπωρώνα.</p> <p>Αποφυγή δημιουργίας πληγών στις ρίζες και το λαιμό των δένδρων όταν γίνονται καλλιεργητικές εργασίες.</p> <p>Εκρίζωση των έντονα προσβεβλημένων δένδρων μαζί με τις ρίζες τους και απομάκρυνσή τους από τον οπωρώνα.</p> <p>Προ της αντικατάστασης ασθενών από νέα δένδρα πρέπει να γίνεται απολύμανση εδάφους.</p> <p>Σε περίπτωση προσβολής σε αρχικό στάδιο συνιστάται η αφαίρεση και καταστροφή του μεταχρωματισμένου φλοιού και καμβίου μαζί με ζώνη υγιούς ιστού 5cm. Και στην συνέχεια απολύμανση της πληγής με εγκεκριμένα σκευάσματα.</p> <p>Απολύμανση του νερού της άρδευσης με θειϊκό χαλκό.</p> <p>Βιολογική καταπολέμηση Σκευάσματα με ανταγωνιστικούς μύκητες (π.χ. των γενών <i>Trichoderma</i> και <i>Gliocladium</i>) ή βακτηρίων.</p> <p>Χημική επέμβαση. Ριζοπότισμα των δένδρων ή επάλειψη του κορμού με</p>		OXI	NAI	<p>κορμό και τους κλάδους του εμβολίου.</p> <p>Είναι το ευαίσθητο μέρος του δένδρου από όπου γίνεται η προσβολή.</p> <p>Το νερό μεταφέρει το παθογόνο από προσβεβλημένα δένδρα σε γειτονικά υγιή.</p> <p>Η παρουσία νερού δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για την εξάπλωση της ασθένειας.</p> <p>Είναι σημεία εισόδου του παθογόνου στα δένδρα.</p> <p>Μειώνονται οι εστίες μολύνσεις.</p> <p>Για την αδρανοποίηση του μύκητα που πιθανόν να παρέμεινε στο έδαφος μετά την εκρίζωση των προσβεβλημένων δένδρων.</p> <p>Για θεραπευτικούς λόγους και τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας.</p> <p>Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου.</p>
---	--	-----	-----	---

κατάλληλο μυκητοκτόνο. Σηψιρριζίες Παθογόνα: <i>Armillaria mellea</i> και <i>Rosellinia necatrix</i> . Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα: Το χειμώνα συνήθως που το έδαφος είναι μαλακό εκριζώνονται και καίγονται τα παλιά δένδρα, οι θάμνοι, τα υπολείμματα των ξηρών δένδρων μαζί με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα. Να λαμβάνονται μέτρα για την καλή αποστράγγιση του εδάφους. Η κυδωνιά είναι ευπαθής στις σηψιρριζίες γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές όπου υπάρχει μόλυσμα. Συνιστάται η απομόνωση του προσβεβλημένου μέρους του αγρού από τον υπόλοιπο αγρό με μια τάφρο βάθους μισού μέτρου. Η απολύμανση του εδάφους ή το καλοκαίρι το έδαφος να σκαφτεί πολλές φορές για να εκτεθεί στις ηλιακές ακτίνες που επιταχύνουν την καταστροφή των παθογόνων. Η ηλιοαπολύμανση έδωσε καλά αποτελέσματα στη <i>Rosellinia necatrix</i> . Βιολογική καταπολέμηση: Ενθαρρυντικά αποτελέσματα πάρθηκαν όταν εφαρμόσθηκε η ηλιοαπολύμανση σε συνδυασμό με τον ανταγωνιστικό μύκητα <i>Trichoderma harzianum</i> .	NAI	NAI	O μύκητας <i>Armillaria</i> αναπτύσσεται σε ξυλώδη υποστρώματα. Ευνοούνται οι παθογόνοι μύκητες από τη μεγάλη εδαφική υγρασία. Η ασθένεια μεταφέρεται με το νερό μέσα στο έδαφος και με την επέκταση του ριζικού συστήματος σε μέρος του εδάφους που είναι μολυσμένο.
Χημική αντιμετώπιση: Γίνεται με ριζοποτίσματα για το <i>Rosellinia necatrix</i> .	OXI	NAI	Γιατί ο μύκητας αναπτύσσεται στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους. Ομοίως. Χρήση μικροοργανισμού κατά παθογόνου