



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16 - 6 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 186263

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 928 7161  
e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

Προς Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.  
Σωρού 18-20  
Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 6174  
οριστικής έγκρισης διάθεσης στην  
αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  
ANTRACOL 70 WP (μυκητοκτόνο)  
ως προς το φάσμα δράσης, τις φράσεις  
ασφαλείας (S) και τα μεγέθη  
συσκευασιών ”

- Κοιν :
1. Γραφείο Υπουργού  
κας. Α. Μπατζελή
  2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Μ. Καρχιμάκη
  3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους
  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
  5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους
  6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
  7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
  8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Η**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (6) και το Παράρτημα VI.
2. Την Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 127236/16-3-2009 με την οποία διαμορφώθηκε η με αριθμό 6174 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ANTRACOL 70 WP όπως αυτή ισχύει σήμερα
3. Τη γνωμοδότηση για το 13<sup>ο</sup> θέμα της 1<sup>ης</sup> /27-4-2010 συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α' /7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β' /1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη»
6. Την από 24-4-2009 ένσταση και την από 4-5-2010 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε..

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**A**

Τροποποιούμε την οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, άρθρο 4 παρ.(6), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ANTRACOL 65 WP της εταιρείας Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε, που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. **127236/16-3 – 2009** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης και τις φράσεις ασφαλείας (S): και τα μεγέθη συσκευασιών

**Συγκεκριμένα**

**A) Το σημείο 2 διαμορφώνεται ως εξής:**

**2**

**Συσκευασίες:**

**2.2** Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 10)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα	400 γρ., 500 γρ., 1 κιλού ,10 κιλών και 25 κιλών	paper/LDPE/Al/LDPE
2.	Σακούλα εντός χαρτοκουτίου	400 γρ., 500 γρ., 1 κιλού, 10 κιλών και 25 κιλών	paper / LDPE inner bag σε χάρτινο κουτί

**B) Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:**

<b>5</b>		5.1 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο**
		Γρ./Στρέμμα	Γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα/στρέμμα		
Μηλιά - *	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> ) ( <i>Venturia pyrina</i> )	120-225	150	80-150	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν από την άνθηση και ένας μετά από την άνθηση	Μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-21 ημέρες
-Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )	120-200	200	60-100	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος πριν και δύο μετά την άνθηση.*	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες.
-Τομάτα (Υπαίθρου)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )  <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Cladosporium spp.</i> )	120-250 (Υ)	200-250	60-100 (Υ)	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Τομάτα (θερμοκηπίου)		120-300 (Θ)	200-250	60-120 (Θ)		
-Αγγούρι (Θερμοκηπίου)	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	100-120***	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
-Πατάτα	<b>Περονόσπορος</b>	200-250	-	50-100	Προληπτικοί	Μέχρι 4

	( <i>Phytophthora infestans</i> ) <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )				Ψεκασμοί φυλλώματος .	εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες.
-Πεπόνι -Καρπούζι	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημέρες.
-Καπνός	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Peronospora tabacina</i> )	200	200	100 (σπορείο)	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος στα σπορεία.	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
				80-240 (μετά τη μεταφύτευση)	Προληπτικά δύο ψεκασμοί φυλλώματος μετά τη μεταφύτευση.	+2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
Καλλωπιστικά	<b>Περονόσπορος</b> ( <i>Peronospora spp.</i> )  <b>Σκωρίαση</b> ( <i>Uromyces spp.</i> )	200	200	100	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος .	-

#### Παρατηρήσεις:

- \* Στο αμπέλι το διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού πριν την άνθηση και του πρώτου μετά την άνθηση να είναι 30 ημέρες
- \*\* Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.
- \*\*\* Στο αγγούρι ο μέγιστος όγκος νερού στο στρέμμα να εφαρμόζεται με τη μικρότερη δόση 200γρ/100 λιτ. νερό, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση 250 γρ/στρέμμα.
- Σε περίπτωση εφαρμογής με τρακτέρ σε χαμηλές καλλιέργειες η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 γρ. σκευάσματος στο στρέμμα.
- **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ANTARCOL 70 WP.**

Η χρήση στις καλλιέργειες μελιτζάνα υπαίθρου, μελιτζάνα θερμοκηπίου, κολοκυθάκι θερμοκηπίου, θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή

Μελιτζάνα (Υπαίθρου)	<b>Περνόςπορος</b> ( <i>Phytophthora infestans</i> )  <b>Αλτερναρίωση</b> ( <i>Alternaria solani</i> )  <b>Κλαδοσπορίωση</b> ( <i>Cladosporium spp.</i> )	120-250 (Υ)	200-250	60-100 (Υ)	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.
-Μελιτζάνα (θερμοκηπίου)		120-300 (Θ)	200-250	60-120 (Θ)		
Κολοκυθάκι (Θερμοκηπίου)	<b>Περνόςπορος</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200-250	200-250	100-120***	Προληπτικοί ψεκασμοί φυλλώματος.	Μέχρι 4 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες.

### Γ) Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

#### 11 Φράσεις S

**S1/2** Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
**S24** Αποφύγετε επαφή με το δέρμα.  
“Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα, μάσκα και προσωπίδα κατά την ανάμιξη/φόρτωση ή ψεκασμό”.  
“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό”.  
«Να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ πριν και μετά την εφαρμογή».

**S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.  
**S61** Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  
**SP1** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.  
**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες** από τα επιφανειακά ύδατα  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια ανέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων για τις υπόλοιπες καλλιέργειες** από τα επιφανειακά ύδατα.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

**Δ) Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:**

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Μηλιά	---
Αμπέλι	60 ημέρες
Τομάτα (Υ) Πατάτα (Υ)	14 ημέρες
Τομάτα (Θ)	28 ημέρες
Αγγούρι (Θ)	3 ημέρες
Πεπόνι (Υ) Καρπούζι (Υ)	7 ημέρες

Η παρακάτω τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή θα συμπληρωθεί όταν και εάν χορηγηθούν οι χρήσεις στις καλλιέργειες μελιτζάνα (υπαίθρου θερμοκηπίου), κολοκυθάκι θερμοκηπίου

Μελιτζάνα (Υ)	14 ημέρες
Μελιτζάνα (Θ)	28 ημέρες
Κολοκυθάκι (Θ)	3 ημέρες

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . **127236/16-3 – 2009** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **6174** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ANTRACOL 70 WP**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**

Ε) Το Έντυπο ορθής γεωργικής πρακτικής διαμορφώνεται ως εξής:

## Δ – 7 (GAP)

### ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικό (ά) Φάρμακο (ά) (κοινή ονομασία)

EEC No (α)

Εμπορικό (ά) όνομα (τα)

Κύρια χρήση π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: **Propineb**

:

**ANTRACOL 70 WP**

μυκητοκτόνο

Σελίδες :

Χώρα :

ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
					Μορφή	Περιεκτικότητα σε δ.ο	Μέθοδος/ Τρόπος	Στάδιο ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός εφαρμογών ν ελαχ. μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελαχ)	Χγρ. δ.ο/ εκατόλιτρο ελαχ. μεγ.	Λίτρα ψεκαστ. Υγρού/ εκτάριο ελαχ.μεγ.	Χγρ.δ.ο /εκτάριο ελαχ.μεγ		
(α)			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(ζ-η)	(ι)	(κ)					(λ)	(μ)
Καλλιέργεια και/ή συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή Χώρα	Εμπορικό Όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός,ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
Μηλιά	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis</i> ) ( <i>Venturia pyrina</i> )	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Δύο ψεκασμοί πριν και ένας μετά την άνθηση.	1-3	7-21	0.105	800 - 1500	0.84 - 1.575	---	
-Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	- <i>Plasmopara viticola</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Δύο ψεκασμοί πριν και δύο μετά την άνθηση.	1-4	7-14	0,14	600-1000	0,84-1,4	60	Διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού πριν την άνθηση και του πρώτου μετά την άνθηση 30



															ημέρες.
-Τομάτα	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	- <i>Phytophthora infestans</i> - <i>Alternaria solani</i> , - <i>Cladosporium spp.</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	7	0,14-0,175	600-1000	0,84-1,75	14	-
-Τομάτα	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	Θ	- <i>Phytophthora infestans</i> - <i>Alternaria solani</i> , - <i>Cladosporium spp.</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	7	0,14-0,175	600-1200	0,84-2,1	28	
-Αγγούρι	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	Θ	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	7	0,14-0,175	1000-1200	1,4-1,75	3	-
-Πατάτα	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	- <i>Phytophthora infestans</i> - <i>Alternaria solani</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	BBCH: 21-89	1-4	14	-	500-1000	1,4-1,75	14	-
-Πεπόνι -Καρπούζι	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	10	0,14-0,175	1000	1,4-1,75	7	-
-Καπνός	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	- <i>Peronospora tabacina</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Δύο ψεκασμοί στα σπορεία.	2	7	0,14	1000 (σπορείο)	1,4	7	-
								Δύο ψεκασμοί μετά τη μεταφύτευση.	+2	7	-	800-2400 (μετά τη μεταφύτευση)			
-Καλλωπιστικά	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	- <i>Peronospora spp.</i> - <i>Uromyces spp.</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	-	-	0,14	1000	1,4	-	-

Η χρήση στις καλλιέργειες μελιτζάνα υπαίθρου, μελιτζάνα θερμοκηπίου, κολοκυθάκι θερμοκηπίου θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ

-Μελιτζάνα	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	A	- <i>Phytophthora infestans</i> - <i>Alternaria solani</i> , - <i>Cladosporium spp.</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	7	0,14-0,175	600-1000	0,84-1,75	14	-
-Μελιτζάνα	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	Θ	- <i>Phytophthora infestans</i> - <i>Alternaria solani</i> , - <i>Cladosporium spp.</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	7	0,14-0,175	600-1200	0,84-2,1	28	
-Κολοκυθάκι	ΕΛΛΑΔΑ	ANTRACOL 70 WP	Θ	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	WP	700 g/kg	Ψεκασμός φυλλώματος	Προληπτικοί ψεκασμοί.	1-4	7	0,14-0,175	1000-1200	1,4-1,75	3	-

- Παρατηρήσεις:
- (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών).
  - (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
  - (γ) πχ. Μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
  - (δ) πχ. Βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
  - (ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
  - (στ) όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
  - (ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασμός υψηλού όγκου, σκονισμός.
  - (η) Τρόπος. Πχ σ' όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά – ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
  - (θ) g/kg ή g/lit
  - (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
  - (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατόν αριθμός εφαρμογών υπό πρακτικές συνθήκες
  - (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν τη συγκομιδή
  - (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία / περιορισμούς στη χρήση