



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 08 - 02 - 2010
Αριθ. πρωτ: 180950

Ταχ. Δ/νση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Προς: Quena Plant Protection N.V.,
Ολλανδικές Αντίλλες
(δια της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ)
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι
(με απόδειξη)

Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228

Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ.
Μπατζελή
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
κ. Μ. Καρχιμάκη
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
7604/29-2-2000 έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
GOLTIX 90 WG (ζιζανιοκτόνο) ως
προς τον παρασκευαστή και το
εργοστάσιο παρασκευής της
δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο
συσκευασίας του σκευάσματος, την
εγγυημένη σύνθεση και την
ημερομηνία λήξης του.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την αριθ. 132426/16-9-2009 (ΦΕΚ 2029/Β/21-9-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αργίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο, φωσφορούχο μαγνήσιο, cymoxanil, dodemorph, μεθυλεστεράς του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος, metamitron, sulcotrione, tebuconazole και triadimenol στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος υπ'

αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/125/ΕΚ της Επιτροπής της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2008.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α').
5. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 131669/26-8-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας Quena Plant Protection N.V., Ολλανδικές Αντίλλες (δια της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **7604** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **GOLTIX 90 WG** που χορηγήθηκε με την αριθ. 89096/29-2-2000 και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 97429/2-3-2004 και 117129/10-4-2007 Αποφάσεις μας, ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση και την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

7604

29-2-2000

28-2-2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

GOLTIX 90 WG

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Metamitron (χημική ομάδα: triazinones)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Metamitron: 96 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Producer 1:
FEINCHEMIE SCHWEBDA GmbH
Edmund Rumpler Strasse 6, Germany
Tel: +49-(0)2203-5039-0
Fax: +49-(0)2203-5039-0512

Producer 2:
Agan Chemical Manufacturers Ltd.
P.O. Box 262,
Northern Industrial Zone,
Ashdod 77102, Israel
Tel.: + 972 8 8515211
Fax: + 972 8 8522806

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Factory of producer 1(FCS):
Punjab Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.,
Ινδία

Factory of producer 2 (Agan):
Agan Chemical Manufacturers Ltd., Ισραήλ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metamitron όπως έχουν κατατεθεί κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρισης και προσδιορίζονται στο **Annex II - Doc J** της αίτησης με ημερομηνία 26-8-2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 131667) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Quena Plant Protection N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 34,
Curacao, Netherlands Antilles
Mr. David Hebel
Τηλ: 00599-9-738-4040
Fax: 00599-9-738-4005
E-mail: quena@macuracao.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: **211 120 5570**
Fax: **211 120 5572**
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
E-mail: technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης.
(Quena Plant Protection N.V.)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Quena Plant Protection N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 34,
Curacao, Netherlands Antilles
Mr. David Hebel
Τηλ: 00599-9-738-4040
Fax: 00599-9-738-4005
E-mail: quena@macuracao.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

Agan Chemical Manufacturers Ltd, Ισραήλ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Agan Chemical Manufacturers Ltd, Ισραήλ

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **Metamitron: 90 % β/β**
Βοηθητικές ουσίες: 6,25 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 29-3-2006 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 117417) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2

Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες:

| A/A | Είδος | Μέγεθος | Υλικό |
|-----|------------------------------------|---|---|
| 1 | Κουτιά με εσωτερικό σακίδιο | 500 γραμ. και 1, 2, 3 , (3,5), και 5 κιλών. | Κουτί χάρτινο με εσωτερικό σακίδιο από PE |
| 2 | Σακίδια | 500 γραμ. και 1, 2, 3 , (3,5), και 5 κιλών. | PE ή PET/PE ή PET/Αλουμίνιο/PE (η εσωτερική επίστρωση PE) |

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκάσμος του εδάφους με 35 - 40 λίτρα νερό / στρ. και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα (προφυτρωτική εφαρμογή) ή πότισμα (προσπαρτική). Το χωράφι πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένο (ψιλοχωματισμένο). Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (45 psi) με σταθερή ταχύτητα και υπό στενή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα φαρμάκου σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές διαλύστε το προϊόν στο βυτίο και μετά προσθέστε το λάδι.

Συνδυαστικότητα: Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές του GOLTIX δεν επιτρέπεται ανάμιξη κανενός εντομοκτόνου. Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη και εφαρμογή του GOLTIX με γαλακτωματοποιητές, προσκολλητικά ή διαβρέκτες, καθώς και με υγρά λιπάσματα

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι σακούλες και τα σακίδια ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση μονοετών, πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα | ΔΟΣΕΙΣ γραμ./στρ | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο |
|-----------------|--|----------------------------------|--|---|--|
| Ζαχαρότευτλα | Για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και ορισμένων αγρωστωδών ζιζανίων (5) | 35-40 | 380-540 για ελαφρά και μέσης σύστασης εδάφη 620-770 σε βαριά ή χουμώδη εδάφη. | α. Πριν την σπορά με ενσωμάτωση: Ομοιόμορφος ψεκάσμος του εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 2-3 εκ. με ελαφρύ φρεζάρισμα ή σβάρνισμα. (1) | 1 |
| | | 35-40 | 460 | β. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά: Ομοιόμορφος ψεκάσμος του εδάφους (2) | |

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | | 35-40 | <p>540 με 400-500 κ.εκ. λάδι σε ελαφρά και μέσης σύστασης εδάφη και</p> <p>620 με 400-500 κ.εκ. λάδι σε βαριά ή χουμώδη εδάφη(4)</p> | <p>γ. Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός μετά το φύτρωμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.(3)</p> |
|--|--|-------|--|--|

Παρατηρήσεις:

1. Η προσπαρτική εφαρμογή γίνεται σε γυμνό έδαφος κατά προτίμηση όταν το έδαφος είναι μέσης συστάσεως με έλλειψη επιφανειακής υγρασίας.
2. Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή ή τεχνητή βροχή.
3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική σε βαριά ή χουμώδη εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο GOLTIX. Από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα.
4. Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος των ζιζανίων και τον τύπο του εδάφους.

5. Τα κυριότερα καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Με **380** γρ./στρ. καταπολεμούνται καλά τα:

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Αγριοντοματιά ή Στύφνος | (<i>Solanum nigrum</i>) |
| Λουβουδιά | (<i>Chenopodium album</i>) |
| Καψέλλα | (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) |
| Χαμομήλι | (<i>Chamomilla recutita</i>) |
| Λάμιο | (<i>Lamium amplexicaule</i>) |
| Ανθέμιδα | (<i>Athemis arvensis</i>) |
| Στελλάρια | (<i>Stellaria media</i>) |
| Τσουκνίδα | (<i>Urtica urens</i>) |
| Λαψάνα | (<i>Lapsana communis</i>) |
| Γλυστρίδα | (<i>Portulaca oleracea</i>) |
| Ζωχός | (<i>Sonchus arvensis</i>) |
| Καλινσόγκα | (<i>Galinsoga parviflora</i>) |
| Χρυσάνθεμο | (<i>Chrysanthemum segetum</i>) |
| Πόα | (<i>Poa annua</i>) |

Με **540** γραμ./στρ. καταπολεμούνται καλά εκτός από τα παραπάνω τα:

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Βλήτα | (<i>Amaranthus retroflexus</i>) |
| Αγριοπιπεριά | (<i>Polygonum persicaria</i>) |
| Καπνόχορτο | (<i>Fumaria officinallis</i>) |
| *Βρούβα | (<i>Sinapis arvensis</i>) |
| Κενταύριο | (<i>Centaurea cyanus</i>) |
| *Ντατούρα | (<i>Datura stramonium</i>) |
| Παπαρούνα | (<i>Papaver rhoeas</i>) |

| | |
|--------------|---|
| *Ραπανίδα | (<i>Raphanus raphanistrum</i>) |
| Πολυκόμπι | (<i>Polygonum aviculare</i>) |
| Περδικούλι | (<i>Anagallis arvensis</i>) |
| Βερόνικα | (<i>Veronica hederifolia, V. persica</i>) |
| Αγριομενεξές | (<i>Viola tricolor</i>) |
| Αγριοκαλαγιά | (<i>Apera spica-venti</i>) |

(*) Αυτά τα είδη καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά.

Με **770 γραμμ./στρ.** καταπολεμούνται ικανοποιητικά εκτός από τα παραπάνω, τα:

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Κολλητσίδα | (<i>Galium aparine</i>) |
| Πολύγωνο | (<i>Polygonum convolvulus</i>) |
| *Αλεπονουρά | (<i>Alopecurus myosuroides</i>) |

Ανθεκτικά ζιζάνια:

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Ασπράγκαθο | (<i>Xanthium spinosum</i>) |
| Σκυλόχορτο | (<i>Mercurialis annua</i>) |
| Νεράγκαθο ή Κίρσιο | (<i>Cirsium arvense</i>) |
| Περικοκλάδα | (<i>Convolvulus arvensis</i>) |

Τα είδη Βλήτων (*Amaranthus blitoides, A. lividus*) και Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) δεν καταπολεμούνται, όμως σοκάρονται σε βαθμό που δεν αποτελούν έντονο πρόβλημα.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Ειδικές φράσεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις) :

- SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.
 SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
 SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
 SZ6 Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης, να μη χρησιμοποιηθούν άμεσα για άρδευση.
 SZ7 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα με τη φορά του ανέμου.
 SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
 SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε πολλές φορές τα ψεκαστικά μέσα με άφθονο νερό και απορρυπαντικό (τα φίλτρα και μπεκ χωριστά).

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργείων που ακολουθούν

SZ3 Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια (εκτός τεύτλων) πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 15 εκ.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Είναι απόλυτα εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.
Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.

9 Σήμανση σκευάσματος:

Xn – Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R22 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R50 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

11 Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
S29/35 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
« Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
Metamitron

| Φυτικά Προϊόντα | MRLs (mg/kg) |
|--|--------------|
| Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005. | |

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| | |
|--------------|-------------|
| Καλλιέργεια | PHI(ημέρες) |
| Ζαχαρότευτλα | - |

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 28-2-2012 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ