

## **V. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ**

ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.  
(Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Νάουσας)



**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

**ΑΛΚΥΩΝ**



**Γενικά:** Υβρίδιο που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Δεν είναι διαδεδομένο. Πρόκειται στην ουσία για γενετικό υλικό.

**Δένδρο:** Πολύ ζωντανό, ημιπλαγιόκλαδο.

**Άνθος:** Η άνθηση είναι μεσοπρώιμη, ανθίζει 25 ημέρες πριν τη Ferragnes.

Το άνθος της είναι ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες.

**Καρπός:** Απαλοκέλυφος. Το ποσοστό της ψίχας είναι περίπου 66%.

Το μέσο βάρος ψίχας είναι 1,35 gr.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

**ΔΡΕΠΑΝΩΤΟ**



**Γενικά:** Χρησιμοποιείται ως σπορόφυτο υποκείμενο αμυγδαλιάς με φυτά μέσης ζωηρότητας, αλλά μεγάλης ομοιομορφίας.

**Δένδρο:** Μέτριας ζωηρότητας, ημιορθόκλαδο.

**Άνθος:** Η άνθηση είναι πρώιμη, ανθίζει 32 ημέρες πριν τη Ferragnes.

**Καρπός:** Σκληροκέλυφος. Το ποσοστό της ψίχας είναι περίπου 24%.

## ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis*

### ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΡΥΔΑΤΟ



Καρυδάκι Μεγάλο



Καρυδάκι Σκληρό

**Συνώνυμα:** Καρυδάκι Μεγάλο ή Καρυδάκι Σκληρό.

**Γενικά:** Με την ονομασία αυτή οι κάτοικοι της Νήσου Λήμνου αναφέρονται σε δύο ποικιλίες: α) “Καρυδάκι μεγάλο” ή β) “Καρυδάκι σκληρό”.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της νήσου Λήμνου.


**Άνθος:** Το “Καρυδάκι μεγάλο” είναι οψιμανθές.

**Καρπός:** Ο καρπός του “Καρυδάκι μεγάλο” είναι μέσου μεγέθους, με κέλυφος μέσης σκληρότητας. Συγκομίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

Ο καρπός του “Καρυδάκι σκληρό” έχει σκληρό κέλυφος με διευρυμένη ραφή και συγκομίζεται εύκολα. Συγκομίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση επίσης.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

**ΛΗΜΝΟΥ ΑΦΡΑΤΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ**



**Συνώνυμα:** Καρυδάκι Αφράτο.

**Γενικά:** Με την ονομασία αυτή οι κάτοικοι της Νήσου Λήμνου αναφέρονται στην ποικιλία “Καρυδάκι αφράτο”.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της νήσου Λήμνου.

**Δένδρο:** Μέσης ζωηρότητας, πολύ παραγωγικό.

**Καρποφόρα όργανα:** Καρποφορεί σε σπερ.

**Καρπός:** Ο καρπός είναι σφαιρικού σχήματος και μικρού μεγέθους, με μαλακό κέλυφος.

Συγκομίζεται στα τέλη Αυγούστου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

**ΟΨΙΜΑΝΘΗΣ ΒΟΛΟΥ**



**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της περιοχής Μαγνησίας.

**Δένδρο:** Πολύ ζυηρό, ημιπλαγιόκλαδο.

**Άνθος:** Η άνθηση είναι όψιμη, ανθίζει μία ημέρα μετά τη Ferragnes.

**Καρπός:** Σκληροκέλυφος. Το ποσοστό της ψίχας είναι περίπου 34%. Το ποσοστό διπλών καρπών είναι μεγάλο, περίπου 30%.

Το μέσο βάρος ψίχας είναι 1,35 gr.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

**ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟ)**

**Συνώνυμα:** Συμμετρικό Σιατίστης.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Νομού Κοζάνης, περιοχή Σιάτιστας.

**Δένδρο:** Μέτριας ζωηρότητας, ημιορθόκλαδο.

**Άνθος:** Η άνθηση είναι μεσοόψιμη, ανθίζει 12 ημέρες πριν τη Ferragnes.

**Καρπός:** Απαλοκέλυφος, με ψίχα συχνά συρρικνωμένη ή ρυτίδωμένη. Το ποσοστό της ψίχας είναι περίπου 66%. Το ποσοστό διπλών καρπών είναι 6%.

Το μέσο βάρος ψίχας είναι 1,39 gr.



## **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

### **ΦΥΛΛΙΣ**



**Γενικά:** Υβρίδιο που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων. Προέρχεται από διασταύρωση των ποικιλιών Texas x Ανώνυμη Ιταλική.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Δεν είναι διαδεδομένο.

**Δένδρο:** Μικρής ζωηρότητας, ορθόκλαδο, με μικρή αντοχή στην ξηρασία.

**Άνθος:** Η άνθηση είναι όψιμη, ανθίζει δύο ημέρες πριν τη Ferragnes.

**Καρπός:** Σκληροκέλυφος. Το ποσοστό της ψίχας είναι περίπου 29%. Το ποσοστό διπλών καρπών είναι 4%.

Το μέσο βάρος ψίχας είναι 1,35 gr.

**ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ *Amygdalus communis***

**ΧΙΟΥ ΑΦΡΑΤΑ**



**Συνώνυμα:** Χίου, Χιώτικα.

**Γενικά:** Πιθανόν να πρόκειται για την ποικιλία “Χίου”.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της νήσου Χίου.


**Άνθος:** Η ποικιλία είναι πρωιμανθής.

**Καρπός:** Ημιαπαλοκέλυφος, με μικρού μεγέθους ψίχα.

Συγκομίζεται στα τέλη Αυγούστου και προτιμάται για την παρασκευή κουφέτων.

**ΑΧΛΑΔΙΑ** *Pyrus communis*

**ΑΧΤΣΕΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ**



**Συνώνυμα:** Αχτσές.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της νήσου Λήμνου.

**Δένδρο:** Ζηηρό και παραγωγικό.

**Καρπός:** Μετρίου μεγέθους, στρόγγυλος, με επιδερμίδα κίτρινη. Το χρώμα της σάρκας είναι λευκό με γλυκιά γεύση.

Συγκομίζεται στα μέσα Ιουνίου.

**ΑΧΛΑΔΙΑ** *Pyrus communis*

**ΜΠΑΣΔΟΥΒΑΝΙΚΟ**



**Συνώνυμα:** Μπασντουβάνικο, Μπασδουβάνικα.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Νομού Καστοριάς.

**Δένδρο:** Ζωηρό, παραγωγικό.

**Καρπός:** Μεγάλου μεγέθους, αχλαδόμορφος, με φλοιό με ανώμαλη επιφάνεια. Η επιδερμίδα του είναι πρασινοκίτρινη, το χρώμα της σάρκας λευκό και η γεύση του γλυκιά.

Συγκομίζεται στα τέλη Αυγούστου. Χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

**ΑΧΛΑΔΙΑ *Pyrus communis***

**ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΝΑΞΟΥ**



**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της νήσου Νάξου.

**Δένδρο:** Ζηρό και παραγωγικό.

**Καρπός:** Μεγάλου μεγέθους, αχλαδόμορφος. Η επιδερμίδα του είναι πράσινη, το χρώμα της σάρκας λευκό και η γεύση γλυκιά.

Συγκομίζεται μέσα Αυγούστου. Χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

## **ΒΕΡΥΚΟΚΚΙΑ *Prunus armeniaca***

### **ΙΚΑΡΙΑΣ**

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία του Νομού Σάμου και ιδιαίτερα της νήσου Ικαρίας.

**Δένδρο:** Μέτριου μεγέθους και παραγωγικό.

**Καρπός:** Μέτριου έως μεγάλου μεγέθους, ωοειδής και εκπύρηνος. Η επιδερμίδα του έχει κίτρινο χρώμα βάσεως και φέρει κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα του είναι κίτρινη.

Συγκομίζεται στις αρχές Ιουνίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

**Πυρήνας:** Γλυκός, βρώσιμος.

## **ΒΕΡΥΚΟΚΚΙΑ *Prunus armeniaca***

### **ΠΛΑΚΕΣ ΠΗΛΙΟΥ**

**Συνώνυμα:** Πλάκες, Καΐσι.

**Γενικά:** Με την ονομασία αυτή οι κάτοικοι του Πηλίου αναφέρονται σε τρεις ποικιλίες: α) “Πλάκες” (I), β) “Πλάκες” (II) και γ) “Πλάκες” (III) ή “Καΐσι”.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία του Νομού Μαγνησίας και ιδιαίτερα της περιοχής του Πηλίου.

**Καρπός:** α) “Πλάκες” (I) ο καρπός της οποίας είναι μεγάλος και πιεσμένος στα δύο ημισφαίρια.

Συγκομίζεται στις 20 Ιουνίου με 10 Ιουλίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

β) “Πλάκες” (II) ο καρπός της οποίας είναι αρκετά μεγάλος, πιεσμένος στα δύο ημισφαίρια και κοκκινωπός.

Συγκομίζεται στις 1 με 10 Ιουλίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

γ) “Πλάκες” (III) ή “Καΐσι” ο καρπός της οποίας είναι μέτριου μεγέθους, ωοειδής, με διακριτά τα δύο ημισφαίρια.

Συγκομίζεται στις 10 με 15 Ιουλίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

## **ΒΕΡΥΚΟΚΚΙΑ *Prunus armeniaca***

### **ΠΛΑΚΕΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία του Νομού Σερρών.

**Καρπός:** Μέσου μεγέθους, ελαφρώς επιμήκης και πεπλατυσμένος, με επιδερμίδα πορτοκαλόχρωη και λίγο ρόδινο επίχρωμα προς την ηλιαζόμενη πλευρά. Η σάρκα του έχει κίτρινο χρώμα, γλυκιά γεύση και πλούσιο άρωμα.

Ωριμάζει τον Ιούλιο.

**Πυρήνας:** Γλυκός και βρώσιμος.



## **ΒΕΡΥΚΟΚΚΙΑ *Prunus armeniaca***

### **ΤΖΕΡΤΖΕΛΑ ΠΗΛΙΟΥ**

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία του Νομού Μαγνησίας και ιδιαίτερα της περιοχής του Πηλίου.

**Δένδρο:** Μεγάλου μεγέθους.

**Καρπός:** Μικρού μεγέθους, ωοειδής, κίτρινου χρώματος, με γλυκιά γεύση και μικρή περιεκτικότητα σε χυμό.

Ωριμάζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

**Πυρήνας:** Σχήματος ωοειδούς προς επιμήκους, μεγάλου προς μέτριου μεγέθους.

Η σύμφυσή του με τη σάρκα είναι μέτρια έως χαλαρή.

## **ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ *Prunus domestica***

### **ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ**

**Συνώνυμα:** Μαύρα Ξινά Αγίου Όρους.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της περιοχής Χαλκιδικής και ιδιαίτερα του Αγίου Όρους.

**Καρπός:** Μέσου μεγέθους, ωοειδής, με κοντό και χοντρό ποδίσκο. Έχει κιτρινορόδινη γυαλιστερή επιδερμίδα με πολυάριθμα πυκνά κόκκινα στίγματα. Η σάρκα είναι κίτρινη και πολύ ξινή.

Ωριμάζει Αύγουστο – Σεπτέμβριο και χρησιμοποιείται κυρίως για αποξήρανση.

Είναι καλός επικονιαστής της ποικιλίας Σκοπέλου.

**ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ** *Prunus domestica*

**ΜΠΕΡΕΚΕΤΙΑ**



**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ελληνική ποικιλία, διασπαρμένη σε διάφορες περιοχές της χώρας μας και σε διάφορες παραλλαγές.

**Καρπός:** Σφαιρικού σχήματος, μετρίου μεγέθους, που φέρει μακρύ και λεπτό ποδίσκο. Χρώμα επιδερμίδας ανοιχτού ήλεκτρου, με σάρκα πολύ γλυκιά και αρωματώδη, εκπύρηνο.

Ωριμάζει στα τέλη Ιουλίου και είναι κατάλληλα για ζαχαροπλαστική.

## **ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ *Prunus domestica***

### **ΓΑΪΔΟΥΡΟΔΑΜΑΣΚΗΝΑ**

**Συνώνυμα:** Γαΐδουροδαμάσκηνο.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Νομού Καστοριάς.

**Δένδρο:** Ζωηρό, ορθόκλαδο, μετρίου μεγέθους, μικρής παραγωγικότητας.

**Καρπός:** Επιμήκης ωειδής, με πλατιά αυλακωτή κοιλιακή ραφή που του προσδίδει σχήμα όρχεων, πολύ μεγάλου μεγέθους. Η επιδερμίδα έχει έντονο κίτρινο χρώμα (ήλεκτρου), ροδίζουσα πολλές φορές προς την ηλιαζόμενη πλευρά. Η σάρκα είναι πλούσιας γεύσης, χυμώδης, υπόγλυκη.

Ωριμάζει το Σεπτέμβριο.

## **ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ *Prunus domestica***

### **ΚΟΙΛΑ**

**Γενικά:** Με την ονομασία αυτή οι κάτοικοι των Κοίλων Κοζάνης αναφέρονται σε δύο ποικιλίες: α) “Κοίλα” (I) και β) “Κοίλα” (II).

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα του Νομού Κοζάνης, περιοχή Κοίλων.

**Δένδρο:** Μικρού μεγέθους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σποροφυτικό υποκείμενο.

**Καρπός:** α) “Κοίλα” (I), ο καρπός της οποίας είναι μικρού μεγέθους, σφαιρικός, κίτρινου χρώματος, συμπύρηνος, με πρασινοκίτρινη σάρκα.

Συγκομίζεται στα τέλη Αυγούστου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

β) “Κοίλα” (II), ο καρπός της οποίας είναι μικρού μεγέθους, σφαιρικός, κίτρινου χρώματος με λίγο κόκκινο επίχρωμα, εκπύρηνος, με πρασινοκίτρινη σάρκα.

Συγκομίζεται στα τέλη Αυγούστου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

## **ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ *Prunus domestica***

### **ΚΟΡΟΜΗΛΟΔΑΜΑΣΚΗΝΟ**

**Γενικά:** Με την ονομασία αυτή αναφέρονται δύο παραλλαγές (Α και Β).

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ελληνική ποικιλία, διασπαρμένη σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

**Καρπός:** Παραλλαγή Α: Μέσου μεγέθους, σφαιρικός, με μικρό και λεπτό ποδίσκο, επιδερμίδα ωχροπράσινη, γυαλιστερή και σάρκα ινώδη, υδαρή και αρκετά γλυκιά.

Ωριμάζει στα τέλη Ιουνίου.

Παραλλαγή Β: Μεγαλύτερος καρπός του προηγούμενου, με επιδερμίδα ερυθροπορφυρή και γυαλιστερή και σάρκα πολύ χυμώδη αλλά ανούσια και ινώδη.

Ωριμάζει Ιούλιο – Αύγουστο.

## ΚΕΡΑΣΙΑ *Prunus avium*

### ΦΡΑΟΥΛΑ ΒΟΛΟΥ



**Γενικά:** Γαλανή, ημιτραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μεγάλο μέγεθος καρπού.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Θεωρείται ελληνική ποικιλία, χωρίς όμως αυτό να είναι τεκμηριωμένο. Η καλλιέργειά της ξεκίνησε από το Πήλιο του Βόλου, όπου και καλλιεργείται. Καλλιεργείται ακόμη και σε όλη τη Θεσσαλία και ενδιάσπαρτα σ' ολόκληρη τη χώρα μας. Σε μερικές περιοχές καλλιεργείται σαν επικονιαστής άλλων ποικιλιών και κυρίως της Τραγανά Εδέσσης.

Η ονομασία Φράουλα χρησιμοποιείται, σχεδόν σε όλη τη χώρα, για το χαρακτηρισμό των γαλανών, καρδιόσχημων, μεγαλόκαρπων ποικιλιών.

**Δένδρο:** Μεγάλου μεγέθους, κανονικού ως ορθόκλαδου σχήματος.

Η ετήσια βλάστησή του είναι ζωηρή.

Εισέρχεται σε κανονική παραγωγή από τον έβδομο με όγδοο χρόνο.

Είναι ανθεκτικό στους παγετούς.

Δεν παρουσιάζει συγγένεια με το *P. mahaleb*.

Οι αποδόσεις του είναι μεγάλες.

**Φύλλο:** Ελλειπτικού σχήματος, μέσου μεγέθους.

Η σχέση μήκους προς πλάτος του ελάσματος είναι χαμηλή.

Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο και έχουν σχήμα νεφροειδές.

Η σχέση μήκους μίσχου προς μήκος ελάσματος είναι χαμηλή.

**Καρποφόρα όργανα:** Καρποφορεί σε μπουκέτα του Μαΐου. Ο αριθμός των ανθοφόρων οφθαλμών ανά καρποφόρο όργανο είναι μικρός και από κάθε οφθαλμό εκπτύσσονται ένα ως δύο άνθη.

**Άνθος:** Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους και ο ύπερος είναι ίσος ή μικρότερος από τους στήμονες.

Η άνθηση είναι κανονικής περιόδου, ανθίζει τρεις ως πέντε ημέρες νωρίτερα από την Τραγανά Εδέσσης.

Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυροεπικονίαση.

**Καρπός:** Καρδιόσχημος, μεγάλου μεγέθους, χρώματος βάσεως επιδερμίδας κίτρινου, με λίγο κόκκινο επίχρωμα.

Η σάρκα του είναι ημιτραγανή, λευκού χρώματος με καλά γευστικά χαρακτηριστικά. Η περιεκτικότητα σε χυμό είναι υψηλή και αυτός είναι άχρωμος. Παραμένει λίγη σάρκα στον πυρήνα.

Ο ποδίσκος του καρπού έχει μικρό έως μέσο μήκος και η δύναμη απόσπασής του από το καρποφόρο όργανο είναι ισχυρή προς μέτρια.

Ωριμάζει στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουνίου, μαζί ή λίγες ημέρες μετά από την Τραγανά Εδέσσης.

Παρουσιάζει ένα ποσοστό δίδυμων καρπών κατ' έτος, που φτάνει μέχρι 10%.

Αντέχει στις μεταφορές αλλά είναι πολύ ευαίσθητος στη μονίλια.

**Πυρήνας:** Σχήματος ωειδούς, μικρού προς μέσου μεγέθους.

Η σχέση βάρους πυρήνα προς καρπού είναι μεγάλη, ενώ η σχέση μεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι μέση.

Η σύμφυσή του με τη σάρκα είναι μέτρια.

**Επικονιαστές:** B. Napoleon, B.G. D'Hedelfingen, Τραγανά Εδέσσης κ.λ.π.



## ΚΕΡΑΣΙΑ *Prunus avium*

### ΠΡΩΙΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ



**Συνώνυμα:** Κηφισιάς.

**Γενικά:** Κόκκινη, μαλακόσαρκη ποικιλία, μεσοπρωίμου εποχής ωρίμανσης, με πολύ μικρό μέγεθος καρπού.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Επισημάνθηκε στην περιοχή Αττικής. Καλλιεργείται σε όλες σχεδόν τις πρώιμες πεδινές περιοχές της χώρας μας, σε μικρές εκτάσεις, λόγω της πρώιμης ωρίμανσης του καρπού. Τα τελευταία χρόνια σταμάτησε η διάδοσή της λόγω της αντικατάστασής της από την ποικιλία B. Burlat.

**Δένδρο:** Πολύ μεγάλου μεγέθους, πλαγιόκλαδο, με πυκνή κόμη.

Η ετήσια βλάστησή του είναι πολύ ζωηρή.

Οι αποδόσεις του είναι μικρές.

**Φύλλο:** Ελλειπτικού σχήματος, μέσου μεγέθους, με οδόντωση διπλά πριονωτή.

Το χρώμα του ελάσματος στην επάνω επιφάνεια είναι σκούρο πράσινο και η επιφάνεια στιλπνή.

Η σχέση μήκους προς πλάτος του ελάσματος είναι χαμηλή.

Ο μίσχος έχει μικρό μήκος και μέσο πάχος.

Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήμα νεφροειδές, εμφανίζουν δυνατό χρωματισμό με ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στον μίσχο.

Η σχέση μήκους μίσχου προς μήκος ελάσματος είναι μέση.

Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι μέσης περιόδου.

**Καρποφόρα όργανα:** Η έκπτυξη των καρποφόρων οργάνων γίνεται σε όλο το μήκος των βλαστών.

Καρποφορεί σε μπουκέτα του Μαΐου. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών είναι μικρή. Ο αριθμός των ανθοφόρων οφθαλμών ανά καρποφόρο όργανο είναι μέτριος και από κάθε οφθαλμό εκπύσσονται τρία ως τέσσερα άνθη.

Το σχήμα των ανθοφόρων οφθαλμών είναι κωνικό.

**Άνθος:** Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχημα, μέσου μεγέθους και ο ύπερος είναι μεγαλύτερος από τους στήμονες.

Η άνθηση είναι κανονικής περιόδου, ανθίζει έξι ημέρες νωρίτερα από την Τραγανά Εδέσσης.

Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυροεπικονίαση.

**Καρπός:** Καρδιόσχημος, χρώματος επιδερμίδας μαονιού, πολύ μικρού μεγέθους.

Η επιδερμίδα του φέρει δυσδιάκριτα στίγματα, μικρού μεγέθους και πολύ πυκνά. Η κοιλιακή ραφή είναι δυσδιάκριτη, εξογκωμένη, με χρωματισμό όμοιο με της επιδερμίδας. Το ακροκάρπιο σχηματίζει κοιλότητα στο μέσον του άκρου και εμφανίζει φελλώδη ιστό μικρού μεγέθους.

Η σάρκα του είναι ημιτραγανή, σκούρου κόκκινου χρώματος με υπόγλυκη γεύση. Η περιεκτικότητα σε χυμό είναι υψηλή και το χρώμα αυτού κόκκινο. Παραμένει αρκετή σάρκα στον πυρήνα.

Ο ποδίσκος του καρπού έχει μέσο μήκος, η δύναμη απόσπασής του από τον καρπό είναι μικρή και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα.

Ωριμάζει το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, δύο βδομάδες πριν από την Τραγανά Εδέσσης.

Παρουσιάζει ανθεκτικότητα στο σχίσσιμο.

Δεν αντέχει στις μεταφορές και την συντήρηση.

**Πυρήνας:** Σχήματος ωοειδούς, μικρού μεγέθους.

Το άκρο του είναι ελαφρώς αιχμηρό και η ραφή σχηματίζει τριπλή τρίπιδα. Η σχέση βάρους πυρήνα προς καρπού είναι μέση, ενώ η σχέση μεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι μικρή.

Η σύμφυσή του με τη σάρκα είναι ισχυρή.

**Επικονιαστές:** Πρώιμο Κολυνδρού, Hative de Bale, B. Burlat.

## **ΚΕΡΑΣΙΑ *Prunus avium***

### **ΤΡΑΓΑΝΑ ΑΓΙΑΣΟΥ**

**Συνώνυμα:** Τραγανό, Αγιάσου, Άγνωστο Αγιάσου.

**Γενικά:** Υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω ποικιλίες:

α) “Τραγανό” (κόκκινη) και β) “Άγνωστο Αγιάσου” (γαλανή).

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Είναι ντόπια ποικιλία της νήσου Λέσβου και ιδιαίτερα της περιοχής Αγιάσου.

**Δένδρο:** α) “Τραγανό”, μεγάλου μεγέθους, ορθόκλαδο.

β) “Άγνωστο Αγιάσου”, μεγάλου μεγέθους, παραγωγικό.

**Καρποφόρα όργανα:** Καρποφορεί σε μπουκέτα του Μαΐου.

**Καρπός:** α) “Τραγανό”, κόκκινος, τραγανός, σφαιρικός, μέσου μεγέθους.

Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.

β) “Άγνωστο Αγιάσου”, γαλανός, πολύ τραγανός, γλυκός, σφαιρικός και μεγάλου μεγέθους.

Ωριμάζει στα μέσα Ιουνίου και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική αλλά και για νωπή κατανάλωση.

## ΚΕΡΑΣΙΑ *Prunus avium*

### ΒΥΤΑΛΟΥ



**Συνώνυμα:** Κορομηλοκέρασο Βυτάλου.

**Γενικά:** Υποθέτουμε ότι μπορεί να είναι η ποικιλία “Κορομηλοκέρασο Βυτάλου”.

Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, μέσης εποχής ωρίμανσης, με μικρό μέγεθος καρπού.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Επιστημάνθηκε στην περιοχή Βυτάλου Ευβοίας, όπου και καλλιεργείται σε μικρή έκταση, καθώς και σε άλλες περιοχές της Εύβοιας, για την κάλυψη τοπικών αναγκών.

**Δένδρο:** Πολύ μεγάλο μέγεθος, πλαγιόκλαδο, με πολύ πυκνή κόμη.

Η ετήσια βλάστησή του είναι εξαιρετικά ζωνρή.

Οι αποδόσεις του είναι μέτριες.

**Φύλλο:** Ελλειπτικού σχήματος, μικρού μεγέθους, με οδόντωση τριπλά πριονωτή.

Το χρώμα του ελάσματος στην επάνω επιφάνεια είναι μέσο πράσινο και η επιφάνεια σιλπνή.

Η σχέση μήκους προς πλάτος του ελάσματος είναι μέση προς υψηλή.

Ο μίσχος έχει μικρό μήκος και πάχος.

Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήμα νεφροειδές, εμφανίζουν δυνατό χρωματισμό με ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στον μίσχο.

Η σχέση μήκους μίσχου προς μήκος ελάσματος είναι υψηλή προς μέση.

Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι μέσης περιόδου.

**Καρποφόρα όργανα:** Η έκπτυξη των καρποφόρων οργάνων γίνεται σε όλο το μήκος των βλαστών.

Καρποφορεί σε μπουκέτα του Μαΐου. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών είναι μέτρια. Ο αριθμός των ανθοφόρων οφθαλμών ανά καρποφόρο όργανο είναι μέτριος και από κάθε οφθαλμό εκπύσσονται τέσσερα ως πέντε άνθη.

Το σχήμα των ανθοφόρων οφθαλμών είναι κωνικό.

**Άνθος:** Τα άνθη έχουν πέταλλα ελλειπτικού σχήματος, έλοβα, μέσου μεγέθους και ο ύπερος είναι μικρότερος από τους στήμονες.

Η άνθηση είναι κανονικής περιόδου, ανθίζει τέσσερις ημέρες νωρίτερα από την Τραγανά Εδέσσης.

Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυροεπικονίαση.

**Καρπός:** Καρδιόσχημος, χρώματος επιδερμίδας μαονιού, μικρού προς μέτριου μεγέθους.

Η επιδερμίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγματα, μεγάλου μεγέθους και πολύ πυκνά. Η κοιλιακή ραφή είναι δυσδιάκριτη, εξογκωμένη, με χρωματισμό όμοιο με της επιδερμίδας. Το ακροκάρπιο είναι αιχμηρό, βρίσκεται στο μέσον του άκρου και εμφανίζει φελλώδη ιστό μέσου μεγέθους.

Η σάρκα του είναι τραγανή προς μέτριας τραγανότητας, κόκκινου χρώματος με καλά γευστικά χαρακτηριστικά. Η περιεκτικότητα σε χυμό είναι ενδιάμεση προς μικρή και το χρώμα αυτού είναι σκούρο κόκκινο. Παραμένει αρκετή σάρκα στον πυρήνα.

Ο ποδίσκος του καρπού έχει μεγάλο μήκος, η δύναμη απόσπασής του από τον καρπό είναι ισχυρή προς μέση και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα.

Ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, τέσσερις ημέρες πριν από την Τραγανά Εδέσσης.

**Πυρήνας:** Σχήματος ωειδούς, μικρού προς μέσου μεγέθους.

Το άκρο του είναι πιεσμένο και η ραφή σχηματίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους πυρήνα προς καρπού είναι μέση προς μεγάλη, ενώ η σχέση μεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι μέση προς μικρή.

Η σύμφυσή του με τη σάρκα είναι ισχυρή.

**Επικονιαστές:** Αθηναϊκά, Μαύρο Πρώιμο Βυτάλου και Μεσοπρώιμο Τραγανό Ευβοίας σε περιοχές που συνανθίζει με το Κορομηλοκέρασο Βυτάλου.

**ΜΗΛΙΑ *Malus pumila***

**ΚΑΛΛΙΓΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ**



**Συνώνυμα:** Καλλιγά, Καλιγά.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία του Νομού Πιερίας και ιδιαίτερα της περιοχής Αιγινίου.

**Δένδρο:** Ζωηρό, ορθόκλαδο, παραγωγικό.

**Καρπός:** Κανονικού μεγέθους, με κίτρινη επιδερμίδα. Το χρώμα της σάρκας είναι λευκοκίτρινο με γεύση γλυκόξινη.

Συγκομίζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου.

**ΜΗΛΙΑ** *Malus pumila*

**ΚΥΔΩΝΟΜΗΛΟ** ΝΑΟΥΣΑΣ

**Συνώνυμα:** Κυδωνόμηλο.

**Γενικά:**

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα των Νομών Πέλλας και Ημαθίας.

**Δένδρο:**

**Καρπός:** Κίτρινος σαν κυδώνι.

**ΜΗΛΙΑ *Malus pumila***

**ΡΕΝΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΟΥ**



**Συνώνυμα:** Ρενέτες.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Πρόκειται για κλώνο της ποικιλίας Ρεν-ντε-Ρενέτ, εγκλιματισμένη στη νήσο Λέσβο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αγιάσου.

**Καρπός:** Μετρίου μεγέθους, σχεδόν σφαιρικού σχήματος, με επιδερμίδα αχυροκίτρινης χροιάς, σάρκα υπόξινη, πολύ αρωματική και ευχάριστη στη γεύση.

Ωριμάζει τον Οκτώβριο.



## **ΒΥΣΣΙΝΙΑ *Prunus cerasus***

### **ΠΗΛΙΟΥ**

**Συνώνυμα:** Αγριοβυσσινιά.

**Γενικά:** Με την ονομασία αυτή οι κάτοικοι του Πηλίου αναφέρονται μάλλον στην ποικιλία “Αγριοβυσσινιά”.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία του Νομού Μαγνησίας και ιδιαίτερα της περιοχής του Πηλίου.

**Καρπός:** Μέσου μεγέθους, πιεσμένος στους πόλους, κόκκινου χρώματος με ελαφρώς όξινη γεύση.

Συγκομίζεται στις 10 με 20 Ιουλίου και χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστική και στη χυμοποιεία.

## **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ *Prunus persica***

### **ΚΟΝΤΟΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ**

**Συνώνυμα:** Κοντόνι.

**Γενικά:** Πρόκειται για κλώνο της ποικιλίας Κοντόνι που καλλιεργούνταν εμπορικά στη χώρα μας τη δεκαετία του '50.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ποικιλία εγκλιματισμένη στην Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα στους Νομούς Πέλλας και Ημαθίας.

**Καρπός:** Εκπύρηνος, σχήματος ακανόνιστου κωνικού πιεσμένου, με εξέχον το ακροκάρπιο και πλατιά κοιλότητα ποδίσκου. Επιδερμίδα λεπτή που ξεφλουδίζεται εύκολα, χρώματος κιτρινοκόκκινου, χρώμα σάρκας κίτρινο βαθύ, πολύ εύγευστη και αρωματική, με ελάχιστους χυμούς και μαλακή σάρκα, βουτυρώδους υφής.

Ωριμάζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

**ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ *Prunus persica***

**ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ ΑΓΡΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ**

**Συνώνυμα:** Γιαννακοχωρίου, Λευκόσαρκο Γιαννακοχωρίου.

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπιο σπορόφυτο της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα των Νομών Πέλλας και Ημαθίας.

**Καρπός:** Μικρού μεγέθους, σχήματος ωειδούς, χρώματος επιδερμίδας λευκοκίτρινου με κόκκινο επίχρωμα στις ηλιαζόμενες πλευρές.

Ωριμάζει στα μέσα Ιουλίου.

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ *Citrus sinensis***


**ΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΑΙΜΑΤΟΧΡΩΜΟ**



*Πορτοκάλι αιματόχρωμο, ποικιλία Γουρίτσας  
Φωτο Π. Δηλανά*

**ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ *Citrus sinensis***

**ΜΑΛΤΑΣ**



Πορτοκάλι, ποικιλία Μαλτέζικο (Καλαράτα)  
Φωτο Π. Δηλανά

**ΣΥΚΙΑ *Ficus carica***

**ΜΠΟΥΚΝΕΣ (ΑΡΚΟΥΝΕΣ) ΣΑΜΟΥ**

**Καταγωγή και εξάπλωση:** Ντόπια ποικιλία της νήσου Σάμου.

**Δένδρο:** Ζωηρό και παραγωγικό.

**Καρπός:** Μέτριου έως μεγάλου μεγέθους και σχήμα έντονα απιοειδές με μικρό λαιμό. Ο φλοιός έχει χρώμα ιώδες (μελιτζανί).

Η έναρξη της ωρίμανσης γίνεται τον Μάιο-Ιούνιο, δίνει καλή ποιότητα καρπού και χρησιμοποιείται για νωπή κατανάλωση.









