



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες : Γεώργιος Γκαντής
: Νίκος Κολάτσος
Τηλέφωνο : 2531.3.50.408 (-410)
FAX : 2531.0.36.700
E-MAIL : u13912@minagric.gr

Κομοτηνή 4/9/2012

Αριθ.πρωτ. 8244

- Προς:**
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Λ.Συγγρού 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
 2. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου 65110 Καβάλα.
- Κοιν.**
1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ Ενταύθα
 2. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας για Μ.Μ.Ε.
 3. ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «4ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2012»

1.Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών της Π.Ε. Ροδόπης η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από τους ελέγχους που πραγματοποιεί στους αγρούς και την παρακολούθηση των φερομονικών παγίδων (πράσινου ρόδινου σκουληκιού) διαπίστωσε ότι

2.Βρισκόμαστε στην έναρξη δραστηριότητας της **3^{ης} γενιάς του πράσινου σκουληκιού**. Οι βαμβakoφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης και ανοίγματος των πρώτων καρυδιών. Η **3^η γενιά του πράσινου σκουληκιού** δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο η **2^η γενιά του Αυγούστου**

3.Συνίσταται στους βαμβakoπαραγωγούς ιδίως στους παραγωγούς όψιμων φυτειών να παρακολουθούν κάθε **2-3 μέρες** τα χωράφια τους και αν διαπιστώσουν **4-5 ζωντανές προνύμφες/100 φυτά** να επέμβουν με τα κατάλληλα εντομοκτόνα.

4.Η εφαρμογή των κατάλληλων φαρμάκων να γίνεται **μετά τη δύση του ηλίου** και κατά τις νυχτερινές ώρες. Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μπεκ ψεκασμού και η ποσότητα νερού να είναι από **50-100κιλα/στρ**

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ: Με την αποφύλλωση επιταχύνουμε την ωρίμανση και το άνοιγμα των καρυδιών. Έτσι έχουμε καλύτερη ποιότητα βαμβακιού απαλλαγμένου από ξένες ύλες. Ψεκάζουμε τα αποφυλλωτικά όταν ανοίξει τουλάχιστον το **50% των καρυδιών**. Πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και μειώνει τη στρεμματική απόδοση. Επίσης για να είναι αποτελεσματικά τα αποφυλλωτικά θα πρέπει να επικρατούν θερμοκρασίες μεγαλύτερες από **15-18 °C** για μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή.

Ε.Π.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

**ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**