

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616  
Email: [pkpfiraklio@minagric.gr](mailto:pkpfiraklio@minagric.gr)

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου  
[www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε  
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο [agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ Δελτίο Ν°1 (Ορεινές περιοχές)

### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στις ορεινές περιοχές η 1<sup>η</sup> πτήση ξεκίνησε :

Λιβάδι Κρουσώνα, οροπέδιο Λασιθίου

Πρώτες συλλήψεις	Πρώτες αραιές ωτοκίες	Πρώτες pronύμφες
24 - 25 Απριλίου	1 - 3 Μαΐου	10 - 12 Μαΐου

- Οι συλλήψεις προς το παρόν είναι χαμηλές και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν δεν ευνοούν δυναμικές ωτοκίες.

- Τα νεαρό καρπίδιο στα μήλα είναι ευαίσθητο για προσβολή όταν φτάνει σε διάμετρο τα 2 εκ. και αρχίζει να χάνει το χνούδι του.

### Οδηγίες:

- Ενδεικτικοί χρόνοι έναρξης αντιμετώπισης :

❖ Ορεινές περιοχές (οροπ. Λασιθίου, Λιβάδι Κρουσώνα, Δαμάστα) :

➤ με σκευάσματα κατά την εναπόθεση αυγών από : **7 - 9 Μαΐου.**

➤ με pronυμφοκτόνα σκευάσματα από: **11 - 12 Μαΐου.**

- Να γίνεται καλή διαβροχή σε **καρπούς και φύλλωμα.**

### ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

(*Carposapsa pomonella*)

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά



### ΣΕΖΙΑ :

(*Sesia myopiformis*)

(Μηλιά)



### Γενικές πληροφορίες:

- Η σέζια αποτελεί σοβαρό ξυλοφάγο εχθρό της μηλιάς στην Κρήτη. Το έντομο ωτοκεί στους κορμούς και στους βραχίονες, κατά προτίμηση σε σχισμές, έλκη, τομές. Οι ωτοκίες ξεκινούν αυτή την περίοδο και διαρκούν γενικά μέχρι και τα μέσα του καλοκαιριού. Οι νεαρές pronύμφες εισέρχονται στο φλοιό, αναπτύσσονται στο κάμβιο-ξύλο και παραμένουν εκεί 1 - 2 έτη μέχρι την μεταμόρφωσή τους σε πεταλούδες.

### Οδηγίες:

- Συνιστάται κατά την περίοδο ωτοκίων - εκκολάψεων των pronυμών να προστατεύονται κατά διαστήματα οι κορμοί και οι βραχίονες με κατευθυνόμενο ψεκάσμο και καλή διαβροχή.

### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

**ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :**  
(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)  
(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)



- Η παρατεταμένη ανομβρία που έχει σημειωθεί από την έναρξη της βλάστησης **δεν έχει ευνοήσει τον μύκητα.**
- Στις μηλιές δεν παρατηρούνται προσβολές. Στις αχλαδιές που βρίσκονται σε υγρές τοποθεσίες και σε πολύ περιορισμένο ποσοστό, διαπιστώνονται διάσπαρτα συμπτώματα.

#### Οδηγίες :

- Γενικά ανάγκη προστασίας υπάρχει μόνο όπου έχουν εμφανιστεί ήδη συμπτώματα.
- Ιδιαίτερα στις αχλαδιές ανάγκη προστασίας υπάρχει και σε περιόδους με συνεχείς και έντονες δροσιές.

**ΩΙΔΙΟ :**  
(*Oidium farinosum*) - (Μηλιά)



### Γενικές πληροφορίες :

- Οι νεαροί καρποί και η τρυφερή βλάστηση είναι ιδιαίτερα ευπαθείς.

#### Οδηγίες :

- Στις μηλιές συνιστάται προληπτική αντιμετώπιση.

### Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια / εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Τα «χημικά» φυτοπροστατευτικά δεν είναι ακίνδυνα.

Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



[Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου](#)



Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων **αμπελιού** αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή [πατώντας εδώ](#)

[Εφαρμογή I-Agric του ΥπαΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο](#)



Ηράκλειο 1 Μαΐου 2024  
Η Προϊσταμένη Τμήματος  
Κληρονόμου Ευφροσύνη