

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 21

Ευδεμίδα: Επανάληψη αντιμετώπισης για την 3^η πτήση στην όψιμη ζώνη του νησιού

Ωίδιο: Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα

Τζιτζικάκια: Αυξημένοι οι πληθυσμοί κατά θέσεις → να γίνεται αντιμετώπιση μετά από έλεγχο

Χρόνοι εφαρμογής ψεκασμών: Συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται αργά, από το σούρουπο και μετά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας


Προσοχή : Επιλέγεται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή. Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες να προηγείται απαραίτητα η εκτίμηση του βαθμού ωρίμασης και η συνεννόηση με το οινοποιείο που θα παραδοθούν τα σταφύλια.

Φαινολογικά στάδια στην ποικιλία σουλτανίνα

- Στον Πιν.1 δίνεται η εξέλιξη των βλαστικών σταδίων στην ποικιλία σουλτανίνα σε τρεις ζώνες αναφοράς.
- Σε σχέση με το 2025, παραμένει οψιμότητα τουλάχιστον κατά μια εβδομάδα.

Πίνακας.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο νομό Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας					
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο M αρχή γυαλισματος - γυάλισμα		Στάδιο N έναρξη - πλήρης ωρίμασης ωρίμαση	
Κλίμακα BBCH	77	81		85	
Πρώιμη ζώνη		τα σταφύλια ωριμάζουν			
Μεσοπρώιμη		τα σταφύλια γυάλισαν - έναρξη ωρίμασης			
Οψιμη ζώνη	τα σταφύλια γυαλίζουν				

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Η δραστηριότητα από την 3^η πτήση του εντόμου (συλλήψεις, ωτοκίες) είναι αυξημένη στη μεσοπρώιμη και στην όψιμη ζώνη του νησιού ενώ μειώθηκε στις πρωιμότερες περιοχές (Πιν.2).

Πιν.2. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου ανά ζώνη την περίοδο αυτή

Ζώνη →	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις, ωτοκίες)	σε σημαντική μείωση, χαμηλή έως μέτρια	σημαντικά αυξημένη	σημαντικά αυξημένη

Οδηγίες:

- Στην όψιμη ζώνη του νησιού όπου η δραστηριότητα του εντόμου είναι πολύ αυξημένη την περίοδο αυτή **είναι απαραίτητη** η επανάληψη αντιμετώπισης στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες *:

• Όψιμη ζώνη ΠΕ Ηρακλείου - ΠΕ Λασιθίου: 4 - 6 Αυγούστου

• Όψιμη ζώνη ΠΕ Χανίων - ΠΕ Ρεθύμνου: 5 - 7 Αυγούστου

- Στην πρώιμη ζώνη, στην ενδιάμεση του ν. Ηρακλείου (μεταξύ πρώιμης - μεσοπρώιμης) και στην κάτω Μεσαρά η δραστηριότητα (συλλήψεις, ωτοκίες) έχει μειωθεί σημαντικά, δικαιολογείται όμως προστασία, ιδιαίτερα όπου η ανοχή προσβολής των σταφυλιών είναι πολύ μικρή έως μηδενική. Σε αμπέλια των παραπάνω περιοχών που δεν συγκομίζονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου συνιστάται επανάληψη αντιμετώπισης στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες :

• Πρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου - Λασιθίου: 4 - 5 Αυγούστου

• Πρώιμη ζώνη ν. Χανίων - Ρεθύμνου: 5 - 6 Αυγούστου

• Ενδιάμεση ζώνη ν. Ηρακλείου και κάτω Μεσαρά: 5 - 6 Αυγούστου

Προσοχή: Σε αμπέλια κοντά στη συγκομιδή να επιλέγονται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής.

Επισήμανση : Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → Ο ψεκασμός να καλύπτει καλά όλα τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται και οι προσβολές την περίοδο αυτή συνδέονται άμεσα με τις σήψεις σταφυλιών.

* Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σας συνιστούμε, σε συνεργασία με τον γεωπόνο σας, να λαμβάνετε υπόψη τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών όπως και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.
- Η αυξημένη υγρασία και οι θερμοκρασίες της εποχής ευνοούν τις προσβολές.

Οδηγίες:

- Συνιστάται στην όψιμη ζώνη να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν συμπτώματα στα :

- οινοποιήσιμα σταφύλια που δεν έχει ολοκληρωθεί το γυάλισμα και
- στα σταφύλια προς επιτραπέζια χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ :



Πτερωτό



Άπτερο

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Πολύ αυξημένοι κατά τόπους οι πληθυσμοί (ενήλικα πτερωτά και άπτερα στην κάτω πλευρά του φύλλου) κυρίως σε αμπέλια που διατηρούν τρυφερή βλάστηση.

Οδηγίες :

➤ Συνιστάται στα αμπέλια της όψιμης ζώνης:

1. Να γίνουν συστηματικοί έλεγχοι.

Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.

Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

2. Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα. Οι ψεκασμοί για τα τζιτζικάκια στοχεύουν στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) : Εγκεκριμένα σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Ηράκλειο 3 Αυγούστου 2026

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με ακρίβεια τη γενική τάση που επικρατεί στη φύση ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αμπελιού αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή πατώντας εδώ	
Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο	

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει εβδομαδιαία δελτία άρδευσης.

Στον σύνδεσμο <https://www.irrigation-crete.gr/> θα βρείτε αναρτημένο το Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιέργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Επιπλέον έχει εκδώσει Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αρδευτικές ανάγκες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες του νησιού, όπως η ελιά, το αμπέλι, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή.

Το φυλλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση : <https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/fylladio-ardeysis.pdf>