

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Μ.Γουβερνέτου 17, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810224948 ,Fax: 2810225616

Email: pkpfhgpr@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Χρησιμοποιείτε σωστά τα φυτοφάρμακα.

Έτσι προστατεύονται:

- Ο χρήστης
- Ο καταναλωτής
- Το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής - Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

3.

Οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τις συχνές βροχοπτώσεις που επικράτησαν το χειμώνα οψίμισαν σημαντικά τα αμπέλια συγκριτικά με την προηγούμενη ιδιαίτερα πρώιμη χρονιά.

Με την έναρξη της βλάστησης έχουμε και τις πρώτες ανοιξιάτικες επεμβάσεις.

| | |
|-------------------------|--|
| ΦΟΜΟΨΗ: | Ασθένεια του ξύλου. Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται στα πρώτα βλαστικά στάδια D και E (μήκος βλάστησης 1-3 εκ.). Ευνοείται με δροσερό και υγρό καιρό. |
| <i>Οδηγίες:</i> | Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με προληπτικούς ψεκασμούς την περίοδο που έχουν ανοίξει τα περισσότερα μάτια, και όταν αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα. (1 ^η και 2 ^η φωτογραφία) |
| ΩΙΔΙΟ (χολέρα): | Η σπουδαιότερη ασθένεια του αμπελιού στην Κρήτη. Η προστασία πρέπει να αρχίζει από τα πρώτα βλαστικά στάδια E , F έτσι ώστε να μειώνεται το αρχικό μόλυσμα και να είναι πιο <u>αποτελεσματική</u> η αντιμετώπιση του την υπόλοιπη καλλιεργητική περίοδο. |
| <i>Οδηγίες:</i> | Κατάλληλος χρόνος καταπολέμησης, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 6 εκατοστά. (2^η και 3^η φωτογραφία) |
| ΘΡΙΠΕΣ: | Οι προσβολές αρχίζουν από τους εκπυσσόμενους βλαστούς. Σε αμπέλια που υπάρχει ιστορικό προσβολών να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωίδιο. |
| ΑΚΑΡΙ (ερίνωση): | Οι προσβολές είναι συνήθως τοπικές και χωρίς οικονομική σημασία. Μόνο όπου υπάρχει πρόβλημα (πολλά φύλλα με "φουσκάλες" στην πάνω επιφάνεια) να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με τη φόμοψη. |

| | |
|------------------------|---|
| ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ : | Στην πλειοψηφία των αμπελώνων επικρατεί η ξινήθρα. Σχηματίζει ένα φυσικό χειμερινό χλοοτάπητα που επιδρά ευνοϊκά στο έδαφος (προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση, αυξάνει τη συγκράτηση και τη διείσδυση του νερού, βελτιώνει την υφή του εδάφους και το κάνει προσβάσιμο μετά από βροχή). Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια και περιορίζει την ανάπτυξη άλλων θερινών ζιζανίων. |
| <i>Οδηγίες :</i> | Μην καταστρέφετε την ξινήθρα νωρίς. Σε αμπέλια με ξινήθρα συνιστάται ζιζανιοκτονία μόνο κατά μήκος των γραμμών κι εφόσον υπάρχουν επιζήμια ζιζάνια. |

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Σας αποστέλλουμε τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού για το έτος 2011. Κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου να επιλέγετε τα κατάλληλα σκευάσματα από τις λίστες αυτές.

ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (χιλιοστά)

| | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ | ΒΟΝΝΗ | ΑΣΗΜΙ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ΣΗΤΕΙΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΤΥΜΠΑΚΙ | ΑΡΧΑΝΕΣ | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------------|
| Σεπτέμβριος | 2 | 9 | 1 | - * | 1 | 1 | 6 | 37 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| Οκτώβριος | 84 | 178 | 112 | 49 | 103 | 78 | 70 | 87 | 58 | 147 | 128 | 152 |
| Νοέμβριος | 59 | 78 | 76 | 45 | 49 | 24 | 72 | 48 | 60 | 61 | 102 | 41 |
| Δεκέμβριος | 176 | 188 | 156 | 80 | 100 | 166 | 172 | 137 | 148 | 197 | 183 | 169 |
| Ιανουάριος | 140 | 127 | 86 | 85 | 113 | 149 | - * | 106 | 81 | 187 | 120 | 177 |
| Φεβρουάριος | 185 | 173 | 138 | 125 | 129 | 194 | - * | 137 | 90 | 187 | 214 | 332 |
| Σύνολο περιόδου | 646 | 753 | 569 | 384* | 495 | 612 | 320* | 552 | 439 | 789 | 757 | 873 |

(Στοιχεία Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου)

-* Έλλειψη δεδομένων λόγω βλάβης σταθμού.

☞ Το δελτίο εμφανίζεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: www.minagric.gr

Ηράκλειο 18 Μαρτίου 2011
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης