



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ

Σχετικά με τις φυτείες των ελαιοδέντρων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του μηνός Ιουλίου 2012 στις περιοχές των **Δήμων Βιάννου και Ιεράπετρας** και τους κατάλληλους χειρισμούς που πρέπει να γίνουν, σας γνωρίζουμε ότι οι ελαιοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τα παρακάτω με στόχο τη γρήγορη και με μικρότερο κόστος αποκατάσταση:

1. Αρχικά θα πρέπει να γίνει **μια πρώτη εκτίμηση της ζημιάς** που έχουν υποστεί τα ελαιοδέντρα του αγροτεμαχίου.

Στην περίπτωση αυτή έχουμε τις παρακάτω κατηγορίες ζημιών:

α) Ελαφρές ζημιές: Έχει ζημιωθεί τμήμα του φυλλώματος ενώ οι κύριοι βραχίονες δεν έχουν καεί.

β) Μέτριες ζημιές: Το σύνολο της κόμης του δέντρου έχει ζημιωθεί ενώ οι κύριοι βραχίονες (μπράτσα) και ο κορμός του δέντρου δεν έχουν ζημιωθεί σοβαρά.

γ) Σοβαρές ζημιές: Οι βραχίονες και ο κορμός του δέντρου έχουν ζημιωθεί σοβαρά.

δ) Ολική ζημιά: Πλήρης καταστροφή των κορμών μέχρι την επιφάνεια του εδάφους ή και κάτω από αυτό.

Σε πολλές περιπτώσεις οι παραπάνω κατηγορίες ζημιών μπορεί να συνυπάρχουν στον ίδιο ελαιώνα.

2. Χειρισμοί:

α) Άμεση απομάκρυνση από τους ελαιώνες (μετά από την καταγραφή από τον ΕΛΓΑ) των υπολειμμάτων του αρδευτικού δικτύου και των πεσμένων κλάδων.

β) Μέχρι τα μέσα Φθινοπώρου **δε γίνεται καμία επέμβαση** στα ζημιωμένα ελαιοδέντρα έως ότου αυτά δώσουν τη συνολική εικόνα αναβλάστησης.

γ) Στις περιπτώσεις αρδευόμενων ελαιώνων συνίσταται άμεση αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου και **συχνές ελαφρές αρδεύσεις** ,προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αναβλάστηση των ζημιωθέντων ελαιοδέντρων.

3. Κλάδεμα:

Η αποκατάσταση των ζημιωμένων ελαιοδέντρων βασίζεται αποκλειστικά στην αναβλάστησή τους. Συνεπώς η αναβλάστηση θα είναι εκείνη που θα καθορίσει τον τρόπο του κλαδέματος. Το βασικό κριτήριο κλαδέματος που θα εφαρμοστεί εξαρτάται από την κατάσταση του φλοιού, των κλάδων, βραχιόνων και κορμού. Κλαδιά βραχίονες και κορμοί ζημιωθέντων δέντρων, συνήθως μετά από παρέλευση περίπου ενός μήνα ,εμφανίζουν σχισίματα και αποκολλήσεις φλοιού ενώ στα μη ζημιωμένα τμήματα εμφανίζονται αναβλαστήσεις. Επομένως οι επεμβάσεις, δεν πρέπει να είναι βιαστικές, έως ότου γίνει εμφανές το τμήμα των δέντρων που έχει καταστραφεί. Τα κλαδέματα θα πρέπει να ξεκινήσουν από τα μέσα του Φθινοπώρου και να ολοκληρωθούν με το τέλος του χειμώνα. Οι τομές κλαδέματος θα πρέπει να καλυφθούν με ειδική προστατευτική αλοιφή.

Την πρώτη βλαστική περίοδο (Απρίλιος - Μάιος) δεν αφαιρούμε καθόλου αναβλαστήσεις, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια, γεγονός που θα συμβάλλει, μεταξύ των άλλων και στην καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των δέντρων.

Λοιποί χειρισμοί:

- Τα κλαδιά που θα κοπούν, ιδιαίτερα σε επικλινείς ελαιώνες, θα πρέπει να αφήνονται στο χωράφι(σε επιλεγμένα σημεία) ως τον Απρίλιο, προκειμένου να περιοριστεί η διάβρωση του εδάφους.

- Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει, η άρδευση(συχνή και μέτρια ποσότητα νερού) ,λίπανση και φυτοπροστασία να εκτελούνται κανονικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αντιμετώπιση των φυλλοφάγων, ξυλοφάγων εντόμων και ακάρεων.

- Στα ελαιοδέντρα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και θα χρειαστεί να καρατομηθούν από την επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή της βόσκηση των ζώων ,προκειμένου να προστατευθεί η αναβλάστηση που θα προκύψει από τη βάση του κορμού.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους τοπικούς γεωπόνους για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Ιωάννης