

ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

1.

Πληροφορίες: MSc Μαρία Ζ. Ροδιτάκη

| | |
|---|---|
| <p>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> | <p>Οι συλλήψεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παρουσιάζουν αύξηση ξεπερνώντας τα ανεκτά όρια επέμβασης.</p> <p>Συστήνεται άμεση έναρξη καταπολέμησης σε πορτοκάλια ποικιλίας βαλέντσια και όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών. Λόγω της έντονης δραστηριότητας των ωφέλιμων εντόμων την εποχή αυτή, προτείνονται οι δολωματικοί ψεκασμοί.</p> <p>Το δόλωμα αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Εφαρμόζεται στο εσωτερικό των δένδρων <u>σε κλαδιά χωρίς καρπούς</u>, στους κορμούς και περιμετρικά σε θάμνους και φράκτες. Ο δολωματικός ψεκασμός επαναλαμβάνεται κάθε 10-12 μέρες.</p> |
| <p>ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΑΥΡΗ ΨΩΡΑ : (Παρλατόρια)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p> | <p>Ολοκληρώνονται οι έξοδοι των κινητών μορφών και στις δύο ψώρες. Οι έρπουσες και τα νεαρά στάδια είναι ευαίσθητα στα εντομοκτόνα.</p> <p>Συνήθως σοβαρές προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα με πυκνή βλάστηση ή παραμελημένα.</p> <p>- Τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται κατάλληλα ώστε να αερίζονται και να λιάζονται εσωτερικά.</p> <p>- Όταν παρατηρούνται σοβαρές προσβολές συστήνεται επέμβαση:</p> <p>Στην <u>πεδιάδα της Μεσσαράς</u> στο διάστημα: 28 - 31 Μαΐου. Στις υπόλοιπες περιοχές (<u>Φόδελε, Σίσσες, κάμπος Χανίων</u>): 2 - 5 Ιουνίου.</p> |
| <p>ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ:</p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p> | <p>Ευνοείται σε υγρές περιοχές. Η έγκαιρη αντιμετώπιση πριν εγκατασταθεί και προστατευθεί κάτω από τον κάλυκα των καρπών, συμβάλει στον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθυσμού του σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.</p> <p>Όπου διαπιστώθηκαν πέρυσι επιζήμιοι πληθυσμοί, κυρίως σε ομφαλοφόρες ποικιλίες συστήνεται <u>καταπολέμηση με τη λήψη του δελτίου και πριν ο κάλυκας ενωθεί με τον καρπό</u>. Εάν συνυπάρχει με τις παραπάνω ψώρες να γίνει συνδυασμένη επέμβαση στις ίδιες ημερομηνίες.</p> |
| <p>ΑΦΙΔΕΣ: (Μελίγκρες)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> | <p>Προσβάλουν τα νεαρά φύλλα προκαλώντας παραμορφώσεις και συστροφές μέχρι και ανάσχεση της βλάστησης στις περιπτώσεις προσβολής νεαρών δέντρων που βρίσκονται στην ανάπτυξη τους.</p> <p>Συνιστάται ψεκασμός όταν παρατηρείται προσβολή βλαστών σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10% στις πορτοκαλιές και 5% στις μανταρινιές.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ΘΡΙΠΕΣ :</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> | <p>Προκαλούν επιδερμικές αλλοιώσεις (εσχαρώσεις) στους καρπούς, κυρίως σε λεμόνια υποβαθμίζοντας την εμπορική τους αξία.</p> <p>Εάν την προηγούμενη χρονιά διαπιστώθηκαν έντονες προσβολές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον πλανόκοκκο.</p> |
| <p>ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ :</p> <p><i>Aculops pelekassi</i> (Πορτοκαλιές -Λεμονιές-)</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> | <p>Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς και αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς σε παράκτιες περιοχές. Οι προσβεβλημένοι καρποί όταν είναι πράσινοι αποκτούν θαμπό, ελαφρά μολυβί χρώμα ενώ ώριμοι εμφανίζουν σκουριόχρωμες κηλίδες (πορτοκάλια) ή αργυρόχρωμες (λεμόνια).</p> <p>Σε δενδροκομεία που παρατηρήθηκαν πέρυσι προσβολές να γίνει επέμβαση.</p> |
| <p>ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ :</p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> <p><i>Χρόνος επέμβασης:</i></p> | <p>Παρατηρούνται μεγάλοι πληθυσμοί σε περιοχές με υψηλή υγρασία (Σίτσες, Φόδελε, Χανιά). Στη νέα βλάστηση οι εκκολάψεις των αυγών είναι σε εξέλιξη.</p> <p><u>Συνιστώνται καλλιεργητικά μέτρα που περιορίζουν την ανάπτυξη πυκνών πληθυσμών:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Κατάλληλο κλάδεμα ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός των δέντρων και αφαίρεση λαίμαργων βλαστών. - Προσεκτικές καλοκαιρινές αζωτούχες λιπάνσεις και κανονικές αρδεύσεις. <p>Επεμβάσεις μπορούν να γίνουν 5 - 8 Ιουνίου, σε δέντρα που είχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές στο φύλλωμα.</p> |
| <p>ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ :</p> <p><i>Σύσταση:</i></p> | <p>Οι πληθυσμοί του είναι περιορισμένοι. Συνιστώνται τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρθηκαν στο διαλευρώδη, που περιορίζουν την ανάπτυξη πυκνών πληθυσμών αλευρώδων. Να αποφεύγονται άσκοποι ψεκασμοί που καταστρέφουν τα παράσιτα του.</p> |
| <p>ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ :</p> <p><i>Διαπιστώσεις:</i></p> <p><i>Οδηγίες:</i></p> | <p>Παρατηρούνται αραιές οι πρώτες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση. Επειδή το έντομο αναπτύσσει πυκνούς πληθυσμούς το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, απαιτούνται προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί που θα περιορίσουν ένα έντονο δεύτερο κύμα βλάστησης. Τα κατάλληλα καλλιεργητικά μέτρα αποτρέπουν σοβαρές προσβολές του φυλλώματος στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας.</p> <p>Συνιστώνται τα <u>καλλιεργητικά μέτρα</u> που αναφέρονται στους αλευρώδεις.</p> <p>Να <u>προστατευτούν μόνο φυτώρια και νεαρά δέντρα ηλικίας 1-3 ετών</u> με ψεκασμούς κάλυψης σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν.</p> |

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι θερινοί πολτοί χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες κάτω των 32°C και σε δέντρα ποτισμένα τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τον ψεκασμό.

Σε έντονες προσβολές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο θερινός πολτός σε συνδυασμό με ένα από τα εγκεκριμένα σκευάσματα.

- Επιλέγετε τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε. Να αποφεύγονται οι άσκοπες επεμβάσεις διότι βλάπτουν τα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα, αρπακτικά) που βρίσκονται σε υψηλούς πληθυσμούς αυτή την εποχή.
- Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των φαρμάκων πριν τη χρήση.

Ηράκλειο 25 Μαΐου 2012

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Τρουλλάκης Γιάννης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

– ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ

Η ασθένεια της Τριστέτσας οφείλεται στον ιό CTV και είναι η πιο σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως. Η διασπορά του ιού CTV γίνεται:

1. Με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια – εμβόλια).
2. Με έντομα φορείς (αφίδες).

Ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα αντιμετώπισης είναι η χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το λόγο αυτό συστήνουμε στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών:

1. Να μην προμηθεύονται δενδρύλλια εσπεριδοειδών από τυχαίους, παράνομους «φυτωριούχους».
2. Να μην προμηθεύονται εμβόλια από αγνώστου φυτοϋγειονομικής κατάστασης φυτείες.
3. Να προμηθεύονται δενδρύλλια και εμβόλια εσπεριδοειδών μόνο από νόμιμους φυτωριούχους που διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής επιχείρησης και τα δενδρύλλια να είναι εφοδιασμένα με το σχετικό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και την ετικέτα πιστοποίησης.

Για την προστασία των καλλιεργειών απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.

– ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στα πλαίσια εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και της ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύμφωνα με το Νόμο 4036/2012, οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να καταγράφουν και να τηρούν σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια τα παρακάτω στοιχεία:

- Όνομα φυτοπροστατευτικού προϊόντος
- Ημερομηνία εφαρμογής
- Δόση εφαρμογής
- Περιοχή
- Καλλιέργεια

Η παραπάνω καταγραφή διευκολύνει διαχρονικά την αξιολόγηση των εφαρμογών με σκοπό την μείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους, συμβάλλει στην μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και προωθεί τη χρησιμοποίηση της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας των καλλιεργειών.

Σε περίπτωση μη καταγραφής προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α'8) και συγκεκριμένα πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Ηράκλειο 25 Μαΐου 2012
Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Τρουλλάκης Γιάννης