

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Ετσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ξεχώρισμα σταφυλιών
(συσπειρωμένα βοτρύδια)



Ξεχώρισμα σταφυλιών
(διαχωρισμένα βοτρύδια)



Μούρο και έναρξη άνθησης

Βλαστικά στάδια ποικιλίας σουλτανίνα

- Πρώιμες περιοχές : έναρξη άνθησης
- Μεσοπρώιμες περιοχές : ξεχώρισμα σταφυλιών – έναρξη μούρου
- Όψιμες περιοχές : ξεχώρισμα σταφυλιών

Βροχοπτώσεις περιόδου 2 - 5 Μαΐου σε mm (χιλιοστά).

Ημέρα	Αγία Βαρβάρα	Ασήμι	Κολυμβάρι	Σητεία	Ρέθυμνο (Μιστρία)	Άγιος Μύρωνας	Ηράκλειο (ΤΕΙ)	Τυμπάκι	Ιεράπετρα	Αρχάνες	Βιάννος	Οροπέδιο Λασιθίου
Δε. 2	1	2,6	2,2	3,4	0	0	0,2	1,4	5,8	1,2	5,4	1,6
Τρ. 3	17,8	3,8	6,2	0,4	0	1	0	13,2	1	1,8	0,8	5,2
Τε. 4	4,8	1,8	5,8	0,4	0,8	0	0,6	0	4,6	0	2,6	1,8
Πε. 5	2,4	12,2	0	0,2	1,8	0	0,4	0	10,4	1,6	0,8	4,2
Σύνολο	26	20,4	14,2	4,4	2,6	1	1,2	14,6	21,8	4,6	9,6	12,8

(Στοιχεία Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών ΠΚΠΦ&ΠΕ Ηρακλείου)



Περονόσπορος. Κηλίδες λαδιού στην πάνω πλευρά και λευκό χνούδι (σπόρια) μόνο στην κάτω πλευρά με υψηλή βραδινή υγρασία



Περονόσπορος. Προσβολή στο σταφύλι. Μοιάζουν με «βρασμένα χόρτα», ξεραίνονται τμήματα ή και ολόκληρα σταφύλια παίρνοντας συχνά σχήμα S (δεξιά φωτογραφία)



Ωίδιο. Αλευρώδεις εξανθήσεις (σπόρια)

Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα

Ωίδιο. Προσβολή σε άνθη (αλευρωμένα)



Τζιτζικάκι.
Ενίλικο (πτερωτό)
έντομο.
Είναι τα
μεταναστευτικά
άτομα του είδους.

Τζιτζικάκι.
Προνύμφη του
εντόμου. Δεν πετά,
είναι στην κάτω
πλευρά του
φύλλου, βαδίζει
με πλάγια κίνηση.

Τζιτζικάκι. Καρούλιασμα
και μεταχρωματισμός σε
φύλλα ποικιλίας σουλτανί.
Στις ερυθρές ποικιλίες ο
μεταχρωματισμός είναι
κοκκινωπός.

Θρίπες.
Έχουν
μακρόστενο
σώμα και
γρήγορη
κίνηση.

Ψευδόκοκκος. Νύμφες και
έντονη παρουσία
μυρμηγκιών. Την εποχή αυτή
εντοπίζονται κάτω από το
ρυτίδωμα στο άνω μέρος του
κορμού και στους βραχίονες.

Πληροφορίες : N. Μπαγκής.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: P. Οικονομάκη, E.Ηλιάκη, N. Μπαγκής.

<p>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: <i>(Plasmopara viticola)</i></p> <p><i>Oδηγίες :</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Μετά από παρατεταμένη ανομβρία οι πρόσφατες τοπικές βροχοπτώσεις ύψους 1 - 30 χιλ. δημιουργούν συνθήκες για μελλοντικές μολύνσεις, ιδιαίτερα όπου συνοδεύτηκαν με ισχυρές διωγράνσεις των φύλλων. - Συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) προβλέπεται να εμφανιστούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας (9 - 10 Μαΐου). - Χρόνος προληπτικής επέμβασης: 8 - 9 Μαΐου. Να προτιμηθούν σκευάσματα επαφής. - Ελέγχετε συστηματικά τα αμπέλια σας, φύλλωμα και σταφύλια (αυτή την εποχή χτυπά κατ' ευθείαν τα σταφύλια). Σε περιοχές που εμφανιστούν συμπτώματα να γίνει αμέσως καταπολέμηση.
<p>ΩΙΔΙΟ: <i>(Erysiphe necator)</i></p> <p><i>Oδηγίες :</i></p>	<p>Υπάρχει σε πολλά αμπέλια και οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. Εάν επεκταθούν οι μολύνσεις ο έλεγχος είναι πολύ δύσκολος. Τα στάδια που ακολουθούν είναι ευαίσθητα στην ασθένεια. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.</p>
<p>ΕΥΔΕΜΙΔΑ: <i>(Lobesia botrana)</i></p>	<p>Η πρώτη πτήση του εντόμου (ανθόβια γενιά) στην πρώιμη ζώνη είναι στο τέλος της και στις υπόλοιπες ζώνες σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται ακόμη καταπολέμηση.</p>
<p>TZITZIKAKI: <i>(Empoasca spp)</i></p> <p><i>Oδηγίες :</i></p>	<p>Όπως φαίνεται από το δίκτυο παγίδευσης και τις δειγματοληψίες, στη μεσοπρώιμη ζώνη παρατηρείται ισχυρή διαφοροποίηση των πληθυσμών του από τοποθεσία σε τοποθεσία. Αυτό οφείλεται στη μεταναστευτική τάση που το διακρίνει. Υπάρχουν αμπέλια που πρέπει να προστατευτούν. Να γίνεται καταπολέμηση μόνο όταν διαπιστώσετε προνύμφες του εντόμου στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.</p>
<p>ΘΡΙΠΕΣ: <i>(Thripidae)</i></p> <p><i>Oδηγίες:</i></p>	<p>Από την έναρξη του μούρου μέχρι και την καρπόδεση ελέγχετε με τίναγμα πάνω σε λευκό χαρτί τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση. Σε περίπτωση παρουσίας του εντόμου συνιστάται άμεση επέμβαση.</p>
<p>ΠΛΑΝΟΚΟΚΚΟΣ: <i>(Planococcus ficus)</i></p> <p><i>Oδηγίες:</i></p>	<p>Την περίοδο αυτή βρίσκεται στα ψηλότερα στρώματα του ρυτιδώματος και μετακινείται στην τρυφερή βλάστηση.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Να ελέγχονται τα πρέμνα με προσεκτική αφαίρεση του ρυτιδώματος. Η έντονη παρουσία μυρμηγκιών προδίδει τις θέσεις του ψευδόκοκκου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σταφύλια που προορίζονται <u>για επιτραπέζια χρήση</u>. - Σε αμπέλια που μετά από έλεγχο εντοπίζονται πληθυσμοί να γίνεται επιμελημένος ψεκασμός σε φύλλωμα, σταφύλια και καλή διαβροχή του κορμού και των βραχιόνων.

Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών των αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστέλει.