

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Ετοι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



**Ευδεμίδα.** Προσβολές.



**Ευδεμίδα.** Ράγες προσβεβλημένες  
(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές οπές).



**Ωίδιο.** Προσβολή σε άξονες και μίσχους  
σταφυλιών.



**Ψευδόκοκκος.** Εγκατάσταση στα  
σταφύλια. Παρουσία μυρμηγκιών.



**Τζιτζικάκι.** Προνύμφη του  
εντόμου.



**Μύγα Μεσογείου.** Στοές που ξεκινούν από  
τα νύγματα.

<b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ :</b> <i>(Lobesia botrana)</i>	<p>Στις μεσοπρώιμες περιοχές η πτήση του εντόμου συνεχίζεται. Όπως δείχνουν οι παρατηρήσεις, η δραστηριότητα του εντόμου (ποκνότητα πληθυσμών - ωοτοκίες) διαφοροποιείται πολύ από περιοχή σε περιοχή και σε κάποιες περιπτώσεις από αμπέλι σε αμπέλι στην ίδια περιοχή.</p> <p>Συνιστάται πρώτος επαναληπτικός ψεκασμός στις μεσοπρώιμες περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:</p> <p>Επιτραπέζια: 21 - 22 Ιουλίου.      Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 25 - 27 Ιουλίου.</p>
<b>Μεσοπρώιμες περιοχές</b> ➔  <b>Πρώιμες περιοχές</b> <b>Ενδιάμεσες περιοχές</b> <b>&amp; κάτω Μεσσαρά</b> <b>(μόνο επιτραπέζια)</b> ➔	<p>- Στις πρώιμες και ενδιάμεσες περιοχές (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης ζώνης) συνεχίζεται η αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου.</p> <p>Συνιστάται δεύτερος επαναληπτικός ψεκασμός στις πρώιμες, ενδιάμεσες περιοχές και στην κάτω Μεσσαρά μόνο στα <u>επιτραπέζια</u> σταφύλια στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:</p> <p>Επιτραπέζια: 22 - 24 Ιουλίου.</p> <p><b>Σε σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν τις 25 Ιουλίου να μη γίνει καμία καταπολέμηση.</b></p> <p>Λόγω της πρώιμης χρονιάς προβλέπεται νωρίς συγκομιδή για αυτό να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ επέμβασης και συγκομιδής.</p> <p>Υπενθυμίζεται ότι όλα τα σταφύλια πρέπει να καλύπτονται καλά. Όπου δεν πάει φάρμακο θα γίνουν προσβολές (πίσω πλευρά, εσωτερικό του σταφυλιού). Η σωστή ρύθμιση των ψεκαστικών και γενικά μια επιμελημένη επέμβαση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια αποτελεσματική προστασία.</p> <p>Για τα αμπέλια του v. Χανίων θα εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο.</p>
<b>ΩΙΔΙΟ :</b> <i>(Erysiphe necator)</i>	<p>Οι προσβολές στους άξονες και στους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) συνεχίζονται και μετά το γυάλισμα.</p> <p><b>Σε επιτραπέζια σταφύλια να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</b></p>
<b>ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ</b> <i>(Planococcus ficus)</i> <b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ</b> <i>(Empoasca spp.)</i>	<p>Όπου εντοπίζονται πληθυσμοί με την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.</p> <p>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα <b>επιτραπέζια σταφύλια</b>.</p>
<b>ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ :</b> <i>(Ceratitis capitata)</i>  (οι οδηγίες αφορούν <b>επιτραπέζια χονδρόρογα σταφύλια</b> )	<p>Υπενθυμίζεται ότι σε <b>χονδρόρογα σταφύλια</b> που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό προσβολών ή κοντά σε κύριους ζενιστές της μύγας (όπως εσπεριδοειδή, οπωροφόρα δέντρα κλπ), ιδιαίτερα εφόσον έχουν προηγηθεί σε αυτούς σοβαρές προσβολές, οι αμπελουργοί προληπτικά μπορούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• να τοποθετούν παγίδες προσέλκυσης και θανάτωσης</li> <li>• όταν ψεκάζουν για την ευδεμίδα να χρησιμοποιούν <b>σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα</b>.</li> </ul>

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων σύμφωνα με τις λιστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.