

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καστοριάς 32A, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ευδεμίδα. Αυγά σε νεαρές ράγες (αριστερά) ευδιάκριτα με γυμνό μάτι (μέγεθος κεφαλής καρφίτσας), και αυγά σε μεγέθυνση (στο κέντρο πρώτης μέρας πρόσφατα τοποθετημένο και δεξιά έτοιμο να εκκολαφθεί – ορατή η κουλουριασμένη προνύμφη με καστανό κεφάλι).

Ευδεμίδα. Τέλειο έντομο.
Πεταλούδα περίπου 1εκ.

Ευδεμίδα. Προνύμφη
πολύ ευκίνητη, μέχρι 1εκ.
μήκος.



Ωίδιο. Μολύνσεις στο φύλλωμα

Ωίδιο. Σε νεαρές ράγες



ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ. Ενήλικο (πτερωτό) έντομο.

Είναι τα μεταναστευτικά άτομα του είδους.



ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ. Προνύμφη του εντόμου. Δεν πετά, είναι στην κάτω πλευρά του φύλλου, βαδίζει με πλάγια κίνηση.



ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ. Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα σουλτανί. Στις ερυθρές ποικιλίες ο μεταχρωματισμός είναι κοκκινωπός.

Πληροφορίες : *N. Μπαγκής. Παρατηρήσεις υπαίθρου: P. Οικονομάκη, P. Ηλιάκη, N. Μπαγκής 16.*

Σε όλες τις περιοχές βλαστικό στάδιο στην ποικιλία σουλτανίνα: ράγες σε ανάπτυξη.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(Lobesia botrana)

Διαπιστώσεις:

- Στην πρώιμη ζώνη η γενιά του εντόμου βρίσκεται στο τέλος της, λίγο μετά το μέσο στην μεσοπρώιμη και στο πρώτο μισό στην όψιμη ζώνη.
- Στις πρώιμες περιοχές οι ωοτοκίες σταδιακά μειώνονται, στις μεσοπρώιμες εμφανίζονται σταθερές και στις όψιμες πυκνώνουν.

Εξέλιξη ωοτοκιών σε σταφύλια σε διάφορες περιοχές του ν. Ηρακλείου (%)*

Ζώνη	20 Μαΐου	24 Μαΐου	27 Μαΐου	30 Μαΐου	6 Ιουνίου
Πρώιμη	13	27		35	28
Μεσοπρώιμη			10	33	33
Όψιμη					44

*Οι παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και περιγράφουν την γενική τάση των πληθυσμών του εντόμου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οδηγίες για επιτραπέζια:

Στα επιτραπέζια σταφύλια συνιστάται **επαναληπτικός ψεκασμός** σε όλες τις περιοχές στις παρακάτω ημερομηνίες:

- Πρώιμες - παραλιακές περιοχές: 8 - 9 Ιουνίου
- Ενδιάμεση ζώνη - Κάτω Μεσσαρά: 9 - 10 Ιουνίου
- Μεσοπρώιμες περιοχές: 11 - 12 Ιουνίου
- Όψιμες περιοχές: 11 - 12 Ιουνίου

Οδηγίες για οινάμπελα, σουλτανίνα:

Συστάσεις:

Στα οινοποιήσιμα και στη σουλτανίνα να γίνει **επαναληπτικός ψεκασμός** μόνο στις όψιμες περιοχές το διάστημα: 13 - 14 Ιουνίου.

Σημείωση: Το φάρμακο να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

ΩΙΔΙΟ:
(Erysiphe necator)

Να συνεχιστεί η προστασία με προληπτική εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την ορθή διαχείριση τυχόν ανθεκτικότητας.

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:
(Empoasca spp)

Σε αμπέλια που εντοπίζονται προνύμφες (άπερα άτομα) στην κάτω πλευρά των φύλλων μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

ΑΚΑΡΕΑ:
(Eriophyes vitis)

Παρατηρούνται αποικίες σε νεαρά φύλλα. Όπου εντοπίζονται μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με το ωίδιο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστέλει.