

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Ετσι προστατεύεστε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Ευδεμίδα. Προσβολές.



Ευδεμίδα. Ράγες προσβεβλημένες
(διακρίνονται οι χαρακτηριστικές οπές).



Ωίδιο. Προσβολή σε άξονες και μίσχους
σταφυλιών.



Ψευδόκοκκος. Εγκατάσταση στα
σταφύλια. Παρουσία μυρμηγκιών.



Τζιτζικάκι. Προνύμφη του
εντόμου.



Μύγα Μεσογείου. Στοές που ξεκινούν από
τα νύγματα.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: <i>(Lobesia botrana)</i>	<p>Στις όψιμες περιοχές αυτό το διάστημα παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα του εντόμου με βάση την πυκνότητα των πληθυσμών και τις ωοτοκίες.</p> <p>Συνιστάται πρώτος επαναληπτικός ψεκασμός στις όψιμες περιοχές στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:</p> <p style="text-align: center;">Επιτραπέζια: 29 - 30 Ιουλίου. Σταφιδάμπελα - οινάμπελα: 1 - 3 Αυγούστου.</p>
Μεσοπρώιμες περιοχές ⇒ <i>(μόνο επιτραπέζια)</i>	<p>Στις μεσοπρώιμες περιοχές συνεχίζεται η δραστηριότητα του εντόμου. Οι επιτόπιες παρατηρήσεις (πυκνότητα πληθυσμών - ωοτοκίες) δείχνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από αμπέλι σε αμπέλι και μια γενική τάση αύξησης της δραστηριότητάς του εντόμου κατά τις τελευταίες ημέρες.</p> <p>Συνιστάται δεύτερος επαναληπτικός ψεκασμός στις μεσοπρώιμες περιοχές μόνο στα επιτραπέζια σταφύλια στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:</p> <p style="text-align: center;">Επιτραπέζια: 1 - 3 Αυγούστου.</p> <p>Σε σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν τις 4 Αυγούστου να μη γίνει καρία καταπολέμηση.</p> <p>Η συγκομιδή προβλέπεται πρώιμη. Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ επέμβασης και συγκομιδής.</p> <p>Για τα αμπέλια του ν. Χανίων θα εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο.</p>
ΩΙΔΙΟ: <i>(Erysiphe necator)</i>	<p>Οι προσβολές στους άξονες και στους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) συνεχίζονται και μετά το γυάλισμα.</p> <p>Σε αμπέλια που τα σταφύλια βρίσκονται πριν από το γυάλισμα και σε σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση να συνεχιστεί η προστασία. Μπορεί να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</p> <p>Επιτραπέζια σταφύλια που θα τρυγηθούν πριν τις 4 Αυγούστου δεν χρειάζονται καταπολέμηση.</p>
ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ <i>(Planococcus ficus)</i> ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ <i>(Empoasca spp.)</i>	<p>Όπου εντοπίζονται πληθυσμοί με την επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.</p> <p>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα επιτραπέζια σταφύλια.</p>
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: <i>(Ceratitis capitata)</i> <i>(οι οδηγίες αφορούν</i> <i>επιτραπέζια χονδρόραγα</i> <i>σταφύλια)</i>	<p>Σε χονδρόραγα σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό προσβολών (όπως Μαλάδες, Φοινικιά, Σταυράκια, Αθάνατοι, Προφήτης Ηλίας, Αρχάνες) ή κοντά σε κύριους ξενιστές της μύγας (όπως εσπεριδοειδή, οπωροφόρα κλπ), ιδιαίτερα εφόσον έχουν προηγηθεί σε αυτούς σοβαρές προσβολές, οι αμπελουργοί προληπτικά μπορούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • να τοποθετούν παγίδες προσέλκυσης και θανάτωσης • όταν ψεκάζουν για την ευδεμίδα να χρησιμοποιούν σκευάσματα με έγκριση και για τη μύγα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας έχουμε αποστείλει.