

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους  
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



**Ευδεμίδα.** Τέλειο έντομο.  
Πεταλούδα περίπου 1εκ.



**Ευδεμίδα.** Προνύμφη πολύ  
ευκίνητη, μέχρι 1εκ. μήκος.



**Ευδεμίδα.** Προσβολή σε ράγες. Διακρίνεται η τρύπα  
και τα αποχωρήματα της προνύμφης.



**Ωίδιο.** Μολύνσεις στο φύλλωμα



**Ωίδιο.** Σε νεαρές ράγες



**Ωίδιο.** Προσβολή σε άξονες και μίσχους  
σταφυλιών.



**Τζιτζικάκι.** Ενήλικο (περωτό) έντομο.




**Τζιτζικάκι.** Προνύμφη του εντόμου (άπτερα άτομα).




**Τζιτζικάκι.** Καρούλιασμα και μεταχρωματισμός σε φύλλα σουλτανί.


**Διακύμανση πτήσης της ευδερίδας στην πρώιμη ζώνη**



**Διακύμανση πτήσης της ευδερίδας στη μεσοπρώιμη ζώνη**



**Εξέλιξη ωστοκίων σε σταφύλια σε διάφορες περιοχές του ν. Ηρακλείου (%)**



Εξέλιξη ωτοκίων σε σταφύλια σε διάφορες περιοχές του ν. Ηρακλείου (%)

Ζώνη	11 Μαΐου	17 Μαΐου	20 Μαΐου	24 Μαΐου	27 Μαΐου	30 Μαΐου	6 Ιουνίου	10 Ιουνίου	14 Ιουνίου
Πρώιμη	3	8	13	27		35	28	8	2
Μεσοπρώιμη		2		6	10	33	33	12	6
Όψιμη					3	9	44	32	22

Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής

17.

Παρατηρήσεις υπαίθρου: Ρ. Οικονομάκη, Ρ. Ηλιάκη, Ν. Μπαγκής

**Βλαστικά στάδια:** Στις πρώιμες περιοχές και ποικιλίες τα αμπέλια βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης του γυαλισματος. Στα υπόλοιπα αμπέλια συνεχίζεται η ανάπτυξη των ραγών.

<p><b>ΕΥΔΕΜΙΔΑ:</b> (<i>Lobesia botrana</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>-Στην πρώιμη και μεσοπρώιμη ζώνη η πτήση του εντόμου ολοκληρώνεται και οι ωτοκίες εμφανίζονται χαμηλές ενώ στην όψιμη ζώνη βρίσκεται λίγο μετά το μέσο και οι ωτοκίες σταδιακά μειώνονται.*</p> <p>*Οι παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές και περιγράφουν την γενική τάση των πληθυσμών του εντόμου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.</p> <p>Στα <b>επιτραπέζια σταφύλια</b> συνιστάται <b>επαναληπτικός ψεκάσμος</b> στις <b>όψιμες περιοχές</b> το διάστημα: <b>22 - 23 Ιουνίου</b>.</p>
<p><b>ΩΙΔΙΟ:</b> (<i>Erysiphe necator</i>)</p> <p>Διαπιστώσεις:</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>- Η ασθένεια υπάρχει παντού.</p> <p>- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών (λίκια) προσβάλλονται μέχρι το τέλος υποβαθμίζοντας τα σταφύλια που προορίζονται για επιτραπέζια χρήση.</p> <p>- Στα επιτραπέζια σταφύλια να γίνεται συστηματική αντιμετώπιση.</p> <p>- Στα υπόλοιπα αμπέλια μπορούν να γίνονται συνδυασμένες επεμβάσεις με την ευδεμίδα.</p> <p><b>Προσοχή.</b> Αυτή την περίοδο λόγω υψηλών θερμοκρασιών να αποφεύγεται η χρήση του θειαφιού γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης εγκαυμάτων.</p>
<p><b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:</b> (<i>Empoasca spp</i>)</p>	<p>Σε αμπέλια που εντοπίζονται προνύμφες (άπτερα άτομα) στην κάτω πλευρά των φύλλων μπορεί να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.</p>

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:** Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών-ασθενειών του αμπελιού να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας έχουμε αποστείλει.

Ηράκλειο 16 Ιουνίου 2016

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη