

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minagric.gr
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο
agrodeltiokriti@gmail.com

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 22

(Το δελτίο αφορά επιτραπέζια σταφύλια στις πρώιμες περιοχές Ηρακλείου - Λασιθίου)

Ευδεμίδα: Αντιμετώπιση στα επιτραπέζια σταφύλια της πρώιμης και ενδιάμεσης ζώνης Ηρακλείου - Λασιθίου.

Μόγα της Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια . Συνδυασμένη αντιμετώπιση με ευδεμίδα.





Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές. Η ζώνη των σταφυλιών να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από κάποιο έντομο (ευδεμίδα, ψευδόκοκκο) ή κάποιο μύκητα (βοτρυτή, όξινη σήψη) που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα.

Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της περιόδου και των ανέμων, που συνήθως πνέουν ισχυροί κατά την διάρκεια της ημέρας, συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται κοντά στο σούρουπο.

Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπέλου στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggolini				
		Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο M αρχή γυαλισματος - γυάλισμα		Στάδιο N έναρξη ωρίμανσης - πλήρης ωρίμανση
		Πρώιμη ζώνη			ωρίμανση σταφυλιών
		Μεσοπρώιμη		έναρξη ωρίμανσης	
Όψιμη ζώνη		έναρξη γυαλισματος			

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ρ.Οικονομάκη, Σ.Λούρου, Ν.Μπαγκής,
Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

Αμπέλι Δελτίο Ν° 22 - 18/7/2018

Σελίδα 1 από 2

ΕΥΔΕΜΙΔΑ :
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στους **ν. Ηρακλείου - Λασιθίου** στην **πρώιμη ζώνη**, στην **ενδιάμεση** (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και στην **κάτω Μεσσαρά** τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα (συλλήψεις, ωτοκίες).

Οδηγίες :

- **Επιτραπέζια σταφύλια** που θα συγκομιστούν στο **τελευταίο δεκαήμερο του μήνα** και μετά χρειάζονται προστασία.

- Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης:

**Πρώιμη - ενδιάμεση ζώνη
Ηρακλείου - Λασιθίου
και κάτω Μεσσαρά.**

- **Επιτραπέζια : 20 - 21 Ιουλίου**

Προσοχή. Να επιλέγονται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ :
(*Ceratitis capitata*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Την φετινή περίοδο καταγράφηκαν υψηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές) και σημαντικές προσβολές σε φρούτα που προηγούνται των σταφυλιών (βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, δαμάσκηνα κλπ), τα οποία συνήθως βρίσκονται κοντά στα αμπέλια.

- Προσβολές σε επιτραπέζια σταφύλια έχουν εμφανιστεί κατά θέσεις.

Οδηγίες :

- Τα σταφύλια που εμφανίζουν συμπτώματα και τα επιτραπέζια χονδρόρωγα σταφύλια που βρίσκονται σε περιοχές με ιστορικό ζημιών πρέπει να προστατευτούν. Οι αμπελουργοί μπορούν να κάνουν συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 18 Ιουλίου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).