

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο  
Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: [pkpfhgpr@otenet.gr](mailto:pkpfhgpr@otenet.gr)



Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)  
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο  
[agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)





Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο №8

(Νομοί Ηρακλείου - Λασιθίου)

- Ευδεμίδα:** Επαναληπτικός στην πρώιμη. Έναρξη γενιάς στην όψιμη ζώνη.
- Ωίδιο:** Ευαίσθητα βλαστικά στάδια του αμπελιού και αυξημένη παρουσία του μύκητα.
- Περωνόσπορος:** Να μη γίνονται συστηματικές επεμβάσεις.
- Τζιτζικάκι:** Συστηματικοί έλεγχοι. Αυξημένη η δραστηριότητα κατά θέσεις.

**Πιν. 1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα**

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας	Κλίμακα Baggioini				
		Στάδιο I Άνθηση	Στάδιο J Καρπόδεση	Στάδιο K Ανάπτυξη ραγών - Κατακόρυφη θέση σταφυλιού	
Πρώιμη ζώνη				ανάπτυξη ραγών - κατακόρυφη θέση	
Μεσοπρώιμη			τέλος καρπόδεσης - ανάπτυξη ραγών		
Όψιμη ζώνη		τέλος άνθησης - καρπόδεση			

**ΕΥΔΕΜΙΔΑ:**  
(*Lobesia botrana*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Στην **πρώιμη ζώνη** η 2<sup>η</sup> πτήση κλιμακώνεται, η δραστηριότητα αυξάνει και καταγράφονται πυκνές ωτοκίες.
- Η 2<sup>η</sup> πτήση ξεκίνησε και στην **όψιμη ζώνη**. Παρατηρούνται οι πρώτες ωτοκίες από 21 Μαΐου και οι πρώτες προνύμφες αναμένονται από 27 Μαΐου.

**Οδηγίες:**

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμη ζώνη (επαναληπτικός)	• Επιτραπέζια : 23 - 24 Μαΐου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 25 - 26 Μαΐου
Όψιμες περιοχές	• Επιτραπέζια : 27 - 28 Μαΐου
	• Σουλτανίνα - οινάμπελα : 29 - 30 Μαΐου

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ** Σε αμπέλια της όψιμης ζώνης με φαινόμενα παρατεταμένης άνθησης - ανισορραγίας τροποποιείται η επιδεκτικότητα των σταφυλιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ημερομηνία καταπολέμησης να μετατεθεί 1 - 2 ημέρες αργότερα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

**Σημείωση.** Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

**ΩΪΔΙΟ:**  
(*Erysiphe necator*)



**Γενικές πληροφορίες:**

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα και η παρουσία του αυξάνει.

**Οδηγίες:**

- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.
- Τα βλαστικά στάδια της άνθησης - καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών ραγών πρέπει να είναι καλυμμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**  
(*Plasmopara viticola*)



**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Ελάχιστες οι εμφανίσεις σε νέες θέσεις και οριακή η εξέλιξη του μύκητα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών για την ανάπτυξή του μέχρι σήμερα.

**Οδηγίες:**

- Δεν χρειάζονται συστηματικές καταπολεμήσεις.
- Όπου έχει εμφανιστεί να γίνεται καταπολέμηση και κυρίως σε περιόδους με έντονες νυχτερινές δροσιές ή με πρόβλεψη βροχής. Η καιρική αστάθεια από 25 - 27 του μήνα (πρόβλεψη ΕΜΥ) πρέπει να βρει καλυμμένα τα αμπέλια με συμπτώματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

**ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:**  
(*Empoasca* spp)



**Οδηγίες:**

- Σε αμπέλια με αυξημένους πληθυσμούς να γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα μόνο όπου διαπιστώνεται όριο επιζημιότητας μετά από έλεγχο (50 - 100 άπτερα άτομα στην κάτω πλευρά 100 φύλλων).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκι πατήστε εδώ](#)

### **Φάρμακα :**

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

*Ηράκλειο 22 Μαΐου 2018*

*Η Προϊσταμένη Τμήματος*

*α/α*

*Οικονομάκη Ροζάνα*

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παραλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).