

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ και ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ του ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 27

(Το δελτίο αφορά επιτραπέζια σταφύλια όψιμης συγκομιδής στο ν. Ηρακλείου
και συστάσεις για την φυτοπροστασία όλων των αμπελιών μετά τον τρύγο)

Ευδεμίδα: Αντιμετώπιση στα επιτραπέζια σταφύλια του ν. Ηρακλείου που τρυγούνται όψιμα.

Μόγα της Μεσογείου: Επιτραπέζια σταφύλια. Συνδυασμένη αντιμετώπιση με ευδεμίδα.

Περωνόσπορος - Ωίδιο: Προστασία μετά τον τρύγο στα αμπέλια με προσβολές του φυλλώματος.

Σύμπλοκο ίσκας: Σήμανση των ύποπτων πρέμνων την περίοδο αυτή.

Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας στη φυτοπροστασία.

Η αποτελεσματικότητα των χημικών επεμβάσεων εξαρτάται άμεσα από τις καλλιεργητικές πρακτικές.
Η ζώνη των σταφυλιών πρέπει να διατηρείται ελεύθερη ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός αλλά και να φτάνει το φάρμακο στα σταφύλια. Σταφύλια κρυμμένα όπως και τα συμπαγή (σφιχτά) κατά κανόνα προσβάλλονται από φυτοπαράσιτα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα (όπως ευδεμίδα, ψευδόκοκκο, βοτρυτή, όξινη σήψη κ.ά.).

Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:
(*Lobesia botrana*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Την φετινή καλλιεργητική περίοδο και στην μεγάλη έκταση των αμπελιών οι πληθυσμοί του εντόμου ήταν μέτριοι και ελέγχθηκαν ικανοποιητικά στα αμπέλια που πέρα από τους αναγκαίους ψεκασμούς εφαρμόστηκαν καλλιεργητικά μέτρα (ξεφύλλισμα, βλαστολόγημα, ξεκρέμασμα σταφυλιών).
- Μια νέα γενιά (4^η πτήση) έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες και μπορεί να ζημιώσει επιτραπέζια σταφύλια που τρυγούνται όψιμα.

Οδηγίες:

- Τα επιτραπέζια σταφύλια που θα τρυγηθούν όψιμα συνιστάται να προστατευτούν.

Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης:

- Επιτραπέζια σταφύλια όψιμης συγκομιδής: 11 - 13 Σεπτεμβρίου

Προσοχή. Να επιλέγονται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής πριν τη συγκομιδή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ :
(*Ceratitis capitata*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :


- Την φετινή περίοδο έχουν παρατηρηθεί :
 - υψηλοί πληθυσμοί στο δίκτυο παγίδευσης των εσπεριδοειδών (κύριοι ξενιστές),
 - σημαντικές ζημιές σε φρούτα που η ωρίμαση τους προηγήθηκε των σταφυλιών (όπως βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, δαμάσκηνα)
 - διάσπαρτες προσβολές σε χονδρόρωγα επιτραπέζια σταφύλια (συνήθως αυτά βρίσκονται κοντά σε οπωροφόρα με προσβεβλημένα φρούτα).
- Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχουν κατά θέσεις δυναμικοί πληθυσμοί της μύγας. Η μύγα προσβάλλει τους καρπούς των ξενιστών της από την έναρξη της ωρίμασης. Επειδή την περίοδο αυτή, δεν υπάρχουν πολλά φρούτα - ξενιστές της μύγας που να ωριμάζουν, είναι αυξημένος ο κίνδυνος για προσβολές σε χονδρόρωγα σταφύλια.

Οδηγίες :

- Στα επιτραπέζια χονδρόρωγα σταφύλια που συγκομίζονται όψιμα συνιστάται να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με την ευδεμίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη [μύγα μεσογείου πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ :
(*Plasmopara viticola*)



ΩΙΔΙΟ :
(*Erysiphe necator*)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Περονόσπορος : Για άλλη μια χρονιά καταγράφηκαν σοβαρές προσβολές σε πολλά αμπέλια, κυρίως στα φυλλώματα. Ο μύκητας εγκαταστάθηκε δυναμικά με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις αρχές Απριλίου. Στη συνέχεια, οι συνθήκες αυξημένης υγρασίας και διύγρυνσης της βλάστησης που επικρατούσαν κατά διαστήματα, σε συνδυασμό με τις σποραδικές τοπικές βροχές που σημειώθηκαν μέχρι και τις αρχές του Ιουλίου, ευνόησαν δυναμικές προσβολές. Επισημαίνεται ότι η πρόωρη αποφύλλωση, εκτός από την ανεπαρκή ωρίμαση των σταφυλιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή του επόμενου έτους. Επιπλέον, οι όψιμες φθινοπωρινές προσβολές του φυλλώματος έχουν σοβαρό ρόλο στην επιδημιολογία της ασθένειας για τις επόμενες χρονιές.
- Ωίδιο : Οι έντονες προσβολές του μύκητα προκαλούν την εξασθένηση της βλάστησης και έχουν αρνητική επίδραση στην φυτοϋγεία του αμπελιού και κατά συνέπεια στην παραγωγή της επόμενης χρονιάς.

Οδηγίες :

- Για όλους τους παραπάνω λόγους συνιστάται αντιμετώπιση μετά τον τρύγο :
 - Σε αμπέλια με προσβολές περονόσπορου με τις πρώτες βροχές, κατά προτίμηση με χαλκούχα σκευάσματα.
 - Σε αμπέλια με έντονες προσβολές ωιδίου, κατά προτίμηση με βρέξιμο θείο.
 - Σε αμπέλια με προσβολές και από τους δυο μύκητες, συνδυασμένη επέμβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο πατήστε εδώ](#)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΙΣΚΑΣ :



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Συμπτώματα του συμπλόκου της ισκάς παρατηρούνται κάθε χρόνο στα αμπέλια. Τα προσβεβλημένα πρέμνα επισημαίνονται εύκολα την περίοδο αυτή καθώς παρουσιάζουν χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως:
 - Μεταχρωματισμό φύλλων (χρώμα κεραμιδι και εμφάνιση τριχρωμίας με καστανή, κίτρινη και πράσινη ζώνη - σύμπτωμα «τίγρης»).
 - Σταδιακή ή απότομη ξήρανση βλαστών και σταφυλιών.
 - Καστανό μεταχρωματισμό του ξύλου σε τομή του βραχίονα.

Οδηγίες :

- Να γίνει η επισημάνση των ύποπτων πρέμνων αυτή την περίοδο. Ικανοποιητικός έλεγχος της ασθένειας επιτυγχάνεται προληπτικά :
 1. με καλλιεργητικά μέτρα που εφαρμόζονται κατά τα κλαδέματα και
 2. με επαλείψεις ή ψεκασμούς που γίνονται αμέσως μετά το κλάδεμα, κυρίως στις μεγάλες κλαδοτομές.

Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν σε επόμενο δελτίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ίσκα πατήστε εδώ](#)

Επισημάνση :

- ✓ Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.
- ✓ Να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή.
- ✓ Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια.
- ✓ Προτιμήστε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.
- ✓ Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι στηρίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο και αντιπροσωπευτικό δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών & μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις ζώνες πρωιμότητας: **πρώιμη** (παρالياκή), **μεσοπρώιμη** (ευδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και δίνουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να ισχύουν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Ηράκλειο 10 Σεπτεμβρίου 2020
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη