

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο Ν° 15

Ευδεμίδα:

Έναρξη αντιμετώπισης για την 3^η πτήση (2^η καρπόβια γενιά) σε :

- πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου (οινοποιήσιμα, σουλτανίνα)
- ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) του ν. Ηρακλείου και κάτω Μεσσαρά
- μεσοπρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου (επιτραπέζια)
- πρώιμες περιοχές των ν. Χανίων - Ρεθύμνου

Ωίδιο:

Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα → θέλει προσοχή.





Τζιτζικάκια:

Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.

Βλάστηση και φαινολογία

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται το τελευταίο δεκαπενθήμερο η εξέλιξη των βλαστικών σταδίων επιβραδύνθηκε → η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι στις 7 ημέρες περίπου.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας				
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών		Στάδιο M αρχή γυαλισματος γυάλισμα	
Κλίμακα BBCH	77		81	
Πρώιμη ζώνη			τα σταφύλια γυαλίζουν	
Μεσοπρώιμη			έχει ξεκινήσει το γυάλισμα	
Οψιμη ζώνη	τα σταφύλια κλείσανε			



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

Στους ν. Ηρακλείου - Λασιθίου από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη και στην πρώιμη ζώνη των ν. Χανίων - Ρεθύμνου η 3^η πτήση έχει ξεκινήσει. Προς το παρόν η δραστηριότητα δείχνει να είναι χαμηλή και οι ωοτοκίες που διαπιστώνονται είναι αραιές.

Οδηγίες:

Στις παραπάνω περιοχές συνιστάται να ξεκινήσει αντιμετώπιση. Ενδεικτικές ημερομηνίες :

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ

➤ Πρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 8 - 10 Ιουλίου.

➤ Ενδιάμεση ζώνη ν. Ηρακλείου (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά:

- Επιτραπέζια : 8 - 9 Ιουλίου.
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : 11 - 12 Ιουλίου.

➤ Μεσοπρώιμες περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου:

- Επιτραπέζια : 11 - 13 Ιουλίου.
- Σουλτανίνα - οινάμπελα : θα ενημερωθείτε στο επόμενο δελτίο*.

Ν. ΧΑΝΙΩΝ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ

- Πρώιμες περιοχές ν. Χανίων - Ρεθύμνου: 10 - 12 Ιουλίου.

*Στο επόμενο δελτίο θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη της ευδεμίδας και στις υπόλοιπες περιοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προσβολές από τις προνύμφες της 3ης γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια.

Ο ψεκασμός να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Υπενθυμίζεται ότι οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ από το γυάλισμα και μετά νέες μολύνσεις γίνονται στους άξονες και στους μίσχους των σταφυλίων καθώς και στη νέα βλάστηση.

Οδηγίες:

- Τα αμπέλια πρέπει να είναι καλυμμένα την περίοδο αυτή. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση).
- **Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.**

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ:

(*Empoasca spp*)



Πτερωτό

Άπτερο



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Υπάρχουν αρκετά αμπέλια με πληθυσμούς πάνω από το όριο επέμβασης.
- Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση στοχεύει τις άπτερες μορφές του εντόμου.

Οδηγίες:

- Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης : **τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.**
- Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι : Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (2 - 3 φύλλα/πρέμνο) τα οποία βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα του βλαστού (όχι όμως τα πρώτα, ένα - δυο πολύ τρυφερά φύλλα της κορυφής). Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
- Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την ευδεμίδα. Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό ή την ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε με ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από τη νέα εφαρμογή «i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Για κατέβασμα σε Android Play Store

<https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives>

- Για κατέβασμα σε Apple Store

<https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080>



Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

*Ηράκλειο 7 Ιουλίου 2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη*