

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

Πληροφορίες: Ν.Μπαγκής – Α. Παπαδάκη / Παρατηρήσεις υπαίθρου : Ν.Μπαγκής, Α. Παπαδάκη, Δίκτυο Οινοποιών


ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Δελτίο Ν°23

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (*Lobesia botrana*)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

1. Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια ταυτόχρονη αύξηση των συλλήψεων και των ωοτοκίων του εντόμου σε όλες τις ζώνες παρακολούθησης (πρώιμη, μεσοπρώιμη, όψιμη).
2. Υπάρχουν αρκετά αμπέλια, κυρίως στην όψιμη αλλά και στη μεσοπρώιμη ζώνη, όπου ο τρύγος καθυστερεί.
3. Υπενθυμίζεται ότι στα σταφύλια που προορίζονται για τελικό ποιοτικό προϊόν, το όριο ανοχής προσβολών είναι πολύ μικρό έως μηδενικό την εποχή αυτή (περκασμός, ωρίμαση).



Οδηγίες:

- ❖ Για όλους τους παραπάνω λόγους στα αμπέλια που θα συγκομιστούν μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου συνιστάται αντιμετώπιση.

- Ενδεικτικές ημερομηνίες αντιμετώπισης : 2 - 4 Σεπτεμβρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

(*Plasmopara viticola*)



Όψιμες προσβολές στα φύλλα



Πρόωρη αποφύλλωση

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

1. Οι νυχτερινές δροσιές της περιόδου και η πρόβλεψη βροχών στην επόμενη εβδομάδα ([πρόγνωση ΕΜΥ](#)) ευνοούν νέες μολύνσεις στη βλάστηση.
2. Οι έντονες προσβολές στη βλάστηση προκαλούν πρόωρη αποφύλλωση και επηρεάζουν αρνητικά την ξυλοποίηση των κληματίδων.
3. Επιπλέον, οι φθινοπωρινές προσβολές του φυλλώματος είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση του μύκητα στο έδαφος για αρκετά χρόνια (3-5).

Οδηγίες:

- Για όλους τους παραπάνω λόγους συνιστάται προστασία του φυλλώματος :
 1. Στα αμπέλια που έχουν ήδη τρυγηθεί αυτήν την περίοδο.
 2. Στα υπόλοιπα αμπέλια αμέσως μετά τον τρύγο.

Σε αμπέλια με έντονες προσβολές ωιδίου να γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον [περονόσπορο εδώ](#)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ) :

- Εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
Προσοχή: Σε αμπέλια που βρίσκονται κοντά στη συγκομιδή να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής από την τελευταία εφαρμογή.

Συνιστάται να επιλέγετε σκευάσματα με τους λιγότερους κινδύνους για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα δεν είναι ακίνδυνα. Θυμηθείτε πριν την εφαρμογή να ελέγχετε τη σήμανση κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας - προφύλαξης και να παίρνετε απαραίτητως μέτρα προστασίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.



Ηράκλειο 1 Σεπτεμβρίου 2023

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αμπελιού, μηλοειδών, πατάτας οροπεδίου Λασιθίου αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή πατώντας εδώ	
Εφαρμογή I-Agric του ΥΠΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο	

Σύνδεσμοι προς ενημέρωση...

[Ψεκαστικά μηχανήματα – Επιθεώρηση - Βαθμονόμηση](#)

[Συμβουλευτικά δελτία άρδευσης \(χάρτης\) και \(ανά ΠΕ και περιοχή\)](#)