

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)
Τ.Κ. 451 10 Ιωάννινα
Πληροφορίες: Κ. Βάντζιος.
Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055
FAX : 26510 41902

ΑΜΠΕΛΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος

2. 28 / 3 / 2011

ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ : Λήθαργος
ΛΕΥΚΑΔΑ: Φούσκωμα οφθαλμών
ΚΕΡΚΥΡΑ: Φούσκωμα οφθαλμών

ΦΟΜΟΨΗ

Οι μολύνσεις γίνονται στο στάδιο της έκπτυξης των οφθαλμών. **Η βροχή είναι απαραίτητη για να γίνουν μολύνσεις. Το μόλυσμα προέρχεται από προσβεβλημένες κληματίδες που έπρεπε να εξαιρεθούν με το κλάδεμα Βλ ΓΠ 1.11/1/2011.**

Καταπολέμηση

Συνιστάται να ακολουθηθεί μία από τις δύο παρακάτω στρατηγικές προληπτικής αντιμετώπισης:

- 2 ανοιξιάτικοι ψεκασμοί με μυκητοκτόνο επαφής (μανκοζέμπ, ντιθιανόν, φολπέτ κ.α.): **ο πρώτος** όταν έχουν ανοίξει τα μισά περίπου μάτια και **ο δεύτερος** όταν το 40% των ματιών βρίσκονται στο στάδιο της έκπτυξης των 2-3 πρώτων φύλλων ή
- **Ένας ψεκασμός με σκευάσματα που συνδυάζουν το Φοζεθύλ-αλ με μυκητοκτόνο επαφής (φοζεθύλ-αλ + φολπέτ, φοζεθύλ-αλ + μανκοζέμπ, φοζεθύλ-αλ + φλουοπικολίντ κ.α.) στο στάδιο της έκπτυξης των πρώτων φύλλων (σκάσιμο ματιού).**

ΩΙΔΙΟ

Στο στάδιο έκπτυξης 2-3 φύλλων μπορεί να γίνει ένας ψεκασμός με Βρέξιμο Θείο. **Η πρώτη επέμβαση είναι πολύ σημαντική όταν την προηγούμενη χρονιά είχαν παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές ωιδίου.**

Κατάλληλα φάρμακα :θείο, μυκλομπουτανίλ, συπροκοναζόλ, πενκοναζόλ, τεμπουκοναζόλ, τριαντιμενόλ, φενμπουκοναζόλ, τριφλοξυστρομπίν, αζοξιστρομπίν, κρεσοξίμ-μεθύλ, κινοξιφέν, μεπτυλντινοκάπ, μετραφενόν, μπουπιριμέιτ, σπιροξαμίν κ.α. βλέπε λίστα..

ΕΡΙΝΩΣΗ

Η ερίνωση προκαλεί εξογκώματα στην άνω επιφάνεια των φύλλων, αντιμετωπίζεται εύκολα με το θειάφι στο στάδιο της έκπτυξης των 2-3 φύλλων.

ΑΚΑΡΙΩΣΗ

Προκαλεί βραχυγονάτωση, μειωμένη και καθυστερημένη ανάπτυξη βλαστών (προσοχή το σύμπτωμα αυτό το προκαλούν και άλλες ασθένειες). **Μόνο σε αμπελώνες που διαπιστώθηκε η ύπαρξη του εχθρού την περασμένη χρονιά να γίνει ψεκασμός με ειδικό ακαρεοκτόνο (βλ. λίστα) από το στάδιο της πράσινης (ή ρόδινης) κορυφής έως το στάδιο έκπτυξης 2-3 φύλλων.**

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ

Σε ορισμένες χρονιές και σε ορισμένους αμπελώνες παρατηρούμε καταστροφή οφθαλμών από έντομα που δραστηριοποιούνται κυρίως την νύχτα. Σε περίπτωση που με καταμέτρηση έχουμε περισσότερα από 10-15% των πρέμνων με τουλάχιστον ένα οφθαλμό φαγωμένο δικαιολογείται ένας απογευματινός ψεκασμός με κατάλληλο σκεύασμα (βλ λίστα).

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Είναι επιβεβλημένος ένας τουλάχιστον ψεκασμός με βρέξιμο θείο μέχρι την έξοδο των 2-3^{ων} φύλλων που έχει δράση ενάντια στη φόμοψη, το ωΐδιο και την ερίνωση. Η δόση πρέπει να κυμαίνεται στα 500-100 gr/hl ώστε ο ψεκασμός να είναι αποτελεσματικός κατά της Φόμοψης.

Για το ωΐδιο μπορεί να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα του ανταγωνιστικού μύκητα αμπελόμυκες (Ampelomyces) το οποίο έχει καλύτερη δράση όταν εφαρμόζετε στην αρχή της προσβολής με δύο διαδοχικούς ψεκασμούς και με προσθήκη ενός προσκολλητικού. Όμως βροχή μεγαλύτερη των 6 mm θεωρούμε ότι έχει ξεπλύνει το σκεύασμα γι' αυτό καλύτερα να χρησιμοποιηθεί αργότερα που οι βροχές θα αραιώσουν .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν.