

ΑΜΠΕΛΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Σταύρου Νιάρχου (τέρμα)

Τ.Θ. 02 Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα

Πληροφορίες: Κ. Βάντζιος.

Τηλέφωνο : 26510 40707 , 26510 44055

FAX : 26510 41902

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

4. 12 / 5 /2011

Βλαστικό στάδιο: Ζίτσα Ιωαννίνων (Ντεμπίνα) έξοδος 5^{ου} φύλλου. Σακελαρικό 10-12 φύλλα.

Λευκάδα (Χλώρη, Merlot), Κέρκυρα (Κακοτρύγης): 10-12 φύλλα

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Δεν έχουν εκδηλωθεί μολύνσεις σε καμία περιοχή. Μετά από την σημαντική βροχόπτωση στις 9 Μαΐου στην Ζίτσα πρέπει να αναμένουμε την ανάπτυξη κηλίδων από τις 19 Μαΐου. Να επιθεωρείτε τους αμπελώνες προκειμένου να ανακαλυφθούν οι πρώτες κηλίδες (βλ ΔΓΠ 3. 2/5/2011).

ΩΪΔΙΟ

Να αρχίσει η προστασία, με ψεκάσμό θείου ή διεισδυτικού σκευάσματος (π.χ πενκοναζόλ, τεμπουκοναζόλ, κρεσοξίμ-μεθύλ, τριφλοξιστρομπίν, πυρακλостρομπίν κ.α.) σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς εναντίον του περονόσπορου, **στις περιοχές και στις ποικιλίες που το μήκος βλάστησης έχει φτάσει τα 25 εκατοστά (διαχωρισμός τσαμπιού)**. Οι ψεκασμοί να επαναλαμβάνονται ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα και τις συνθήκες. Τα σκευάσματα να εναλλάσσονται μεταξύ των κατηγοριών και των ομάδων για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας (βλ κατηγορίες). Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο διεισδυτικό σκεύασμα σε παραπάνω από 2 διαδοχικούς ψεκασμούς και πάνω από 2-3 φορές ανά βλαστική περίοδο.

Με τις θερμοκρασίες της εποχής και μέχρι την έκδοση του επόμενου δελτίου αν χρησιμοποιείτε **θείο βρέξιμο ή σκόνη** οι εφαρμογές να επαναλαμβάνονται ανά 7 ημερών για την Κέρκυρα και την Λευκάδα έως 17 ημέρες για την Ζίτσα. Αντίθετα αν χρησιμοποιηθούν **διεισδυτικά** σκευάσματα τα διαστήματα επαναλήψεων είναι αντίστοιχα 12 ημέρες (Κέρκυρα Λευκάδα) έως 21 ημέρες (Ζίτσα).

Στους όψιμους αμπελώνες της Ζίτσας μέχρι να επιτευχθεί το στάδιο (διαχωρισμός τσαμπιού) να γίνει ψεκάσμος με θείο αν δεν έγινε στην έκπτυξη (βλ Δ.Γ.Π. **2. 28 / 3 / 2011**) ή αν παρήλθαν 17-21 μέρες από τον ψεκάσμό.

Κατηγορίες φαρμάκων για το ωΐδιο ως προς τον τρόπο δράσης (διάφορα σκευάσματα).

Κατ. Α) Επαφής : θείο (σκόνη ή βρέξιμο), μεπτυλντινοκάπ, ντινοκάπ.

Κατ. Β) Διεισδυτικά (μέχρι 3 εφαρμογές/χρόνο). Ομάδα 1: μικλομπουτανίλ, πενκοναζόλ, τεμπουκοναζόλ, φενμπουκοναζόλ, τριαντιμενόλ, συπροκοναζόλ. **Ομάδα 2:** σπιροξαμίν. **Ομάδα 3:** προκιναζίντ.

Κατ. Γ) Διεισδυτικά (μέχρι 2 εφαρμογές / χρόνο.) Ομάδα 1 : αζοξιστρομπίν, κρεσοξίμ-μεθύλ, τριφλοξιστρομπίν, πυρακλостρομπίν. **Ομάδα 2** κινοξιφέν. **Ομάδα 3** μποσκαλίντ. **Ομάδα 4** μετραφενόν.

Οι **βιοκαλλιεργητές** μπορεί να χρησιμοποιούν σκευάσματα του θείου ή και σκευάσματα του Αμπελόμυκες κουισκουάλις (καλύτερη δράση όταν εφαρμόζεται στην αρχή της προσβολής με δύο διαδοχικούς ψεκασμούς ανά 7-14 μέρες και με προσθήκη ενός προσκολλητικού. Βροχή μεγαλύτερη των 6 mm θεωρούμε ότι έχει ξεπλύνει το σκεύασμα).

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Στο στάδιο της πτώσης των πετάλων αν επικρατούν βροχές **πρέπει να γίνει ψεκασμός και για τον βοτρυτή εκτός από τον περονόσπορο και το ωίδιο.**

Κατάλληλα φάρμακα: Θειράμ, Φλουντιοξονίλ & Συπροντινίλ, Φολπέτ (δράση και στον περονόσπορο), Μεπανιπυρίμ, Μποσκαλίντ, Φενεξαμίντ, Φλουζινάμ, κ.α. (Διάφορα σκευάσματα.)

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η πτήση της πρώτης γενιάς είναι σε εξέλιξη, κανένας ψεκασμός δεν είναι επιβεβλημένος αυτήν την εποχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να χρησιμοποιείτε **μόνον** εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ αυτήν.



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία