

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**  
**ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**  
**ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση: Οδός Πανεπιστημίου (τέρμα)  
Τ.Θ.02 Τ.Κ. 45003 Ανατολή Ιωάννινα  
Τηλέφωνο : 26510 40707, 26510 44055  
FAX : 26510 41902

**ΑΜΠΕΛΙ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** Κ. Βάντζιος.

**7. 27 / 7 /2012**

**ΕΥΔΕΜΙΔΑ**

Η πτήση της τρίτης γενιάς ξεκίνησε. Ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο παγίδων είναι χαμηλός. Ειδικότερα στους αμπελώνες της Ζίτσας δεν χρειάζεται ψεκασμός.

Ένας ψεκασμός είναι δικαιολογημένος με την λήψη του δελτίου, ΜΟΝΟ σε αμπελώνες της Κέρκυρας και της Λευκάδας που κατά την προηγούμενη γενιά (τ. Ιουνίου-αρ. Ιουλίου) βρέθηκαν στα σταφύλια αρκετές φωλιές διατροφής (περισσότερες από 10 ζημιές-φαγώματα στα 100 τσαμπιά). Η καταπολέμηση αυτής της γενιάς είναι σημαντική και για την πρόληψη του σαπίσματος των σταφυλιών από τον βοτρύτη. Καλό είναι να χρησιμοποιηθούν φάρμακα με ωοκτόνο δράση (ρυθμιστές ανάπτυξης) ώστε να προλαμβάνεται η είσοδος της κάμπιας στην ράγα. Απαραίτητη είναι η καλή διαβροχή των τσαμπιών. Κατάλληλα φάρμακα: βλέπε λίστα που σας έχει σταλεί.

**ΒΟΤΡΥΤΗΣ**

Στο στάδιο του «γυαλίσματος» να γίνει ψεκασμός (ενδεχομένως συνδυασμός με την καταπολέμηση της ευδεμίδας) με ειδικό βοτρυδιοκτόνο σε όλες τις ευαίσθητες ποικιλίες (π.χ. Ντεμπίνα κ.α.). Η επέμβαση μπορεί να αφορά μόνο την ζώνη των σταφυλιών. Σε περιοχές που το σάπισμα παρουσιάζετε κάθε χρόνο (υγρά, ζωηρά, υπερπαραγωγικά αμπέλια), να γίνει επανάληψη του ψεκασμού κατά την ωρίμανση. Το ξεφύλλισμα βοηθάει στην αντιμετώπιση της ασθένειας καθώς τα σταφύλια αερίζονται και εκτίθενται στα φάρμακα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στην περιοχή της Ζίτσας, στην ποικιλία Ντεμπίνα, παρατηρείται φέτος σε μεγάλη συχνότητα, **μάρανση του κατώτερου τμήματος του τσαμπιού** που δεν πρέπει να αποδίδεται στο φαινόμενο της «ξήρανσης της ράχης». Οι ζημιές την τρέχουσα χρονιά σχετίζονται με την ταχύτερη αύξηση των ραγών (λόγο των υψηλών θερμοκρασιών που προηγήθηκαν). Η πίεση από έναν τομέα του τσαμπιού σε άλλον, οδηγεί στην αποκόλληση μιας διακλάδωσης του άξονα του τσαμπιού (η οποία ξηραίνεται γρήγορα) και μάρανση του υπόλοιπου τσαμπιού, από την πληγή και κάτω, λόγω διακοπής της συνέχειας των αγγείων. Το φαινόμενο είναι πιο έντονο σε ζωηρά αμπέλια, όπου τα τσαμπιά γίνονται πιο συμπαγή.

Μετά από το στάδιο του γυαλίσματος των ραγών και καθώς τα σταφύλια θα ωριμάζουν, ορισμένες ράγες θα διαρρηγνύονται από την πίεση. Πρέπει λοιπόν φέτος να περιμένουμε περισσότερα σαπίσματα του τσαμπιού από τον βοτρύτη και ανάπτυξη ΟΞΙΝΗΣ ΣΗΨΗΣ.

Συνεπώς οι ψεκασμοί εναντίον του βοτρύτη στην Ζίτσα, στο στάδιο του γυαλίσματος αλλά και κατά την ωρίμανση έχουν ιδιαίτερη σημασία την φετινή χρονιά. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα διαστήματα από την εφαρμογή σκευάσματος μέχρι τον τρύγο, ειδικά αν γίνει ψεκασμός κατά την ωρίμανση. Να μην γίνει χρήση της ίδιας ουσίας 2 φορές.

**Κατάλληλα φάρμακα:** Ιπροντιόν (21ημέρες), Φλουζινάμ (21ημέρες), Μεπανιπυρίμ (21ημέρες), Μποσκαλίντ (28ημέρες), Φλουντιοξονίλ+Συπροντινίλ (21ημέρες), Φενεξαμίντ (14), κ.α. (Διάφορα σκευάσματα.) Τα χαλκούχα σκευάσματα (21 ημέρες) βοηθούν στην αντιμετώπιση του Βοτρύτη καθώς «σκληραίνουν» την ράγα.

## ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Η σήψη αρχίζει από πληγή της ράγας κι επεκτείνεται γρήγορα στο υπόλοιπο μέρος του σταφυλίου. Χαρακτηριστικό της σήψης είναι η **οσμή ξυδιού** που αναδίδεται από τα προσβεβλημένα τμήματα. **Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη της Όξινης Σήψης στον αμπελώνα ενδείκνυνται η διενέργεια ψεκασμού με εντομοκτόνο (δελταμεθρίν, συπερμεθρίν κ.α.) για καταπολέμηση των εντόμων φορέων της ασθένειας, μαζί με την προσθήκη ενός χαλκούχου σκευάσματος (21 μέρες).**

## ΩΙΔΙΟ

Μετά από το στάδιο του γυαλίσματος οι ρώγες δεν προσβάλλονται από την ασθένεια. Όμως τα φύλλα οι βλαστοί και οι βόστρυχοι εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι. Να συνεχιστεί η προστασία σε αμπέλια με διαπιστωμένες προσβολές και σε εκείνα τα αμπελοτεμάχια που αναπτύσσεται υγρασία την νύχτα. Περισσότερη προσοχή να δοθεί στην Κέρκυρα και την Λευκάδα, όπου οι συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας παρέμειναν στο άριστο όλο τον Ιούλιο και ειδικότερα σε ποικιλίες που δεν έχουν περάσει το στάδιο του γυαλίσματος. Κατάλληλα φάρμακα βλ. λίστα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτήν.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΙΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Η Προϊσταμένη  
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα  
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).