

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ




Οδός: Πανεπιστημίου (τέρμα)

Τ.Κ.: 451 10 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 44055 – 26510 40707

Fax: 26510 41902



ΑΜΠΕΛΙ



1

2

3

4

5

6

7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Βάντζιος.

Βλαστικό στάδιο : Διαφοροποιημένα άνθη

4. 09/ 5 /2013

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι βροχές που εκδηλώθηκαν στο διάστημα από 6/5/2013 και ειδικά στις 8/5/2013 ήταν «μολυσματικές» στον Ν. Λευκάδας αλλά και σε περιοχές του Ν Κέρκυρας και του Ν Ιωαννίνων. Θα πρέπει να περιμένουμε την εμφάνιση των πρώτων κηλίδων από 13/5 στην Κέρκυρα και την Λευκάδα και από 16/5 στην περιοχή της Ζίτσας και Κόνιτσας.

Επωφεληθείτε από τις εργασίες αραίωσης βλαστών για να επιθεωρήσετε τους αμπελώνες, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν κηλίδες περονοσπόρου στα φύλλα. **Οι ψεκασμοί πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα σε όλες τις περιοχές, ώστε τα αμπέλια να είναι προστατευμένα πριν εμφανιστούν οι πρώτες κηλίδες.**

Οι ψεκασμοί να ανανεώνονται ανάλογα με την διάρκεια δράσης του χρησιμοποιούμενου σκευάσματος και την μετεωρολογική πρόγνωση. Για τα σκευάσματα που έχουν μόνο προστατευτική δράση σημειώνουμε ότι προστατεύουν τα φύλλα που καλύπτουν (μέχρι να ξεπλυθούν) για μια εβδομάδα το πολύ για αυτή την περίοδο που παράγονται ταχέως καινούρια φύλλα, ενώ τα διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα προστατεύουν για 10-12 μέρες.

Κάθε αμπελουργός να διατηρεί ημερολόγιο ψεκασμών. Αν σημειωθεί βροχόπτωση ενώ παράλληλα έχουν εμφανιστεί κηλίδες περονοσπόρου στην περιοχή και έχει παρέλθει η ισχύς του προηγούμενου ψεκασμού, πρέπει για τον συγκεκριμένο αμπελώνα να γίνει εφαρμογή ενός θεραπευτικού σκευάσματος εντός 24-48 ωρών το πολύ από την στιγμή που σημειώθηκε η μολυσματική βροχόπτωση ή από την στιγμή που σημειώθηκαν συνθήκες υγρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σκευάσματα βλ λίστα ΔΓΠ 2.20/3/2013.

ΩΙΔΙΟ

Με τις συνθήκες που επικρατούν τα διαστήματα ανάμεσα στις εφαρμογές πρέπει να είναι 5-7 μέρες αν χρησιμοποιείται θείο ή άλλα σκευάσματα επαφής και 10-14 μέρες αν χρησιμοποιούνται διασυστηματικά ή διεισδυτικά σκευάσματα. Για την Κέρκυρα και την Λευκάδα συγκρατήστε τα μικρότερα διαστήματα.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η πτήση της πρώτης γενιάς ολοκληρώνεται. Κανένας ψεκάσμος δεν είναι επιβεβλημένος σε καμία περιοχή. Να γίνει μόνο καταμέτρηση των φωλιών διατροφής στα τσαμπιά (άνθη) σε αμπελώνες που δέχονται προσβολές (Κέρκυρα και Λευκάδα). Το ποσοστό των ζημιών θα χρησιμοποιηθεί για την ενδεχόμενη καταπολέμηση της επόμενης γενιάς.

ΘΡΙΠΕΣ & ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ ΑΚΑΡΕΑ

Από παρατηρήσεις μας στην περιοχή της Ζίτσας, **διαπιστώθηκε ο εχθρός χωρίς όμως να ξεπερνά τα όρια σε κανένα αμπελώνα.**

Επειδή οι συνθήκες σε κάθε αμπελώνα είναι διαφορετικές, επιθεωρήστε τον αμπελώνα σας, τινάζοντας επάνω σε μια σκούρα επιφάνεια 50 βλαστούς (από 50 διάσπαρτα πρέμνα). Να γίνει ψεκάσμος μόνον αν εμφανιστούν 2-4 θρίπες ανά βλαστό ή 1-3 τζιτζικάκια ανά φύλλο με κατάλληλο εντομοκτόνο (βλ λίστα ΔΓΠ 2.20/3/2013).

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Να χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα (βλ λίστα ΔΓΠ 2.20/3/2013), να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα της συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτήν, μην κάνετε υπέρβαση των δόσεων και να ελέγχετε την συνδυαστικότητα των γεωργικών φαρμάκων. Να γίνονται εναλλαγές στη χρήση των ομάδων και των κατηγοριών των σκευασμάτων ως προς τον τόπο δράσης, για να προληφθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ασθενειών στα φάρμακα.



Η Προϊσταμένη
Του Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.Ιωαννίνων α.α.

Ιωάννα Γ. Χουλιάρα
Γεωπόνος

Το δελτίο παράγεται με βάση τοπικές παρατηρήσεις και γενικά μετεωρολογικά δεδομένα. Παρέχει μια τάση της περιφερειακής κατάστασης και δεν μπορεί να μεταφερθεί ως έχει σε κάθε αγροτεμάχιο. Οι αμπελουργοί καλούνται συνεπώς, για τις αποφάσεις που λαμβάνουν να ενσωματώνουν τις δικές τους παρατηρήσεις στηριζόμενοι στα ενημερωτικά δελτία. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).