



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600439

E mail : thgeorgiadou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις Δ.Α.Ο. Α.Μ.Θ και Δ.Α.Ο Σερρών

No 35/30-10-2026

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου

2^ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ENTOMO *Diabrotica virgifera*

Στόχοι

Ενημέρωση των καλλιεργητών αραβόσιτου με στόχο την αποτελεσματική καταπολέμηση του εντόμου.



Εικόνα: Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

Η υπηρεσία μας στα πλαίσια της εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με το υπ' αριθ.: **157885/17-06-2026** έγγραφο του αρμόδιου τμήματος του Υπουργείου και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Σερρών, εγκατέστησε δίκτυο φερομονικών παγίδων. Σκοπός της εγκατάστασης των παγίδων, η παρακολούθηση και καταγραφή της πτήσης του εντόμου *Diabrotica virgifera*.

Οι παγίδες τοποθετήθηκαν τέλη Μαΐου στις ΠΕ Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης και Ορεστιάδας όπου καλλιεργείται συστηματικά ο αραβόσιτος. Η παρακολούθηση και καταγραφή της πτήσης του εντόμου πραγματοποιούνταν ανά δεκαπενθήμερο. Η απομάκρυνση των παγίδων ολοκληρώθηκε σταδιακά τον Σεπτέμβριο μήνα λίγο πριν την έναρξη της συγκομιδής.

Διαπιστώσεις

Με βάση την επισήμανση της παρουσίας του εντόμου και την καταγραφή του μεγέθους του πληθυσμού από επιτόπιες παρατηρήσεις, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός συλλήψεων των ακμαίων ήταν ιδιαίτερα αυξημένος κατά τόπους (Σέρρες -Δράμα-Καβάλα) τον Ιούλιο και Αύγουστο μήνα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Για τις πρώιμα

εγκατεστημένες καλλιέργειες οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο μήνα ήταν ευνοϊκές, με αποτέλεσμα ο βιολογικός κύκλος του φυτού να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Οι συνεχείς αρδεύσεις που απαιτούνται κατά την θερινή περίοδο σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν, ενίσχυσαν το ριζικό σύστημα και συνέβαλλαν στο να αυξηθεί η μέση στρεμματική απόδοση (περίπου 1.500kg/στρέμμα) καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού. Έντονο πρόβλημα πτώσης των φυτών δεν παρατηρήθηκε, εκτός της Π.Ε Σερρών.

Στην Π.Ε Σερρών διαπιστώθηκε το πρόβλημα σε αγρούς όπου δεν εφαρμόζεται αμειψισπορά τα τελευταία πέντε έτη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (ισχυρούς ανέμους).

Η συγκομιδή για χλωρή μάζα πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο μήνα και για καρπό σχεδόν ολοκληρώθηκε το 1^ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Η αμειψισπορά εξακολουθεί να εφαρμόζεται συστηματικά σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Σερρών με καλλιέργειες όπως το σιτάρι, το κριθάρι, ο ηλίανθος, η σόγια, το τριφύλλι, και σε κάποιες περιοχές το βαμβάκι.

Καλλιεργητικά Μέτρα (Προφυτρωτικά -Μεταφυτρωτικά)

Αφορά την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική φυτοπροστασία του αραβόσιτου

Εξαιτίας των σχετικά υψηλών συλλήψεων ενηλίκων του εντόμου που καταγράφηκαν φέτος, συνιστάται να γίνει κατάλληλος προγραμματισμός την επόμενη καλλιεργητική περίοδο για την εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια αραβόσιτου λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

- Τουλάχιστον ετήσια αμειψισπορά με εναλλαγές καλλιεργειών σε ψυχανθή, ενεργειακά φυτά ή φυτά μεγάλης καλλιέργειας.
- Σωστή προετοιμασία του εδάφους αμέσως μετά τη συγκομιδή και πριν την σπορά.
- Συνιστάται πρώιμη σπορά όπου οι μετεωρολογικές συνθήκες ανά περιοχή το επιτρέπουν.
- Ορθή χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.
- Εντατική καταπολέμηση των ζιζανίων με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
- Επιλογή του κατάλληλου σπόρου ανάλογα με το είδος σποράς και τη χρήση του.


Συστάσεις

- Αποφυγή καύσης των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. Έχει αποδειχθεί με βάση τη βιολογία των εντόμων (διαχειμάζουν στο στέλεχος ή στο έδαφος) ότι δεν θανατώνονται οι προνύμφες ούτε μειώνεται ο πληθυσμός τους. Επιπλέον καταστρέφονται σε μεγάλο ποσοστό άλλοι ωφέλιμοι οργανισμοί καθώς και η δομή του εδάφους. Εναλλακτικά συνιστάται η καταστροφή των στελεχών-υπολειμμάτων με χρήση καταστροφέα. Ακολουθεί όργωμα σε βάθος (15 – 20 cm) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος τους φθινοπωρινούς μήνες.
- Συγκομιδή με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης στον σπάδικα. Η τεχνητή ξήρανση του καρπού πραγματοποιείται σε αποθήκες ή σε ειδικούς χώρους (ξηραντήρια).
- Σωστή αποθήκευση για την αποφυγή εντομολογικών και μυκητολογικών ασθενειών μέχρι τη διάθεσή του προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες για την καταπολέμηση του εντόμου στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Δ.Α.Ο Δράμας το οποίο είναι διαθέσιμο προς κάθε ενδιαφερόμενο στο διαδίκτυο:

<https://planthealthdrama.wordpress.com/2020/02/19/διαβρώτικα-οδηγίες-αντιμετώπισης-2020/>.

- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις , thgeorgiadou@minagric.gr, miliadou@minagric.gr
- Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου