



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600421-3
 Fax: 2510 600430
 E mail : miliadou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 22/10-07-2019

Πληροφορίες : Δημήτρης Συρόπουλος, Στέλλα Σπύρογλου, Μαρία Ηλιάδου
 και κατά τόπους ΔΑΟΚ.

2^ο Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την μηλιά

Καρπόκαψα Μηλιάς (*Cydia pomonella*)

Διαπιστώσεις



Από την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, διαπιστώνουμε ότι η πτήση της 3^{ης} γενεάς του εντόμου ξεκίνησε την 01-07-2019 και συνεχίζεται με ανοδική πορεία.

Τα ενήλικα της 3^{ης} γενεάς ωοτοκούν κατευθείαν επάνω στους καρπούς και ανάλογα με τη σοβαρότητα της προσβολής στην περιοχή κατά τα προηγούμενα έτη, μπορεί να χρειασθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή των ζημιών από τα μέσα Ιουλίου και μετά.

Η γενεά αυτή διαρκεί περίπου 25 ημέρες και η νεαρή προνύμφη περιπλανάται 2-3 ημέρες επί του καρπού πριν εισχωρήσει εντός αυτού. Η

περίοδος αυτή είναι η πιο αποτελεσματική για την καταπολέμησή της.

Η πορεία των συλλήψεων της καρπόκαψας είναι ενδεικτική για την πορεία εξέλιξης του εντόμου για μία ευρεία περιοχή. Επειδή όμως, υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης μεταξύ των κτημάτων μίας περιοχής καλό είναι οι παραγωγοί να παρακολουθούν την εμφάνιση της καρπόκαψας στα κτήματά τους, με σκοπό τη καλύτερη εκτίμηση της αναγκαιότητας του ψεκασμού.

Συστάσεις

Συνιστάται να γίνει ψεκασμός άμεσα, με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Επανάληψη του ψεκασμού μετά από 10 -12 ημέρες περίπου και σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν.

Γενική παρατήρηση

Οι παραγωγοί θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες έγκρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό επεμβάσεων με το ίδιο εντομοκτόνο.

Οι επόμενοι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων να περιορίζεται μόνο στους απαραίτητους ψεκασμούς με βάση την παρακολούθηση του εντόμου.

Η πορεία των συλλήψεων της καρπόκαψας είναι ενδεικτική για την πορεία εξέλιξης του εντόμου για μία ευρεία περιοχή. Επειδή όμως, υπάρχει πιθανότητα διαφοροποίησης μεταξύ των κτημάτων μίας περιοχής καλό είναι οι παραγωγοί να παρακολουθούν την εμφάνιση της καρπόκαψας στα κτήματά τους, με σκοπό τη καλύτερη εκτίμηση της αναγκαιότητας του ψεκασμού.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ημέρες υπολειμματικής διάρκειας τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.


Συνδυασμός καλλιεργητικών μέτρων και χημικής καταπολέμησης όπου απαιτείται δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι επιμελημένοι με διαβροχή όλης της φυλλικής επιφάνειας και στα ψηλά τμήματα των δένδρων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr



Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου