

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/σεις Γεωργίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Β-Γ Φούσκωμα ματιού  
Πράσινη κορυφή

Δ Έξοδος φύλλων

Ε Πρώτα φύλλα

Ζ Εμφάνιση σταφυλιών

Η Ξεχώρισμα σταφυλιών

Πληροφορίες: Κ. ΛΙΛΗΣ-Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ  
Τηλ.: 2510/ 600421-2

Αριθ. Δελτίου : 03/13-04-2011

### ΑΜΠΕΛΙ

#### Ι. ΦΟΜΟΨΗ

Η ασθένεια προσβάλλει τους βλαστούς, τα φύλλα και τους βότρυς. Κυρίως όμως προσβάλλει την βάση της βέργας και τα πρώτα μεσογονάτια διαστήματα. Η προσβολή γίνεται την άνοιξη κατά την δημιουργία των νέων βλαστών. Οι κλιματολογικές συνθήκες αυτή την περίοδο είναι ιδανικές για την μόλυνση και την εξάπλωση της ασθένειας.

#### ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συνιστάται να γίνει άμεσα ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση της ασθένειας. Ο παραπάνω ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 7 -8 ημέρες.

#### Π.ΩΙΔΙΟ

Η μόλυνση και εξάπλωση της ασθένειας αρχίζει με το ξεκίνημα της βλάστησης και συνεχίζεται μέχρι και σε θερμοκρασίες 30-32°C, με ιδανικές θερμοκρασίες 20-25°C. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της ασθένειας έχει σαν επακόλουθο τη μείωση της βλάστησης, μείωση της παραγωγής και της ποιότητας των σταφυλιών.



Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ.: 2510/245684  
Τηλ.: 2510600421

Σωστή χρήση  
φυτοφαρμάκων

σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες  
που το ζητούν



### **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ**

Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός όταν οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 8-10 εκατοστών με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 8-10 ημέρες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου το πρόβλημα είναι έντονο κάθε χρόνο. Ανάλογα με την ένταση της ασθένειας, οι ψεκασμοί μπορεί να επαναλαμβάνονται ανά 10-15 ημέρες.

### **III. ΑΚΑΡΕΑ**

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και όταν παρατηρήσουν πληθυσμούς ακάρεων στα πρώτα φύλλα να πραγματοποιήσουν έναν ψεκασμό με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο ακαρεοκτόνο σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του ωιδίου.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή των ασθενειών αυτών στην αρχή της βλαστικής περιόδου, να γίνει καλό λούσιμο των πρέμων και
  2. Να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο  
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή