


ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/σεις Γεωργίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαίο ευδεμίδα



Προνύμφη ευδεμίδα



Βοτρύτης



Ωίδιο

Πληροφορίες: Κ. ΛΙΛΗΣ-Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 2510/ 600421-2

Αρ. Δελτίου 08/07-07-11

Ταχ. Δ/ση:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ.: 2510/245684

Fax: 2510600421

Σωστή χρήση

φυτοφαρμάκων

σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν

ΑΜΠΕΛΙ

Ι.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Η β' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας συνεχίζεται. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι από μέτριος έως πολύ υψηλός. Επισημαίνουμε ότι η καταπολέμηση του εντόμου αυτής της γενιάς είναι καθοριστική. Χρειάζεται επιμελημένη φυτοπροστασία των σταφυλιών.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **11 - 13 Ιουλίου** στις πρώιμες περιοχές.
- **14 - 15 Ιουλίου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και
- **16 - 17 Ιουλίου** στις όψιμες περιοχές.
- Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν για ψεκασμούς με τα κλασικά εντομοκτόνα-προνυμφοκτόνα. Όσοι παραγωγοί χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα ωοκτόνα, οι ψεκασμοί να γίνουν **3 ημέρες** νωρίτερα από τις παραπάνω ημερομηνίες.
- Επανάληψη μετά από **7 - 8 ημέρες** μόνο σε περιοχές όπου παρατηρήθηκαν υψηλές πτήσεις (Ν. Πέραμος, Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Μυρτόφυτο).

ΙΙ. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση του ωιδίου με τους ψεκασμούς για την ευδεμίδα.



III. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την εμφάνιση της ασθένειας σε πολλές περιοχές. Συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί σε αμπέλια και περιοχές όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο ή και όταν διαπιστωθούν οι πρώτες μικροεστίες περονοσπόρου.

IV. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας. Συνιστάται να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο – εγκεκριμένο βοτρυδιοκτόνο. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια υγρών περιοχών, πυκνοφυτεμένα, σκεπαστά και σε αμπέλια όπου το πρόβλημα εμφανίζεται κάθε χρόνο.

V. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε αμπέλια όπου έχει εντοπισθεί η ύπαρξη του ψευδόκοκκου. Χρειάζεται να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλή διαβροχή των πρέμνων με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών σύμφωνα με την λίστα των γεωργικών φαρμάκων που σας έχουν σταλεί με το υπ' αριθ. 07/17-06-11 Τεχνικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας

2. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο
Προϊστάμενος Δ/νσης

Αδαμίδου Ζωή