

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τους αμπελώνες τους και να επεμβαίνουν στη περίπτωση εμφάνισης προσβολών και όχι προληπτικά καθώς οι αυξημένοι πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια μπορεί να οφείλονται στην εμφάνιση ανθεκτικότητας από τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ψευδόκοκκος

Μόνο σε πρέμνα όπου οι προσβολές εμμένουν, να γίνει καταπολέμηση του εντόμου τοπικά επί του πρέμνου, ξεκινώντας χαμηλά από το έδαφος και περιλαμβάνοντας επίσης τα γειτονικά μόνο πρέμνα.

Θρίπας

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν πληθυσμούς θρίπα να κάνουν καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας. Σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.



Ωίδιο

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας στις όψιμες κυρίως ποικιλίες. Σταφύλια που βρίσκονται στην αρχή της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες ποικιλίες σουλτανίνας όπου έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα ωιδίου σε ράγες.

Βοτρύτης

Σε περιοχές όπου υπάρχει υγρασία και η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο να γίνει ένας προληπτικός ψεκασμός κατά το στάδιο της ωρίμανσης.

σημείωση :

- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
- Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

+ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις miliadou@minagric.gr, dsyropoulos@minagric.gr, sspyroglou@minagric.gr.

+ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

www.minagric.gr



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου