



Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ της ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684.

Fax: 2510 600430

E mail: dpvrgiotou@minagric.gr

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.

No 31/23-07-2021



ΑΜΠΕΛΙ (για Ν. Σερρών)

Όσον αφορά τον Ν. Καβάλας και τους άλλους νομούς της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας, θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο, νεότερα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων οπότε οι αμπελουργοί οφείλουν να αναμένουν.

Ευδεμίδα

Η πτήση της τρίτης γενεάς του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές του νομού Σερρών (με βάση τα στοιχεία που καταγράφουν οι φερομονικές παγίδες στις περιοχές Άμπελοι και Τριανταφυλλιά). Τονίζεται ότι στα σημεία όπου ενδεχομένως αναπτυχθούν προσβολές της ευδεμίδας, εκεί στις ράγες αναπτύσσονται δευτερογενώς προσβολές βοτρυτή και όξινης σήψης.

Τονίζεται, επίσης, ότι λόγω της χρονικής εγγύτητας με την ωρίμανση και συγκομιδή των σταφυλιών οφείλεται να αποδίδεται ακόμη υψηλότερη προσοχή στο χρονικό όριο ημερών τελευταίας εφαρμογής κάθε σκευάσματος πριν την συγκομιδή (phi) και έτσι συνιστάται να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας ή / και εντομοκτόνα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*). Συνιστάται, επίσης, ο ψεκασμός κατά της ευδεμίδας, αυτή την εποχή, να κατευθύνεται μόνο στην ζώνη των σταφυλιών και να λαμβάνεται μέριμνα για την καλή κάλυψη αυτών. Στα παραπάνω πλαίσια προτείνεται η διενέργεια ψεκασμού τις επόμενες δύο ημέρες με επανάληψη μετά από μία εβδομάδα ανάλογα και με το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα.

Βοτρυτής

Συνιστάται διενέργεια ψεκασμού μόνο όπου σημειωθεί προσβολή, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόσφατο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων, το οποίο εκδώσαμε.

Όξινη σήψη (Σακχαρομύκητες και βακτήρια)

Εμφανίζεται κατά την περίοδο ωρίμανσης των σταφυλιών. Παρατηρείται κυρίως σε αμπέλια που δεν έγινε σωστή αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών και κυρίως της ευδεμίδας καθώς και όποιου άλλου παράγοντα προκαλεί λύσεις (πληγές) στην επιφάνεια των ραγών. Η προσβολή της όξινης σήψης μεταδίδεται από την κοινή δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού). Συνιστάται μόνο σε περίπτωση εκδήλωσης της προσβολής και όχι προληπτικά να διενεργείται καθαρισμός των προσβεβλημένων ραγών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο εντομοκτόνο.

- Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.
http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx
- Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση, πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς ή ασθένειες και να ελέγχεται η συνδυαστικότητά τους.
- Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τις εξειδικευμένες οδηγίες που παρέχονται με την συνταγογράφηση κατά την διάθεση των σκευασμάτων.

- **Επαναλαμβάνουμε ότι οι δραστικές ουσίες chlorpyrifos & chlorpyrifos methyl δεν είναι πλέον εγκεκριμένες για χρήση ως φ.π. σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όλες οι εγκρίσεις φ.π. που αφορούσαν τις ανωτέρω δραστικές ουσίες έχουν ανακληθεί, ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη ήταν η 16 Απριλίου 2020. Επίσης, πλέον, όλα τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των chlorpyrifos & chlorpyrifos methyl κυμαίνονται στο όριο του αναλυτικού προσδιορισμού.**

✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr,

✚ Το παρόν δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων **www.minagric.gr**  ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

✚ Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου