



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς  
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235  
 Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684  
 Fax: 2510 600430  
 E mail : [dpyrgiotou@minagric.gr](mailto:dpyrgiotou@minagric.gr)

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 05/03-03-2022

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.



## ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Η αμυγδαλιά έχει εισέλθει, ήδη, στο στάδιο της ανθοφορίας. Το στάδιο της ανθοφορίας δεν εξελίσσεται ταυτόχρονα και ομοιόμορφα για όλες τις ποικιλίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κατά το στάδιο αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση της καρπώδεσης είναι



αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί με σκοπό τον έλεγχο της μονιλίας, η οποία είναι μία ασθένεια που ενδημεί σε όλες τους αμυγδαλεώνες της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας. Τονίζεται ότι τα συμπτώματα της προσβολής της μονιλίας πολλές φορές και ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες εμφανίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης με ψεκασμούς. Όπως έχουμε τονίσει οι αμυγδαλοκαλλιεργητές πρέπει να προβούν σε ψεκασμούς, με κατάλληλο μυκητοκτόνο, χρησιμοποιώντας επαρκή ποσότητα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, ώστε να πετύχουν να διαβραχούν όλα τα άνθη της κόμης των δένδρων. Ο ψεκασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μυκητοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί, έως οι αμυγδαλιές να ολοκληρώσουν τα στάδια όπου είναι επικίνδυνο να λάβει χώρα η προσβολή τους από τον μύκητα. Καθοριστικές για τον αριθμό των επαναλήψεων και τις ημέρες μεταξύ των ψεκασμών είναι οι οδηγίες που θα παράσχει ο γεωπόνος που θα συνταγογραφήσει την χρήση των μυκητοκτόνων, ο οποίος είναι γνώστης των τοπικών συνθηκών που ισχύουν εξειδικευμένα σε κάθε περιοχή και σε κάθε αμυγδαλεώνα.

**Εικόνα2. Μονίλια ([ellinikigeorgia.gr](http://ellinikigeorgia.gr))**

Επαναλαμβάνεται ότι οι ποικιλίες της αμυγδαλιάς διαφοροποιούνται ως προς τον χρόνο άνθησης και ως εκ τούτου διαφοροποιούνται οι ψεκασμοί, ο αριθμός των επαναλήψεων και οι ημέρες μεταξύ των ψεκασμών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής αποτελεσματικότητας. Τονίζεται ότι οι ψεκασμοί κατά της μονίλιας δεν επηρεάζονται σημαντικά από την εξέλιξη της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Αυτονόητα, όμως, τροποποιούνται μόνο από ενδεχόμενες βροχές, υλοποιούμενοι μετά την λήξη των βροχοπτώσεων.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, την συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή, σύμφωνα με την συνταγογράφηση των σκευασμάτων.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>



Εικόνα3. Μονίλια (neapaseges.gr)

✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [dpyrgiotou@minagric.gr](mailto:dpyrgiotou@minagric.gr), [thmarkopoulos@minagric.gr](mailto:thmarkopoulos@minagric.gr), [thgeorgiadou@minagric.gr](mailto:thgeorgiadou@minagric.gr)

✚ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)



✚ Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου