



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Σ. Τσόλη

35/28-7-11

ΑΜΠΕΛΙ

1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Η 3^η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις περιοχές. Επακόλουθο των προσβολών, κυρίως αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες:

Όπου κρίνεται απαραίτητο, να πραγματοποιηθεί επέμβαση από 4 ως 8 Αυγούστου με:

Φυτ/κά προϊόντα:

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, { Πυρεθρίνς -2 μέρες}, { Άλφα συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Λάμδα Συναλοθρίν -7 μέρες}, { Ιντοξακάρμπ -10 μέρες}, { Ετοφενπρόξ, Μπέτα Συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Συπερμεθρίν -14 μέρες}, { Χλωρπυριφός -20 μέρες}, { Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση ενδείκνυται. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη.

2. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες:

Σε αμπέλια που συνήθως εμφανίζονται προσβολές από βοτρυτή, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα.

Φυτ/κά προϊόντα:

**{ Φενχεξαμίντ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτραπέζιες},
{ Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ, Σιπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ- 21 μέρες},
{ Φλουαζινάμ μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 21 μέρες},
{ Μποσκαλίντ, -28 μέρες}, { Πυριμεθανίλ-35 μέρες},
{ Θιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ μόνο σε οινοποιήσιμα - 35 μέρες},
{ Φολπέτ - 40 μέρες}, { Φολπέτ+οξυχλωριούχος χαλκός μόνο σε οινοποιήσιμα αυτή την εποχή - 42 μέρες}.**



3.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Κίνδυνος προσβολών για τις ρόγες υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Φυτ/κά

προϊόντα:

{Σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* -0 μέρες }, {Θείο -7 μέρες}, {Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός - 28 μέρες}, {Μπουπιριμέιτ -14 μέρες}, {Μεπτυλντινοκάπ, Μυκλομπουτανίλ, Ντινοκάπ+Μυκλομπουτανίλ, Τεμπουκοναζόλ -21μέρες}, {Μετραφενόν, Προκουιναζίντ, Συπροκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν -28 μέρες}, {Κυνοξιφέν -30 μέρες για οιν/μα & 21 μέρες για επιτραπέζια }, {Κρεσοξίμ μεθύλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Πενκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ -35 μέρες}, {Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, Αζοξυστρομπίν + Φολπέτ - μόνο σε οινοποιήσιμα - 42 μέρες}.

4.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν σοβαρές προσβολές. Να εντείνετε τους επιτόπιους ελέγχους.

Οδηγίες:

Στους αμπελώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση με την λήψη του δελτίου χρησιμοποιώντας σκεύασμα με προστατευτική και θεραπευτική δράση.(Βλέπε προηγούμενο δελτίο).

5.ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ – ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ

Οδηγίες:

Βλέπε Δελτίο 33/14-7-11.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- **Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.**
- Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους δημιουργίας υπολειμμάτων άνω των επιτρεπόμενων ορίων στους καρπούς. Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- **Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ