



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου - Ν. Λογοθέτης

8/15-03-12

1. ΑΧΛΑΔΙΑ

Βλαστικά στάδια

Γ

Γ3

Δ

Δ3

Ε

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα, άνθη και καρπούς, όπου σχηματίζονται χαρακτηριστικές σκοτεινόχρωμες ελαιοκαστανές κηλίδες. Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης αρχίζουν με την εμφάνισή της **(βλαστικό στάδιο Γ3-Δ /πράσινη κορυφή)** και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. **Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.**

Διαπιστώσεις: Στις πεδινές περιοχές η ποικιλία «Κρυστάλλι» βρίσκεται στο **στάδιο Β-Γ**, και στις ορεινές περιοχές η ποικιλία «Κρυστάλλι» στο **στάδιο Α-Β**.

Οδηγίες: **Η περσινή χρονιά, ήταν χρονιά προσβολών από φουζικλάδιο. Λόγω αυξημένου μολύσματος και ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, οι φετινές επεμβάσεις να γίνονται στην ώρα τους και να είναι επιμελημένες. Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες αχλαδιάς στο ευαίσθητο στάδιο Γ3 - Δ με ένα εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.**



2. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

- Οδηγίες:**
- 1. Ψεκασμός στο ίδιο στάδιο (Γ3-Δ) με χαλκούχο σκεύασμα.**
 - 2. Ο συνεχής έλεγχος των δένδροκομείων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών είναι ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ. ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.**

3. ΨΥΛΛΑ

- Οδηγίες:**
1. Στις πρώιμες περιοχές να μην γίνει καμία επέμβαση. Θα σας ενημερώσουμε σε επόμενο δελτίο.
 2. Στις ορεινές περιοχές πριν το **βλαστικό στάδιο Γ** – να γίνει επέμβαση χρησιμοποιώντας θερινό πολτό σε συνδυασμό με πυρεθρίνες, με σκοπό και τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.
Η επέμβαση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σε μέρα ηλιόλουστη και ζεστή, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα και εφ' όσον η μέγιστη θερμοκρασία για 2-3 ημέρες ξεπερνά τους 10 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ