



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

14/10-4-12

Α. ΑΧΛΑΔΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις : Σε όλες τις περιοχές οι αχλαδιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο. Οι χθεσινές καιρικές συνθήκες δημιούργησαν συνθήκες ελαφριάς ως μέτριας μόλυνσης σε όλες τις περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων 23 Απρίλη στις πρώιμες περιοχές και 26 Απρίλη στις όψιμες.

Οδηγίες: Επέμβαση στις αχλαδιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Φυτοπρ/κά προϊόντα: **Α. Προστατευτική δράση:** Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανέμπ, Μανκοζέμπ (όχι σε Κρυστάλι και Κόσσια), Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση.

Β. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:
Θειοφανεΐτ-μεθύλ {1 επέμβαση ανά καλλιεργητική περίοδο},
Μικλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλостρομπίν, Ντιθιανόν+
Πυρακλостρομπίν, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροντινίλ,
Τριφλοξιστρομπίν.

2.ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Διαπιστώσεις: Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το βακτήριο.

Οδηγίες: ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ συνεχείς επισκέψεις στα δένδροκομεία για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προσβολών. Τα προσβεβλημένα μέρη να αφαιρούνται άμεσα, με αρκετό μέρος υγιούς ιστού.

>

Β. ΜΗΛΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Διαπιστώσεις: Σε όλες τις περιοχές οι μηλιές βρίσκονται σε βλαστικά στάδια ευαίσθητα στις προσβολές από φουζικλάδιο.

Οι χθεσινές καιρικές συνθήκες, δημιούργησαν συνθήκες μέτριας μόλυνσης σε όλες τις περιοχές. Πιθανή εμφάνιση κηλίδων στις 26 Απρίλη .

Οδηγίες:

Επέμβαση στις μηλιές όλων των περιοχών χρησιμοποιώντας σκεύασμα και με θεραπευτική δράση.

Φυτ/κά προϊόντα:

A. Προστατευτική δράση: Ζιράμ, Θιράμ, Θείον, Κάπταν, Μανέμπ, Μανκοζέμπ , Ντιθιανόν(ειδικά για το φουζικλάδιο έχει και θεραπευτική δράση), Ντοντίν-έχει και θεραπευτική δράση εάν εφαρμοστεί 30-36 ώρες μετά τη μόλυνση.

B. Προστατευτική και θεραπευτική δράση:

Θειοφανείτ-μεθύλ, Κρεσόξιμ-μεθύλ, Μικλομπουτανίλ, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιθιανόν+ Πυρακλοστρομπίν, Ντιφenoκοναζόλ, Πυριμεθανίλ, Πυριμεθανίλ+Φλουκουϊνκοναζόλ, Συπροκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν, Φενμπουκοναζόλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ.

Γ.ΚΕΡΑΣΙΑ – ΒΥΣΣΙΝΙΑ

1. ΜΟΝΙΛΙΑ

Οδηγίες:

**Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου.
Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ασθένεια.**

Φυτ/κά προϊόντα:

Θιράμ, Κάπταν, Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1. Ευχαριστούμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ήρας που μας δίνει την δυνατότητα να παίρνουμε τα στοιχεία των μετεωρολογικών του σταθμών.**
- 2. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
- 3. Σε περιπτώσεις που εντοπίζετε ύποπτα συμπτώματα προσβολής από βακτηριακό κάψιμο, παρακαλούμε να μας ενημερώνετε άμεσα.**
- 4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)**

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ