



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

### Πολλές ευχές για την καινούρια χρονιά

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου – Ν. Λογοθέτης

2 / 9 -1-12

#### ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

##### 1. ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Είναι πολύ σημαντική ασθένεια των παραπάνω πυρηνοκάρπων και η καταπολέμηση της, είναι μόνο προληπτική.

##### Διαπιστώσεις

##### Οδηγίες:

Την περασμένη χρονιά υπήρχαν σημαντικές προσβολές σε αρκετούς οπωρώνες ροδακινιάς.

Στους οπωρώνες που δεν έγινε επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων, να γίνει άμεσος και επιμελημένος ψεκασμός.

##### Φυτοπ/κά προϊόντα :

Α.Πριν τη διόγκωση των οφθαλμών: Βορδιγάλειος πολτός, Οξυχλωριούχος χαλκός, Υδροξείδιο του χαλκού.

Ο ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα βοηθά στην καταπολέμηση και άλλων ασθενειών (μονίλια, κορύνεο ). Να γίνει δέκα τουλάχιστον μέρες μετά το κλάδεμα, για να αποφευχθούν τοξικότητες σε περίπτωση παγετού.

Β. Μετά την διόγκωση των οφθαλμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:  
Ζιράμ, Θιράμ, Κάπταν.

##### 2. ΑΣΠΡΗ ΨΩΡΑ

##### Οδηγίες-

##### φυτοπ/κά προϊόντα :

Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές μπορεί να γίνει επέμβαση με χειμερινό ή θερινό πολτό. Να λούζεται καλά ο κορμός των δένδρων.

Η εφαρμογή χειμερινού πολτού να γίνεται οπωσδήποτε στο λήθαργο, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 4° C και δεν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Θερινός πολτός να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού.

Η επέμβαση αυτή βοηθά στην καταπολέμηση και άλλων εντόμων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ