



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

— Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
— Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

47/22-8-17

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις: Σε αμπελώνες όψιμων περιοχών (κυρίως στην Π.Ε Αρκαδίας) υπάρχουν σποραδικές προσβολές. Η χθεσινή βροχόπτωση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Οδηγίες: ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε όλους τους αμπελώνες. Όπου υπάρχουν συμπτώματα, να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με θεραπευτική δράση. Στους υπόλοιπους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προληπτική δράση.

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Στους αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές που έβρεξε να γίνει επέμβαση χρησιμοποιώντας σκεύασμα με προληπτική δράση. Στους υπόλοιπους αμπελώνες να ενταθούν οι έλεγχοι για το πενήντημερο που ακολουθεί, με μεγάλη προσοχή σε περιοχές με υγρασίες, ιστορικό προσβολών και ευαίσθητες ποικιλίες.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Προληπτική, προστατευτική δράση: { Αζοξυστρομπίν, Αμετοκτραντίν, Αμετοκτραντίν+Ζοξαμίντ, Θείον + Χαλκός, Μαντιπροπαμίντ*, Μαντιπροπαμίντ+ Ζοξαμίντ, Χαλκός -21 μέρες }, { Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+ Μανκοζέμπ, Χαλκός+Ζοξαμίντ -28 μέρες }, { Αμετοκτραντίν+Μετιράμ -35 μέρες }, { Μετιράμ -56 μέρες }.

Η δ.ο Αμετοκτραντίν, έχει και θεραπευτική δράση αν εφαρμοστεί στην διάρκεια επώασης της ασθένειας.

Προληπτική, προστατευτική και θεραπευτική δράση:

{ Φοσετύλ-αλ, Potassium Phosphonates -14 μέρες }, { Χαλκός+Ντιμεθομόρφ, Συμοξανίλ+ Χαλκός, Χαλκός+Ιπροβαλικάρμπ -21 μέρες }, { Ιπροβαλικάρμπ+ Μανκοζέμπ, Μπενθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ+Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ-μ, Ντιμεθομόρφ, Ντιμεθομόρφ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ, Συμοξανίλ+Ζοξαμίντ, Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Συμοξανίλ+Φοσετύλ +Φολπέτ-μόνο σε οиноποιήσιμα, Φεναμιντόν+Φοσετύλ, Φοσετύλ+Μανκοζέμπ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ -28 μέρες }, { Ντιμεθομόρφ+Πυρακλροστρομπίν, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ, Αμετοκτραντίν+Ντιμεθομόρφ -35 μέρες }, { Συμοξανίλ+ Φοσετύλ+Χαλκός -40 μέρες }, { Μπεναλαξύλ-μ+Μανκοζέμπ -42 μέρες }, { Φολπέτ, Φολπέτ+Ντιμεθομόρφ, Φολπέτ+Φοσετύλ, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ, -42 μέρες μόνο σε οиноποιήσιμα }, { Ιπροβαλικάρμπ+ Προπινέμπ, Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ, -56 μέρες } ►

2.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες:

Φυτ/κά προϊόντα:

Απαιτούνται συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι ιδιαίτερα σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία.

Aureobasidium pulluans strain 14940 & 14941, *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* d747, {*Bacillus subtilis* strain-3 μέρες}, {*Eugenol+Geraniol+Thymol* -7 μέρες για επιτραπέζια & 3 μέρες για οиноποιήσιμα }, {*potassium hydrogen carbonate* -1 μέρα}, {Θιράμ -μόνο σε οиноποιήσιμα 35 μέρες}, {Ιπροντιόν, Μεπανιπυρίμ -21 μέρες}, {Μποσκαλίντ-28 μέρες}, {Πυριμεθανίλ-35 μέρες}, {Συπροντινίλ -7 μέρες για επιτραπέζια & 21 μέρες για οиноποιήσιμα}, {Συπροντινίλ+ Τεμπουκοναζόλ-28 μέρες για επιτραπέζια & 21 μέρες για οиноποιήσιμα}, {Συπροντινίλ+ Φλουντιοξονίλ-21 μέρες μόνο για οиноποιήσιμα}, {Φενχεξαμίντ, Φενπυραζαμίν -7 μέρες για επιτραπέζια & 14 μέρες για οиноποιήσιμα}

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.
- Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην ετικέτα, μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ