



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

42 /4-9-18

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις: Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:**

α) Πρώιμες περιοχές: Από 5 έως 9 Σεπτέμβρη.

β) Όψιμες περιοχές: Από 10 ως 14 Σεπτέμβρη.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινός πολτός (σε θερμοκρασίες πάνω από 320C μπορεί να εμφανιστούν φυτοτοξικότητες), Αζαντιραχτίν Α, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Πυριπροξифέν, Σπιροτετραμάτ, Σουλφοξαφλór, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.
Επειδή αυτήν την εποχή συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια των κοκκοειδών, περισσότερο αποτελεσματικός είναι ο συνδυασμός θερινού πολτού με ένα από τα υπόλοιπα φ.π. που μπορούν να συνδυαστούν με αυτόν. Τα δέντρα που θα ψεκάστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2.Chrysomphalus sp

Διαπιστώσεις: Υπάρχουν σοβαρές προσβολές στα εσπεριδοειδή της ΠΕ Κορινθίας. Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 5 έως 9 Σεπτέμβρη**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινός πολτός.

3.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις: Οι εκκολάψεις είναι σε εξέλιξη. Οι υπάρχοντες πληθυσμοί βρίσκονται κυρίως κάτω από τον κάλυκα, στα σημεία που ενώνονται καρποί και στο εσωτερικό της κόμης.

Οδηγίες: **Στους οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση στις από 5 ως 9 Σεπτέμβρη άσχετα με την πρωιμότητα της περιοχής. Ο ψεκάσμός πρέπει να είναι επιμελημένος, με έμφαση στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θερινός πολτός, Ασεταμιπρίντ, Σπιροτετραμάτ, Σουλφοξαφλór, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.



4. ΙΣΕΡΥΑ 'Η ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ – ΚΟΚΚΟΣ (*Coccus hesperidum*)

- Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να προηγηθεί έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της Ισέρυας.
Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί και για τους δυο εχθρούς στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.
- Φυτ/κά προϊόντα:** **Κόκκος:** Θερινός πολτός, Σπιροτετραμάτ.
Ισέρυα: Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ.

5.ΘΡΙΠΕΣ

- Οδηγίες:** Συνδυασμένη καταπολέμηση με την Κόκκινη ψώρα σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές.
- Φυτ/κά προϊόντα:** Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Αζαντιραχτίν Α, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός.

6.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

- Διαπιστώσεις:** Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για το έντομο και η πίεση των πληθυσμών μεγάλη.
- Οδηγίες:**
1. Όσοι επιλέξουν τις παγίδες ως μέσο καταπολέμησης του εντόμου, να κάνουν άμεσα την ανάρτηση στις πρώιμες ποικιλίες των εσπεριδοειδών και στην πυκνότητα που προβλέπει ο κατασκευαστής.
 2. Όσοι επιλέξουν ψεκασμούς κάλυψης, αυτοί να ξεκινήσουν στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
- Σε ασυγκόμιστες όψιμες ποικιλίες πορτοκαλιών και μανταρινιών, να συνεχιστεί η προστασία.
- Φυτ/κά προϊόντα:** Βιολογικά σκευάσματα με βάση τα σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana strain atcc 74040*, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Λάμντα σουαλοθρίν, Μαλαθίον, Φοσμέτ.

7.ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ-ΑΚΑΡΕΑ(*Aculus pelecassi*, *Aceria Sheldoni*)

- Οδηγίες:** Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες. Επέμβαση για τους τετρανύχους χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων.
Για τα ακάρεα να γίνει καταπολέμηση όπου διαπιστώνονται προσβολές.
- Φυτ/κά προϊόντα:** **Τετράνυχος:** Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσούλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπιράντ, Θερινά λάδια, Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων.
Aculus pelecassi: Θερινά λάδια.
Aceria Sheldoni: Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν.

8. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ- ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

- Διαπιστώσεις:** Στα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια να συνεχιστεί η προστασία από τον φυλλοκνίστη.
- Οδηγίες:** Για τον Εριώδη Αλευρώδη δεν απαιτείται επέμβαση. **Σε περιπτώσεις που έχετε προσβολή, μπορείτε να στέλνετε δείγματα στην υπηρεσία μας για τον έλεγχο του παρασιτισμού και παροχή οδηγιών.**
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤ. ΤΣΟΛΗ