



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629



– Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
– Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

4 / 18-2-19

ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ)

1. Βακτηριακό κάψιμο

Οδηγίες: Για την αντιμετώπιση του βακτηρίου συστήνονται τα παρακάτω μέτρα:

- Ξερίζωμα και κάψιμο όλων των έντονα προσβεβλημένων δένδρων (προσβολή του κορμού ή των βραχιόνων σε απόσταση μικρότερη από 50 εκατ. από τον κορμό).
- Αυστηρό κλάδεμα των προσβεβλημένων δένδρων με αφαίρεση όλων των προσβεβλημένων τμημάτων μαζί με αρκετό τμήμα υγιούς ιστού 20-30 εκ. για την απομάκρυνση του μολύσματος. Τα προσβεβλημένα τμήματα να καίγονται, γιατί διαφορετικά θα έχουμε διασπορά του βακτηρίου.
- Κατά το κλάδεμα ή καθαρισμό των δένδρων, τα εργαλεία να απολυμαίνονται συνεχώς με εμβάπτιση σε καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα φορμόλης 5% ή διάλυμα χλωρίνης.
- Τα προσβεβλημένα δένδρα να κλαδεύονται χωριστά.
- Αποφυγή λήψης εμβολίων από μολυσμένους οπωρώνες.
- Επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή *Φοσετύλ-Αλ*. Στους οπωρώνες μηλοειδών που πέρσι υπήρχαν προσβολές, η ανωτέρω επέμβαση είναι επιβεβλημένη.

2. Φουζικλάδιο – Εξέλκωση

- Οδηγίες:
- Κλάδεμα και καταστροφή με φωτιά όλων των προσβεβλημένων κλάδων. Η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό (είναι καλό για όλους τους μύκητες που προσβάλλουν τα μηλοειδή).
 - Κατάλληλη διαμόρφωση της κόμης με το κλάδεμα ώστε να διευκολύνεται ο καλός αερισμός και να μειώνεται η υγρασία.
 - Διατήρηση των δένδρων σε καλή θρεπτική κατάσταση.
 - Ισορροπημένη λίπανση ιδιαίτερα σε άζωτο και κάλιο. ►

3. Κόκκινος Τετρανύχος

Οδηγίες: Η επέμβαση είναι απαραίτητη σε δένδρα που υπάρχουν περισσότερα από 1000 χειμερινά αυγά τετρανύχου ανά μέτρο καρποφόρου ξύλου. Ο ψεκασμός για να είναι αποτελεσματικός, απαιτείται καλή διαβροχή των δένδρων, επειδή τα αυγά του κόκκινου τετρανύχου εναποτίθενται σε προφυλαγμένες θέσεις στα κλαδιά των δένδρων, προς τη νότια κυρίως πλευρά.

**Φυτ/τικά
προϊόντα:**

Κλοφεντεζίν (δρα στα χειμερινά αυγά), παραφινικό λάδι ή συνδυασμός των δυο.

Στις πρώιμες περιοχές αυτήν την εποχή να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός επειδή έχει ξεκινήσει η εκκόλαψη των χειμερινών αυγών.

Με τα παραφινέλαια αντιμετωπίζονται, οι διαχειμάζουσες μορφές κοκκοειδών, αφίδων, τα αυγά των τετρανύχων και τα διαχειμάζοντα έντομα. Απαιτείται καλό λούσιμο της κόμης και της βάσης του κορμού.

4. Ψύλλα Αχλαδιάς

Οδηγίες: Σε οπωρώνες που υπήρχαν προσβολές από το έντομο την περασμένη χρονιά, να γίνει ψεκασμός ως εξής:

1. **Στις πρώιμες περιοχές** επειδή υπάρχουν εναποθέσεις αυγών να χρησιμοποιηθεί άμεσα συνδυασμός παραφινέλαιου με ένα ακμαιοκτόνο για τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.

**Φυτ/τικά
προϊόντα:**

2. **Στις όψιμες περιοχές** μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σκεύασμα με δράση στα ακμαία ή χρήση *καολίνη* που αποτρέπει την εναπόθεση των αυγών.

ή

Λίγο αργότερα - και οπωσδήποτε πριν το φούσκωμα των ματιών βλαστικό στάδιο Γ - χρησιμοποιώντας παραφινέλαια σε συνδυασμό με ακμαιοκτόνο.

Η επέμβαση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέρα ηλιόλουστη, χωρίς άνεμο και με την θερμοκρασία να ξεπερνά τους 10 °C, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο www.minagric.gr).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ