

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ  
Πανεπιστημίου 334  
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629  
Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)

ΑΧΑΪΑΣ  
ΗΛΕΙΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΙΘΑΚΗΣ

Πληροφορίες: ΠΕΤΤΑΣ Ν.

ΜΗΛ: Ν° 5 / 23-05-2012

## ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ Ημιορεινές – Ορεινές περιοχές

### ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ:

#### Διαπιστώσεις:

Εξαιτίας του άσπατου καιρού η α' πτῆση του εντόμου ξεκίνησε ουσιαστικά στο τέλος του β' 10-ημέρου του Μαΐου (20/5) και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι μέτριες.

#### Συστάσεις:

Να γίνει καταπολέμηση στις παρακάτω ημερομηνίες:

- 28 Μαΐου – 1 Ιουνίου με ρυθμιστές ανάπτυξης ή βιολογικά εντομοκτόνα ή
- 2 – 4 Ιουνίου με λοιπά εντομοκτόνα.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην καταστολή της ψύλλας και των ακάρεων.

Η εφαρμογή αποκλειστικά λαδιού (χωρίς άλλο εντομοκτόνο) συστήνεται μόνο για τις περιπτώσεις χαμηλών πληθυσμών ή/και ιστορικού χωρίς ζημιές και η έναρξη των εφαρμογών πρέπει να γίνει νωρίτερα (με την παραλαβή δελτίου)

Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά (θείο, καπτάν) και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η επανάληψη του ψεκασμού (σε 7-14 ημέρες) εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της προσβολής και το ιστορικό του μηλεώνα. Σε περίπτωση επανάληψης του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο με διαφορετικό αριθμό ομάδας ανθεκτικότητας.

Για να προστατευθούν τα ωφέλιμα, τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο στον πρώτο ψεκασμό.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες ή κοκκοειδή να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με εντομοκτόνο που είναι δραστικό ταυτόχρονα στους δευτερεύοντες εχθρούς ή με μίγμα κατάλληλων εντομοκτόνων.

**Φ/προστατευτικά:** Στις λίστες φυτοπροστατευτικών

### ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ:

#### Συστάσεις:

Ψεκασμός στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται κινητές μορφές σε 18 από 20 τυχαία συλλεχθέντα φύλλα από διαφορετικά δένδρα, ή σε 25 από 30 φύλλα ή σε 30 από 40 φύλλα ή σε 36 από 50 φύλλα ή σε 42 από 60 φύλλα. Σε αντίθετη περίπτωση επανα-δειγματοληψία σε 14 ημέρες.

**Φ/προστατευτικά:** Στις λίστες φυτοπροστατευτικών

### ΨΥΛΛΑ:

#### Συστάσεις:

Στις αχλαδιές που διαπιστώνονται μελιτώματα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.

**Φ/προστατευτικά:** Στις λίστες φυτοπροστατευτικών

## **ΑΧΛΑΔΙΑ – Πεδινές περιοχές**

### **ΨΥΛΛΑ:**

- Διαπιστώσεις:** Στη βλάστηση παρατηρούνται λίγα μελιτώματα, λίγα αυγά και προνύμφες τελευταίου σταδίου της της 2ης γενεάς του εντόμου.
- Συστάσεις:** Στις αχλαδιές που διαπιστώνονται μελιτώματα να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.
- Φ/προστατευτικά:** Στις λίστες φυτοπροστατευτικών

### **ΜΗΛΙΑ – ΑΧΛΑΔΙΑ - Όλες οι περιοχές ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ – ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ:**

- Διαπιστώσεις:** Στα δένδροκομεία που δεν έχει μέχρι σήμερα εμφανιστεί Φουζικλάδι να σταματήσει η προστασία.
- Συστάσεις:** Να συνεχιστούν οι επεμβάσεις εκεί που διαπιστώνονται κηλίδες, γιατί με τις δροσιές και ενδεχόμενες βροχοπτώσεις υπάρχει κίνδυνος δευτερογενών προσβολών.  
Επίσης να σταματήσει η προστασία για το Βακτηριακό κάψιμο.
- Φ/προστατευτικά:** Στις λίστες φυτοπροστατευτικών

## **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ  
ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων**