



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Πανεπιστημίου 334  
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ  
Τηλ.: 2610.224.629  
Fax: 2610.623.238  
Email: [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)  
Πληροφορίες: Πέττας Ν.

**ΔΕΛΤΙΟ  
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ  
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ

**ΠΑΤΑΤΑ: Νο 4 / 07-04-2014**

**ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:**

**Διαπιστώσεις:** Σε όλες τις περιοχές, όλες οι πατατοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από τον περονόσπορο. Μέχρι σήμερα έχουν εμφανιστεί αραιές κηλίδες στις πρώιμες πατατοκαλλιέργειες.

Η άνοδος των θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία των τελευταίων ημερών δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για επιδημίες περονόσπορου (βλ. πίνακα). Επιπρόσθετα, σε όλες τις περιοχές προβλέπεται να παραταθεί ο άστατος και συννεφιασμένος καιρός και πιθανόν να ευνοηθεί περαιτέρω η ασθένεια.

Για παράδειγμα, στον Κόροιβο Ηλείας, η μεγάλη βροχόπτωση της 06/04, ύψους 30 χιλ., σε συνδυασμό με την μεγάλη διάρκεια διύγρανσης του φυλλώματος (17 ώρες) και τη θερμοκρασία στη διάρκεια της διύγρανσης (13 °C), δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από την ασθένεια στην περιοχή.

Μετ. Σταθμός Κοροίβου-Γαστούνης Ηλείας (Μέσοι όροι)

10-ήμερο	Ελάχ Θερμ (°C)	Μέγ Θερμ (°C)	Μέση Θερμ (°C)	Βροχή (χιλ)	Μέση ΣχΥγρ (%)	Διάρκεια διύγρανσης (ώρες)
1ο Ιανουαρίου	5.83	16.49	10.12	33.8	95.16	19.4
2ο Ιανουαρίου	9.37	17.35	12.75	28.4	94.88	18.8
3ο Ιανουαρίου	7.49	14.86	10.93	60	90.77	15.64
1ο Φεβρουαρίου	7.51	14.71	10.69	0.8	96.05	19.9
2ο Φεβρουαρίου	6.04	18.1	11.54	0	90.61	16.6
3ο Φεβρουαρίου	7.21	15.74	11.16	0	95.65	20.25
1ο Μαρτίου	7.12	15.52	10.96	0	91.72	17.7
2ο Μαρτίου	5.72	19.43	11.95	2.2	87.15	15.2
3ο Μαρτίου	7.87	19.05	13.37	13.6	88.98	14.64

**Συστάσεις:** Επειδή ο καιρός προβλέπεται άστατος, συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία με ιδιαίτερη προσοχή.

**Φάρμακα:** Από την λίστα των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών του έτους 2014 (έκδοση 18/02/2014). Από τα μυκητοκτόνα που αναφέρονται, χρησιμοποιείστε τις μεγαλύτερες συνιστώμενες δόσεις και το μικρότερο μεσοδιάστημα μεταξύ των ψεκασμών. Σημειώνεται, ότι ακόμα και τα προστατευτικά που έχουν θεραπευτική δράση πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά.

Όλα τα δελτία είναι αναρτημένα στον κόμβο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ**

**ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων**

Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο [pkpfpatr@otenet.gr](mailto:pkpfpatr@otenet.gr)