



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
pkrfpet1@otenet.gr

**№ 17 / 10 Ιουνίου 2011**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

## **ΑΜΠΕΛΙ (Ισχύει για τους Νομούς Θεσ/νίκης-Χαλκιδικής)**

### **1. ΕΥΔΕΜΙΔΑ :**

- α. Ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου.
- β. Οι καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία - σχετική υγρασία) ευνοούν τη δραστηριότητά του.
- γ. Οι διάφορες ποικιλίες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο J (καρπόδεση) που είναι ευαίσθητο για προσβολές.

**ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ :** Να γίνει ψεκασμός :

- α. **Μέχρι 16 Ιουνίου** με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ ή
  - β. **Μέχρι 20 Ιουνίου** με ρυθμιστές (ΦΛΟΥΦΕΝΟΞΟΥΡΟΝ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) ή
  - γ. **20 - 22 Ιουνίου** με κλασσικά εντομοκτόνα όπως : ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ -ΜΕΘΥΛ, Βάκιλλος Θουριγκίας (Διάφορα σκευάσματα με την προσθήκη 3 % ζάχαρης) κ.α.
- Συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού μετά 12 -18 μέρες, ανάλογα με το σκεύασμα.
  - Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.
  - Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος).

**ΣΗΜ.1:** Με την επέμβαση κατά της Ευδεμίδας με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ και ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ -ΜΕΘΥΛ καταπολεμείται ταυτόχρονα και ο Ψευδόκοκκος στα κτήματα που έχουν προσβολές.

**ΣΗΜ.2:** Για την εκτίμηση αναγκαιότητας ψεκασμού σύμφωνα με τα Ορια Ανεκτής Πυκνότητας (Ο.Α.Π.) μπορείτε να ενημερωθείτε από το Δελτίο μας στο [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr).

**2. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ :** Σημειώθηκαν σποραδικές προσβολές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών στο στάδιο J (καρπόδεση) μόνο σε αμπέλια που παρατηρήθηκαν κηλίδες ή επάνθιση περonosπόρου στα φύλλα και εφόσον επικρατεί βροχερός καιρός.

**Κατάλληλα αγροχημικά:**

#### **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ**

ΧΑΛΚΟΥΧΑ  
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ  
ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΒΙΝ

και άλλα

#### **ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ**

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ  
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΧΑΛΚΟΣ  
ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ  
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ  
ΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΧΑΛΚΟΣ  
ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ  
και άλλα

ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ+ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ  
ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ  
ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ  
ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ  
ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ  
ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ+ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ  
ΦΟΛΠΕΤ  
ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ

**3.ΩΙΔΙΟ:** Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών στο στάδιο J (καρπόδεση).

**Κατάλληλα αγροχημικά:** ΘΕΙΑΦΙ, Σκεύασμα AQ10 (ειδικά για βιολογικές καλλιέργειες), ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΝΤΙΝΟΚΑΠ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ, ΚΡΕΣΟΞΥΜ-ΜΕΘΥΛ, ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ+ΚΡΕΣΟΞΥΜ ΜΕΘΥΛ, ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, ΜΕΠΤΙΛ-ΝΤΙΝΟΚΑΠ, και άλλα.



### **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ**

**ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

**α. ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ.** (Προσβάλλει και την ακτινιδιά)

Αναμένεται η εμφάνιση των νεαρών προνυμφών της β' γενεάς. Μόνο σε κτήματα που απέτυχαν ή δεν έγιναν εφαρμογές κατά τους μήνες Απρίλιο - Μάιο και παρουσιάζουν προσβολές συνιστάται καταπολέμηση.

**A.** Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός: α. 21 - 23 Ιουνίου στα πεδινά

β. 28 - 30 Ιουνίου στα όψιμα - ορεινά

και επανάληψη μετά από 12 – 14 ημέρες.

**B.** Σε ελαφρές προσβολές να γίνει μόνο **μία** εφαρμογή: α. 28-30 Ιουνίου στα πεδινά

β. 5-7 Ιουλίου στα όψιμα - ορεινά

**Γ.** Κατάλληλα αγροχημικά: ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ.

**β. ΑΝΑΡΣΙΑ – ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ.**

Οι πτήσεις των εντόμων συνεχίζονται. Συνιστάται η προστασία των καρπών, ειδικά όταν αρχίζει η ωρίμανση (αλλαγή χρώματος). Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΑΠΡΟΛ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ (μόνο για Ανάρσια) κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ στο διάστημα εφαρμογής των αγροχημικών πριν από τη συγκομιδή.

### **ΚΕΡΑΣΙΑ**

**ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ.** (Gnomonia erythrostoma) - **ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ.** (Cylindrosporium padi).

Σε κτήματα που εμφανίζονται προσβολές (κηλίδωση των φύλλων) να εφαρμοσθεί μετά τη συγκομιδή ψεκασμός με ΝΤΟΝΤΙΝ.

ΣΗΜ.1.: Τα προσβεβλημένα φύλλα από ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ παραμένουν στο δένδρο και μετά τη φυλλόπτωση του φθινοπώρου, ενώ αντίθετα τα προσβεβλημένα φύλλα από ΚΥΛΙΝΔΡΟΣΠΟΡΙΟ πέφτουν πρόωρα.

ΣΗΜ.2.: Περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα μπορείτε να βρείτε στο Δελτίο Νο7/29-3-11.

### **ΜΗΛΟΕΙΔΗ**

**ΦΟΥΖΙΚΑΔΙ.**

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και οι μέσες θερμοκρασίες 18 - 24 °C που παρατηρούνται, καθώς και ο άστατος καιρός γενικά, ευνοούν την ανάπτυξη επαναμολύνσεων της ασθένειας.

Συνιστάται η προστασία των καρπιδίων και των φύλλων με διασυστηματικά μυκητοκτόνα (θεραπευτικά) ή με μείγματα τους με επαφής .

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/ση  
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη