



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkrfpet1@otenet.gr

№ 22 / 5 Αυγούστου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΝΟΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΥ

Αρχισε η τρίτη πτήση του εντόμου. Επειδή η γενιά αυτή είναι η πλέον ζημιογόνος και τα όρια ανεκτής ζημιάς πολύ χαμηλά, **να γίνει ψεκασμός:**

- α.** Από 7 έως 12 Αυγούστου με ρυθμιστές ανάπτυξης (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ, ΦΛΟΥΦΕΝΟΞΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) ή
- β.** Από 13-14 Αυγούστου με κλασσικά εντομοκτόνα: ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ή ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΓΚΙΑΣ με προσθήκη 1-3 ‰ ζάχαρης, κ.ά.
- Ο Βάκιλλος Θουριγκίας να προτιμηθεί για εφαρμογή κοντά στη συγκομιδή. Σε σταφύλια με πυκνό βότρυ να προτιμηθεί η σκόνη επίπασης.
 - Αν προτιμηθούν κλασσικά εντομοκτόνα ή Βάκιλλος Θουριγκίας, ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά από 12 - 14 ημέρες. Αν εφαρμοσθεί ρυθμιστής, η επανάληψη να γίνει σε 16 - 18 ημέρες.
 - Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται μόνο στα σταφύλια.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ** στα όρια τελευταίας εφαρμογής πριν τη συγκομιδή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη