



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
[pkripeti1@otenet.gr](mailto:pkripeti1@otenet.gr)

**№ 9 / 13 Απριλίου 2011**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

**ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

## **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ**

**α. Βαμβακάδα.** Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες. Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες). Σε οπωρώνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά η αντιμετώπιση του κοκκοειδούς και υπάρχουν προσβολές συνιστάται να γίνει ψεκασμός:

*Ι) Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής 26 - 28 Απριλίου*

Κατάλληλα φάρμακα :

- ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ
- ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ
- ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ
- ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ
- ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ

**Ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά δύο εβδομάδες.**

*ΙΙ) Σε περίπτωση ελαφράς προσβολής να γίνει μόνο μία εφαρμογή 1 - 2 Μαΐου μ' ένα από τα παραπάνω σκευάσματα.*

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:** Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, **συνιστάται** τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:** Σε όσους οπωρώνες έγινε ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ, όπως συστήθηκε στο Δελτίο μας Νο3/ 28-2-2011, **δεν** απαιτείται άλλη εφαρμογή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:** Παρατηρούνται σοβαρές προσβολές από **ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ** και αναφέρθηκαν αποτυχίες στην καταπολέμηση στο στάδιο G (Δελτίο Νο 4/2-3-2011). Σε αυτές τις περιπτώσεις να προτιμηθεί το **ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ για την καταπολέμηση της βαμβακάδας**, επειδή παρουσιάζει αξιόλογη δράση κατά των προνυμφών 5<sup>ου</sup> σταδίου του Φυλλοδέτη.

**β. Καρπόκαψα.** Αναμένονται οι πρώτες προσβολές του εντόμου στις κορυφές των νεαρών βλαστών μήκους 15 - 20 εκατοστών. Να γίνει ψεκασμός, μόνο όπου υπάρχει προσβολή σε νεαρές φυτείες ή φυτώρια στα τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου.

Κατάλληλα φάρμακα :

- ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ
- ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ
- ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ
- ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ

\* Με την εφαρμογή αυτή περιορίζεται και ο πληθυσμός του «κλεονού» που προσβάλλει τα νεκταρίνια.

**Σε περίπτωση που γίνεται καταπολέμηση της βαμβακάδας (όπως παραπάνω), δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Η προσβολή της καρπόκαψας της ροδακινιάς είναι μικρότερης σημασίας απ' ότι της ανάρσιας και θεωρείται σκόπιμο να γίνει αργότερα κοινή εφαρμογή για τα δύο έντομα μαζί, με κέντρο βάρος την ΑΝΑΡΣΙΑ (θα ακολουθήσει προειδοποίηση).



**γ. Αφίδα :** Όπου παρουσιάζονται προσβολές να γίνουν ψεκασμοί με *IMINTAKΛΟΠΡΙΝΤ*, *ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ*, *ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ*, *ΧΛΩΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ*, *ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ*, κ.α.

**δ. Ωίδιο :** Συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικών φαρμάκων στο ευαίσθητο στάδιο πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα των ευπαθών ποικιλιών.

- Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών συνιστάται η χρήση θεραπευτικών ωιδιοκτόνων.

**ε. Κλαδοσπόριο:** Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωίδιο.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης  
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη