



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
[pkpfpel1@otenet.gr](mailto:pkpfpel1@otenet.gr)

**№ 21 / 28 Ιουλίου 2011**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

### ΠΕΔΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

#### **ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ**

Ξεκίνησε η τρίτη πτήση. Οι εκκολάψεις αναμένονται στις 6 - 7 Αυγούστου.

Συνιστάται η προστασία των καρπών:

- α.** Αν χρησιμοποιηθούν ρυθμιστές ανάπτυξης, ο ψεκασμός να γίνει μέχρι 6 Αυγούστου.
- β.** Αν προτιμηθούν τα κλασσικά ή ιολογικά εντομοκτόνα, να γίνει ψεκασμός από 7 - 9 Αυγούστου.

Κατάλληλα αγροχημικά:

- I. Ρυθμιστές Ανάπτυξης:** ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ, ΛΟΥΦΕΝΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΙΕΝΖΟΥΡΟΝ
- II. Κλασσικά Εντομοκτόνα:** ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΙΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, κ.α.

**III. Ιολογικά Εντομοκτόνα:** CrpGV.

Επανάληψη του ψεκασμού απαιτείται μετά από 8-18 ημέρες ανάλογα με το αγροχημικό που χρησιμοποιήθηκε και **μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε υψηλούς πληθυσμούς** ( ένδειξη παγίδας ή υψηλές προσβολές από την προηγούμενη γενεά).

### ΟΡΕΙΝΕΣ – ΟΨΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

#### **ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ**

Οι εκκολάψεις της τρίτης γενιάς αναμένονται στις 13 - 14 Αυγούστου.

Συνιστάται η προστασία των καρπών:

- α.** Μέχρι 13 Αυγούστου με ρυθμιστές ανάπτυξης **ή**
  - β.** Από 13 - 15 Αυγούστου με κλασσικά εντομοκτόνα ή ιολογικά, όπως αναφέρονται παραπάνω (ΠΕΔΙΝΑ)
- Επανάληψη του ψεκασμού απαιτείται μόνο σε σοβαρές προσβολές, μετά από 12 - 18 ημέρες, ανάλογα με το αγροχημικό που χρησιμοποιήθηκε.

## **ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ**

### **A. ΞΥΛΟΦΑΓΑ (Κόσσοις, Σέζια, Ζευζέρα)**

Οπου σημειώνονται προσβολές να γίνει επανάληψη της εφαρμογής, που συστήθηκε με το Δελτίο Νο18/1 Ιουλίου, με την παραλαβή του δελτίου, όπως παρακάτω:

A. Για τον ΚΟΣΣΟ, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στο λαιμό και στον κορμό.

B. Για τη ΣΕΖΙΑ, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στον κορμό και στους βραχίονες.

Γ. Για τη ΖΕΥΖΕΡΑ, ο ψεκασμός να κατευθύνεται στις κορυφές.

Αν στην παραπάνω εφαρμογή ληφθεί μέριμνα διαβροχής και του εδάφους γύρω από το λαιμό σε ακτίνα 50-60 εκ., με ποσότητα περίπου 10 λίτρων υγρού ανά δένδρο καταπολεμούνται και οι προνύμφες της ΜΗΛΟΛΟΝΘΗΣ (Anoxia orientalis) και του ΚΑΠΝΩΔΗ.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ.

### **B. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ – ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ**

Συνιστάται η προστασία των καρπών στην αλλαγή του χρώματος (έναρξη ωρίμανσης) όπως συστήθηκε με το Δελτίο μας Νο19/18 Ιουλίου 2011.

### **Γ. ΝΑΡΚΕΣ**

Αν γίνει καταπολέμηση για την καρπόκαψα δεν απαιτείται ειδική επέμβαση.

### **Δ. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ**

Συνιστάται η προστασία των καρπών σε χρόνους ίδιους με αυτούς της καρπόκαψας της μηλιάς, με κατάλληλα αγροχημικά .

### **Ε. ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ**

Ξεκίνησε η 3<sup>η</sup> πτήση του εντόμου, ενώ συνεχίζεται η 2<sup>η</sup> πτήση. Οι επεμβάσεις σε αυτό το στάδιο δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχείς, λόγω επικάλυψης των γενεών.

Σε περίπτωση που παραλήφθηκαν ή απέτυχαν οι προηγούμενες επεμβάσεις και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, συνιστάται καταπολέμηση :

α. Στις ΠΡΩΪΜΕΣ - ΠΕΔΙΝΕΣ περιοχές, στις 7 - 9 Αυγούστου

β. Στις ΟΡΕΙΝΕΣ - ΟΨΙΜΕΣ περιοχές, στις 15 - 17 Αυγούστου

Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά από 12-14 ημέρες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης α/α

Πολυμέρου Βάϊος