



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(www.minagric.gr και www.agrotypos.gr)

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη
Τηλ. 2310 476662
pkp@pet1@otenet.gr

№ 19 / 8 Ιουλίου 2011

Βάιος Πολυμέρου
Ευγενία Μακρίδου

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

A. ΣΑΝ ΖΟΖΕ (Μηλοειδή – Πυρηνόκαρπα).

Αναμένεται η έξοδος των ερπυσών της δεύτερης γενιάς.

- Δεν συνιστάται γενική καταπολέμηση.

- Μόνο σε κτήματα που απέτυχαν ή δεν έγιναν οι προηγούμενες εφαρμογές και παρουσιάζουν προσβολές, συνιστάται:

I. ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

α. Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός 18 - 20 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 12 - 14 ημέρες.

β. Σε μέτριες προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή 24 - 26 Ιουλίου.

- Κατάλληλα αγροχημικά: ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ (Μόνο για Μηλοειδή), ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ (Μόνο για Ροδακινιά και Μηλοειδή), κ.ά.

II. ΟΨΙΜΕΣ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

α. Σε σοβαρές προσβολές να γίνει ψεκασμός 27 - 29 Ιουλίου και επανάληψη μετά από 12 - 14 ημέρες.

β. Σε μέτριες προσβολές να γίνει μόνο μία εφαρμογή 2 - 4 Αυγούστου.

- Κατάλληλα αγροχημικά: Όπως παραπάνω στις πεδινές περιοχές.

B. ΝΑΡΚΕΣ (Μηλιά - Αχλαδιά)

Αναμένεται η τρίτη πτήση του εντόμου την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

♦ Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.

♦ Να γίνει καταπολέμηση σε συνδυασμό με το ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ ή το ΣΑΝ ΖΟΖΕ.

♦ **ΜΟΝΟ** αν δε γίνουν οι παραπάνω επεμβάσεις και παρουσιάζεται σοβαρή προσβολή, να γίνει καταπολέμηση με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΦΟΣΜΕΤ κ.ά.:

α. Στις πεδινές περιοχές 16 - 18 Ιουλίου.

β. Στις όψιμες – ορεινές περιοχές 25 - 27 Ιουλίου.

Γ. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ-ΑΝΑΡΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ.

Οι πτήσεις των εντόμων είναι συνεχείς. Συνιστάται η προστασία των καρπών ειδικά στο στάδιο αλλαγής χρώματος.

Ειδικά για τις όψιμες ποικιλίες και σε κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές, συνιστάται ένα πρόγραμμα κάλυψης, το οποίο υπολογίζεται από την αναμενόμενη ημερομηνία συγκομιδής. Συνιστώνται τρεις εφαρμογές στις 40, 28 και 16 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Κατάλληλα αγροχημικά: ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας και με απόλυτη συμμόρφωση στην τελευταία ημερομηνία ψεκασμού πριν τη συγκομιδή.

Η Προϊσταμένη Δ/σης

Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη