



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μηλιά - Αχλαδιά - Ροδακινιά - Αμπέλι - Ελιά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και [www.agrotypos.gr](http://www.agrotypos.gr))

Τ.Θ. 436 570 01 Θέρμη  
Τηλ. 2310 476662  
[pkpfpet1@otenet.gr](mailto:pkpfpet1@otenet.gr)

**№ 11 / 25 Απριλίου 2012**

Βάιος Πολυμέρου  
Ευγενία Μακρίδου

### ΠΕΔΙΝΕΣ – ΠΡΩΪΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

#### ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

##### **α. Καρπόκαψα.**

Να γίνει ψεκασμός :

- Αμέσως μόλις πάρετε το δελτίο και μέχρι **30 Απριλίου** με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ ή
- Μέχρι **10 Μαΐου** με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ ( σκεύασμα CORAGEN) ή
- Από την παραλαβή του δελτίου μέχρι **10 Μαΐου** με ρυθμιστές (ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ, ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ, ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ) ή
- Από **11 - 13 Μαΐου** με κλασσικά εντομοκτόνα όπως ΦΟΣΜΕΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, Τ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ, κ.α.


**Η επέμβαση να επαναληφθεί μετά 2- 3 βδομάδες, ανάλογα με το αγροχημικό.**

- Οι ρυθμιστές να προτιμηθούν αν είχαμε ζημιές και από νάρκες.
- Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από **11 - 13 Μαΐου** ιολογικά εντομοκτόνα CrGV, τα οποία είναι ιδιαίτερα συμβατά με την ολοκληρωμένη διαχείριση (3 εφαρμογές ανά δεκαήμερο).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρπόκαψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του (στάδιο J).

##### • ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

- Σε κτήματα που δεν παρουσιάζουν σημαντικές προσβολές μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική προστασία με μία μόνο εφαρμογή με ρυθμιστές 11-14 Μαΐου, ή με κλασσικά και ιολογικά 15 - 17 Μαΐου.
- Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

**β. Φουζικλάδι :** Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά μυκητοκτόνα ή με μίγματα τους με θεραπευτικά (τριαζόλες- βενζιμιδαζόλες) ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.



## ΛΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

**Καρπόκαψα:** Όπου εμφανίζονται κάθε χρόνο προσβολές και μόνο όπου για διάφορους λόγους έχουμε μειωμένη καρπόδεση συνιστάται η προστασία του καρπιδίου μέχρι 10 Μαΐου με ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ ή 11 – 13 Μαΐου με ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, κ.α.


- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 2 εβδομάδες.
- Να επαναληφθεί ο ψεκασμός για τη σκωρίαση.

## ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


### A. ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

Παρατηρήθηκαν ήδη τα πρώτα τέλεια έντομα της ανοιξιάτικης πτήσης καθώς και οι πρώτες ωοτοκίες. Οι πρώτες εκκολάψεις των ωοτοκιών αναμένονται περίπου 8 Μαΐου.


- ✦ Μετά τις 8 Μαΐου συνιστάται να γίνει έλεγχος των αχλαδεώνων. Εξετάζουμε 20 κορυφές από βλαστούς της χρονιάς (30-50cm), (ένα από κάθε δένδρο) και σε ύψος 1 έως 2 μέτρα.
- ✦ Αν διαπιστώσουμε παρουσία προνυμφών από 1 έως 4 στα 20 δένδρα, προσθέτουμε καλοκαιρινό λάδι στους ψεκασμούς για την καρπόκαψα (θα δοθεί προειδοποίηση για τις ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ).
- ✦ Αν διαπιστωθεί παρουσία πάνω από 4 στους 20 βλαστούς, συνιστάται καταπολέμηση με ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ ή ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ + ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ ή ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ στις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω.
- ✦ Αν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κάνουμε το δειγματοληπτικό έλεγχο, στα κτήματα που παρουσιάζουν κάθε χρόνο προσβολές, συνιστάται ψεκασμός στις πεδινές περιοχές στις 10 - 12 Μαΐου και στις ορεινές περιοχές στις 14 - 17 Μαΐου με ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ ή ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ + ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ ή ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ.
- ✦ **Η εφαρμογή να επαναληφθεί μετά από 12-14 ημέρες.**
- ✦ Αν στο στάδιο G - H χρησιμοποιήθηκε ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ ή στο στάδιο H ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ + ΘΕΡΙΝΟ ΛΑΔΙ (όπως στο δελτίο μας Νο 6/21-3-2012), να επαναληφθεί ο ψεκασμός μετά από 2 εβδομάδες.



Ωό



Προνύμφη 1<sup>ου</sup> σταδίου



Προνύμφη 5<sup>ου</sup> σταδίου

### B. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ

Συνιστάται η προστασία του καρπιδίου με προστατευτικά μυκητοκτόνα ή με μίγματα τους με θεραπευτικά (τριάζόλες- βενζιμιδαζόλες) ειδικά όπου σημειώθηκαν αρχικές προσβολές.

**ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.**

Η Προϊσταμένη Δ/σης  
Δρ. Αικατερίνη Χονδρογιάννη